



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

inifap

Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Campo Experimental Bajío



N° 02

Julio 2021

Boletín del Sistema de Alerta temprana del SENASICA para Langosta Centroamericana en el estado de Tamaulipas




Colaboración Técnico-Científica:

Dirección de Sanidad Vegetal
Dirección de Sistematización y Análisis Sanitario
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Campo Experimental Bajío
Comité de Sanidad Vegetal del estado de Tamaulipas

El Sistema de Alerta temprana del SENASICA enfocado a la Langosta Centroamericana en el estado de Tamaulipas, y conforme al análisis espacial multicriterio derivado de la información de los censos realizados en campo, datos agroclimáticos favorables pronosticados y antecedentes de la plaga, se emite el siguiente boletín para los municipios identificados con riesgo.

1 Comportamiento histórico y dinámica poblacional de la plaga (2014-2021)


- El índice endémico de la población de langosta en el estado de Tamaulipas indica que la plaga se mantuvo dentro de la "zona de alarma" (enero a mayo). Es decir, su densidad poblacional se registró en crecimiento constante desde inicios del mes de enero alcanzando un pico máximo poblacional en el mes de mayo. El mes de junio registró un descenso poblacional importante, ubicándose dentro de la "zona de seguridad".



- En el gráfico de la Curva epidemiológica se observa el comportamiento histórico (2016-2020) de las etapas biológicas (adulto/ninfa) de la plaga.
- Para ambas etapas se aprecian mayores densidades poblacionales en el segundo semestre del ciclo anual (a partir del mes de mayo). Adicionalmente, y para el caso de los adultos se observan picos poblacionales importantes en mayo, agosto y noviembre; aparentemente las poblaciones del mes de mayo corresponderían a la 2da generación del año inmediato anterior "diapausa imaginal" o probablemente una 3ra generación de la especie; el pico poblacional de agosto correspondería a la 1ra generación; mientras que la población de noviembre correspondería a la 2da generación. Para el caso de las ninfas, la 1ra generación es poco perceptible (junio y julio) y bajo nivel de infestación, mientras que los individuos de la 2da generación son bastante conspicuos (octubre).
- Para el año 2021 los adultos registran un crecimiento poblacional importante y constante, comportamiento atípico que no se ajusta al histórico registrado (en cuanto a valores de infestación), sin embargo es notorio el pico máximo poblacional del mes de mayo que coincide con el pico poblacional histórico del mes de mayo. Por otra parte, y en relación a la etapa biológica de ninfas hasta el mes de junio no se tienen registros.
- Bajo el escenario fitosanitario anterior, es importante no dejar de monitorear la dinámica poblacional de las etapas biológicas de la plaga, particularmente para la población de adultos 2021, dado que presenta incrementos poblacionales importantes en lo que va del año (enero-mayo); destaca el mes de junio por la merma considerable en los valores de infestación.

Contacto

Correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx
Teléfono gratuito: 800 987 9879



- En el Gráfico de fluctuaciones poblacionales de estadios ninfales 2020, los principales picos poblacionales de ninfas se presentan en el mes de octubre.
- Con base en OIRSA (2019) las ninfas de 1ra y 2da generación se presentan en los meses de Jun-Jul y Oct-Nov, respectivamente. Situación que se ajusta a lo observado en el gráfico, con la particularidad de que la 2da generación de ninfas es más conspicua que la 1ra generación.
- En cuanto a Etapa Fásica y Tipo de Formación destacan por su elevada densidad poblacional los tipos TRANSCIENS CONGREGANS/MANCHÓN y TRANSCIENS CONGREGANS/BANDO en octubre.
- Bajo el escenario anterior, el mes de octubre posee mayores probabilidades para la formación de mangas.




Contacto

Correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx
Teléfono gratuito: 800 987 987 9

2

Perspectiva climática asociada a la dinámica poblacional de la plaga

Con base en el análisis agroclimático y los requerimientos de temperatura e índice normalizado de precipitación, se observa que en el estado de Tamaulipas se pronostican condiciones potenciales altas a muy altas para el desarrollo de la plaga en el mes de julio.




3

Situación actual de la plaga y determinación del riesgo fitosanitario asociado

- Durante el mes de junio las poblaciones de la langosta Centroamericana se identificaron principalmente en **cultivos de sorgo, caña de azúcar, maíz, soya y pasto**.
- Se registró mayor densidad de infestación en etapa fenológica de crecimiento y finalización del periodo de cosecha.
- **Principalmente se observa la fase solitaria en estado adulto.**
- No se registraron mangas.
- **En total, 5 municipios son los que presentan riesgo alto (Anexo 1).**

Análisis y estudio de riesgo espacial-multicriterio



Contacto

Correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx
Teléfono gratuito: 800 987 987 9

4 Impacto económico conforme al modelo espacial multicriterio

- En total son **5 municipios en riesgo alto** con aproximadamente **38,54 ha** de cultivos agrícolas hospedantes al mes de Julio.




2,053 Mdp

Impacto económico en los municipios con riesgo alto.

- Posible afectación a **106,933 ha de pastos y praderas con un valor de 2,199 Mdp.**


- La dependencia económica* es del **47%** para los **municipio en riesgo alto.**

Valor de la producción de cultivos hospedantes en riesgo alto (Mdp)



*Dependencia económica de cultivos hospedantes, en municipios en riesgo, respecto al valor total de su producción agrícola.

Dependencia económica de cultivos hospedantes, en municipios en riesgo alto, respecto al valor total de su producción agrícola



Proyección de superficie sembrada de cultivos hospedante con probable impacto en los municipios de riesgo alto

Municipio	Hospedante	Superficie sembrada (ha)	Dependencia económica
El Mante	Ajonjolí, Maíz, Sorgo, Soya, Agave, Caña de azúcar, Limón y Naranja.	15,949	79%
González	Ajonjolí, Maíz, Sorgo, Soya, y Agave, Caña de azúcar, Limón, Naranja y Toronja.	9,201	38%
Altamira	Ajonjolí, Chile verde, Maíz, Soya, y Agave.	5,038	22%
Nuevo Morelos	Maíz, Caña de azúcar y Naranja.	4,769	94%
Aldama	Maíz, Sorgo, Soya, Agave, Limón y Naranja.	3,584	3%
Total general:		38,542	47%


*Nota: Los municipios de Gustavo Díaz Ordaz, Miguel Alemán y Reynosa no presentan para el mes de Julio, cultivos hospedantes susceptibles para la plaga (SIAP 2020).

5

Impacto económico conforme al modelo espacial multicriterio

Impacto Potencial en Pastos y Praderas

Municipio	Superficie sembrada (ha)	Volumen de la Producción (ton)	Valor de la Producción (Mdp)
Aldama	87,345	2,398,782	1,935
González	11,082	128,775	111
El Mante	5,078	41,776	37
Altamira	3,186	37,201	33
Nuevo Morelos	243	1,677	1
Total general:	106,933	2608211	2,119




6 Conclusiones y/o consideraciones

Se sugiere la emisión del comunicado del riesgo al personal técnico, con el propósito de prevenir el probable desarrollo y dispersión de la plaga en los cultivos de los municipios identificados con base a los siguientes puntos:

1. De acuerdo con el gráfico de la Curva epidemiológica de la plaga (al mes de junio) aún no se tienen registros sobre la presencia de ninfas de la 1ra generación en la entidad; no obstante y conforme al gráfico de Fluctuaciones Poblacionales de Estadios Ninfales 2020 se esperaba que en el mes de junio se tuvieran los primeros registros de esta importante etapa biológica; situación que presumiblemente indica un posible desfase. Con respecto a la etapa biológica de adultos de enero ($n=249$) a mayo ($n=980$) se observó un crecimiento exponencial de la plaga, sin embargo en el mes de junio ($n=247$) los valores de infestación disminuyeron de manera considerable.
2. Aunque para el mes de julio existen condiciones climáticas favorables para la plaga, su baja densidad durante el mes de mayo reduce el riesgo de su desarrollo. No obstante, el resultado del análisis multicriterio estima que superficies de cinco municipios del Estado se encuentran en riesgo alto.
3. Los municipios en riesgo alto están principalmente determinados por la presencia y gran extensión de pastizales y cultivos hospedantes. Adicionalmente, se observa que la presencia de la plaga se focaliza en los municipios de la región costera del Estado y que limitan con los estados de San Luis Potosí y Veracruz.
4. Al mes de Julio el estado de Tamaulipas presenta una superficie de hospedantes susceptibles en 5 municipio de 38,542 ha con un valor aproximado de 2,053 Mdp. representado en promedio a nivel municipal una dependencia económica, respecto al valor total de su producción agrícola del 47%. Destacan por su valor los cultivos como: caña de azúcar, agave, maíz, jitomate, soya, naranja, chile verde, sorgo, toronja y ajonjolí. Se identifican los municipios de Nuevo Morelos, El Mante y González como los municipios con mayor dependencia económica en caso de un impacto potencial en cultivos hospedantes. Respecto a zonas de resguardo identificadas como pastos y praderas, representan una superficie de 106,933 ha con un valor estimado de 2,119 Mdp.

Anexo 1.- En total son 5 municipios identificados con nivel de riesgo alto y presencia de cultivos agrícolas que se verían afectados en caso de dispersarse la plaga o invada dichas zonas.



CVEGEO	Municipio	Control	Riesgo
28028	Nuevo Morelos		Alto
28012	González		
28003	Altamira		
28021	El Mante		
28002	Aldama		

CVEGEO	Municipio	Control	Riesgo
28032	Reynosa		Medio
28015	Gustavo Díaz Ordaz		
28004	Antiguo Morelos		
28043	Xicoténcatl		
28018	Jiménez		
28023	Méndez		
28037	Soto la Marina		
28030	Padilla		
28035	San Fernando		
28001	Abasolo		
28007	Camargo		
28013	Güémez		
28014	Guerrero		
28022	Matamoros		
28024	Mier		
28025	Miguel Alemán		
28027	Nuevo Laredo		
28033	Río Bravo		
28040	Valle Hermoso		

Contacto

Correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx
Teléfono gratuito: 800 987 987 9

Anexo 1.- En total son 5 municipios identificados con nivel de riesgo alto y presencia de cultivos agrícolas que se verían afectados en caso de dispersarse la plaga o invada dichas zonas.

Clave	Municipio	Control	Riesgo
28020	Mainero		Bajo
28005	Burgos		
28011	Gómez Farías		
28042	Villagrán		
28029	Ocampo		
28034	San Carlos		
28010	Cruillas		
28006	Bustamante		
28008	Casas		
28009	Ciudad Madero		
28016	Hidalgo		
28017	Jaumave		
28019	Llera		
28026	Miquihuana		
28031	Palmillas		
28036	San Nicolás		
28038	Tampico		
28039	Tula		
28041	Victoria		

Glosario de términos

Agroclimático: Término que hace referencia a la influencia que tienen los factores climáticos en la producción. Una vez conseguido este objetivo su aplicación garantiza la utilización racional de este conocimiento en la toma de decisiones para la optimización de la planificación agrícola.

Análisis espacial multicriterio (AEMC): El AEMC ofrece la posibilidad de definir los estándares metodológicos para el mapeo de servicios ecosistémicos, esta técnica es flexible en su forma, permite rescatar la opinión de expertos y actores sociales, la cual es espacializada a través de una plataforma de Sistemas de Información Geográfica (SIG). La evaluación multicriterio incorpora la opinión o percepción de los actores en las variables y criterios que componen el modelo de evaluación. Los criterios son seleccionados, cuidadosamente, por expertos (evitando la presencia de sesgos), para luego ser ponderados y valorados por los actores locales, mientras que los SIG permiten integrar las variables y sus criterios con atributos geoespaciales.

Consiste en identificar las variables de análisis y generar capas de información geoespacial (Esse, et al., 2014). Cada variable se pondera mediante el método de análisis jerárquico ponderado con el objetivo de identificar las variables que podrían estar determinando la presencia de la langosta centroamericana y delimitar esas zonas de interés.

Área gregarígena: Sitio donde se opera la transformación fásica en el sentido = solitaria-transiens-congregans, gregaria.

Área de invasión: Área geográfica determinada que tiene condiciones favorables para el establecimiento, cópula, reproducción y gregarización de la langosta, dondese forman las mangas y/o bandos.

Bando: Agrupamiento de ninfas de color oscuro con rojo, con desplazamiento en dirección definida, formada por individuos gregarios que pueden cubrir desde unos metros a varios kilómetros cuadrados

Canal endémico/Corredor endémico: Es la representación gráfica del número de casos que se presentan en un área en períodos definidos (semana, mes), comparado con los datos de años anteriores (5 o 7 años). Permite ver representada gráficamente la incidencia actual de una plaga sobre la incidencia histórica de la misma, dando lugar a la detección temprana de cifras anormalmente altas (o bajas) de los casos de la plaga en estudio.

Combate: utilización de cualquier medio químico, cultural o biológico para mantener una plaga a una densidad menor a los daños económicos que pudiera causar.

Conspicuo: Eminente, notable, llamativo, sobresaliente, ilustre, visible.

Control (de una plaga): Supresión, contención o erradicación de una población de plagas

Curva epidemiológica: Es un gráfico estadístico utilizado en epidemiología para visualizar el inicio de un brote epidémico.

Densidad: Número de individuos de langosta (alados o saltones) por unidad de superficie.

Dependencia económica: Es una situación en la que una región o área depende de otro con un nivel productivo mayor, para su crecimiento económico, debido a sus fuertes vínculos financieros, o comerciales.

Diapausa imaginal: Interrupción del desarrollo sexual, debido a las condiciones ambientales, se presenta principalmente por la época seca.

Dinámica poblacional: La dinámica poblacional o de poblaciones comprende el estudio de todas las variaciones que experimenta un conjunto de individuos de una misma especie. Estos cambios se miden en términos de variabilidad de parámetros como número de individuos, crecimiento poblacional, estructura social y de edades, entre otras.

Estadio: Cada una de las etapas por las que pasa un insecto durante su ciclo biológico.

Etapas fásicas: La "langosta" durante su ciclo de vida presenta "transformaciones" (polimorfismo), los cuales debido a un incremento en la densidad poblacional modifican su comportamiento, pasando de la fase solitaria a una fase gregaria, alterándose posteriormente su color y forma. Si los grupos están compuestos por adultos alados se llaman "mangas", si sus miembros son ninfas se denominan "bandos".

Fluctuaciones poblacionales: Cambios en la densidad de población, que describen oscilaciones cíclicas en el número de individuos, dependiendo de variaciones estacionales de clima, disponibilidad de alimento, entre otros (factores bióticos y abióticos), que son resultado de controles intrínsecos del tamaño poblacional; estas fluctuaciones denotan una condición de equilibrio dinámico a la población.

Gregarización: Agrupación de individuos por inmigración o multiplicación en áreas delimitadas, formando bandos o mangas.

Impacto potencial: La asignación de un valor de impacto potencial es una forma de cuantificar los efectos negativos que puede tener una especie plaga, respecto de otras. Asimismo, el potencial de control es una medida relativa de la facilidad con que puede ser controlada o erradicada la especie plaga.

Índice Normalizado de Precipitación: Cuantifica el déficit de precipitación para varias escalas temporales, las cuales reflejan el impacto de la sequía en la disponibilidad de los diferentes recursos hídricos; valores SPI < -1 indican una condición de sequía, cuanto más negativo el valor, más severa la condición de sequía. Valores SPI > +1 indican condiciones más húmedas comparadas con una climatología. Para este caso se determinó usar un SPI de tres meses que ofrece una comparación de la precipitación sobre un período de tres meses específicos con los totales de precipitación del mismo período de tres meses para todos los años incluidos en el registro histórico. Refleja condiciones de humedad a corto y mediano plazo y formula una estimación estacional de la precipitación, por lo que en cuestiones agrícolas puede ser más eficaz.

Contacto

Correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx

Teléfono gratuito: 800 987 987 9

Glosario de términos

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI): Es un tipo de índice de vegetación obtenido a partir de imágenes satelitales de tipo multiespectral. Es uno de los índices más utilizados para el monitoreo global del estado fitosanitario de la vegetación ya que permite identificar fácilmente las zonas de mayor densidad y salud de las coberturas vegetales. Se calcula con las bandas espectrales del rojo (RED) y el infrarrojo cercano (NIR) aplicando la siguiente fórmula:

$$NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED)$$

Los valores del NDVI se expresan desde -1.0 a 1.0, siendo los valores negativos las zonas con nubes, agua y nieve, mientras que los valores cercanos a cero corresponden a suelos desnudos. Los valores mayores a 0 indican la presencia de vegetación, desde escasa (menor a 0.2) hasta muy densa (mayor a 0.6), teniendo que los valores más altos del NDVI indican zonas con vegetación sana (verde), con buen contenido de humedad y muy densa, por ejemplo bosques o cultivos forestales bajo riego.

Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI): Es un tipo de índice de vegetación obtenido a partir de imágenes satelitales de tipo multiespectral que fue diseñado para reducir los errores del brillo del suelo en los índices de vegetación. Es más utilizado en regiones áridas o donde la vegetación está muy dispersa y es escasa. Este índice agrega un factor de ajuste del suelo (L) a las bandas espectrales del rojo (RED) y el infrarrojo cercano (NIR) mediante la siguiente fórmula:

$$SAVI = (NIR - RED) / (NIR - RED + L) * (1 + L)$$

Al igual que el NDVI, el SAVI se expresa desde -1.0 a 1.0, siendo los valores negativos las zonas con nubes, agua y nieve, mientras que los valores cercanos a cero corresponden a suelos desnudos. Los valores mayores a 0 indican la presencia de vegetación, siendo los valores cercanos a 1 las zonas con mayor concentración de vegetación.

Índice de Humedad de la Vegetación de Diferencia Normalizada (NDWI): Es un tipo de índice de vegetación que permite resalta el contenido de humedad en la vegetación y de la capa más superficial del suelo. Se utiliza para identificar zonas agrícolas inundadas, tierras de regadío o distribución de humedales. Existen diferentes fórmulas para su cálculo, pero la más utilizada es la diseñada por Gao (1996) que utiliza las bandas espectrales del infrarrojo (NIR) y el infrarrojo cercano de onda corta (SWIR) mediante la siguiente fórmula:

$$NDWI = (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR)$$

Al igual que el NDVI y el SAVI, el NDWI se expresa con valores desde -1.0 a 1.0, siendo los valores negativos las zonas con nubes, cuerpos profundos agua y nieve, mientras que los valores cercanos a cero corresponden a suelos secos y desprovistos de vegetación. Los valores mayores a 0 indican la presencia de vegetación con humedad, siendo los valores cercanos a 1 las zonas con mayor concentración contenido de humedad en la vegetación y el suelo.

Langosta solitaria: Individuos dispersos en grandes áreas, sin movimiento definido, con baja actividad, poco voraces, con dimorfismo sexual y ninfas de color verde.

Langosta transiens: Evolución de la fase solitaria a gregaria o viceversa; los saltones con diferentes colores: verde manchado, amarillento, amarillo o rosa.

Langosta gregaria: Individuos siempre agrupados en pequeñas o medianas áreas, muy activos, con movimiento definido, muy voraces, se desplazan en mangas y/o bandas, sin dimorfismo sexual y saltones negros con rojo.

Manchones: Agrupación de langosta (adulto o ninfa) proveniente de individuos solitarios dispersos, debido a la acción de factores diversos como quema, inundación, sequía prolongada o pastoreo.

Manga: Conjunto o agrupación de langosta gregaria en estado adulto volador, capaz de desplazarse a grandes distancias, muy voraz y activa.

Ninfa: Estado inmaduro de la langosta, semejante al adulto, pero sin alas o con primordios alares y no es fértil.

OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.

Perspectiva climática: La Perspectiva del Clima es una estimación sobre el posible comportamiento de la lluvia y la temperatura realizada con herramientas estadísticas, comparación con años análogos y análisis de los resultados de modelos globales y regionales sobre las temperaturas de la superficie del mar, los patrones de viento, presión atmosférica y la precipitación, que tienen como objetivo complementar las actividades de pronóstico.

Riesgo fitosanitario: Es la evaluación del impacto fitosanitario o agroecológico que se determina ante el supuesto de la introducción o establecimiento de un organismo en un lugar del cual no es nativo o no está establecido;

Riesgo de plagas: Probabilidad de introducción y dispersión de una plaga y magnitud de las potenciales consecuencias económicas asociadas a ella.

Saltón: Estado inmaduro de langosta denominado ninfa, recién emergida del huevecillo y sin alas.

Transgregans: Individuo en la fase de transición, al pasar de la fase solitaria a la gregaria.

Transiens congregans: Forma intermedia por la que pasa la langosta cuando cambia de la fase solitaria a la fase gregaria.

Transiens disocians: Forma intermedia por la que pasa la langosta cuando cambia de la fase gregaria a la fase solitaria.

Zonas potenciales: Áreas con probabilidad de desarrollo y/o dispersión de la plaga conforme a sus requerimientos térmicos y zonas con disponibilidad de los diferentes recursos hídricos.