



AGRICULTURA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

inifap

Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias



Sistema de Alerta Temprana

Nº 05

Mayo 2023



Boletín del Sistema de
Alerta temprana del
SENASICA
para Langosta
Centroamericana
en el estado de
Tamaulipas

Colaboración Técnico-Científica:

Dirección en Jefe

Dirección General de Sanidad Vegetal

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Campo Experimental Bajío



2023
Francisco
VILLA


Contacto

Correo: alerta.fitosanitario@senasica.gob.mx

Teléfono gratuito: 800 987 987 9

El Sistema de Alerta temprana del SENASICA enfocado a la Langosta Centroamericana en el estado de Tamaulipas, y conforme al análisis espacial multicriterio derivado de la información de los censos realizados en campo, datos agroclimáticos favorables pronosticados y antecedentes de la plaga, se emite el siguiente boletín para los municipios identificados con riesgo.


1 Comportamiento histórico y dinámica poblacional de la plaga (2016-2023)



- o Conforme al gráfico de canal endémico se observa mayor actividad poblacional de la langosta Centroamericana en el 2do semestre del ciclo anual, particularmente a partir del mes de mayo. Destacan picos poblacionales importantes en los meses de mayo, agosto, octubre y noviembre. **El índice endémico de la langosta centroamericana en el mes de abril de 2023 se registró en la zona de alerta.**


* El índice endémico de enero a abril 2023, corresponde a la actividad de prospección registrada por el OASV.

- o Respecto al mes de abril de 2023, se registraron 4,893 adultos, con un **índice de infestación promedio de 2.15 individuos/100 m²**. El **85 %** de la población de adultos se presenta en etapa fásica/tipo de formación: **solitaria/solitario** y en el **15 %** en **Transiens Congregans/Manchón**.
- o Sin presencia de estadios ninfales.






- o En el gráfico de la dinámica poblacional de los estados biológicos de 2021 a 2023, se observa que la población de adultos de la **2da generación de los últimos dos años (2021-2022)**, se presentó **de noviembre (año anterior) a julio**. Por lo que **la 1ra generación del año se presenta de agosto a octubre**.




- o Para el gráfico de fluctuaciones poblacionales de ninfas del año 2021 y 2022, se observa que la población de ninfas de **la 1ra generación se presentó de junio a julio**. Se **registraron instares N2-N5 y N1-N4**, con la mayor densidad poblacional en el mes de julio. Destacan la presencia de las etapas fásica/tipo de formación: solitaria/solitario y gregaria/manchón. **La 2da generación, se presentó de septiembre a noviembre y octubre a noviembre, se registraron instares N1-N6 y N2-N6, respectivamente**, con mayor densidad poblacional en el mes de octubre (pico máximo). Sobresaliendo las poblaciones de la etapa fásica/tipo de formación: Transiens congregans/bando.
- o Para abril de 2023, **no se han presentado poblaciones de ninfas**.




2**Perspectiva climática asociada a la dinámica poblacional de la plaga**

Con base en el **análisis agroclimático** y los **requerimientos de temperatura y precipitación**, se observa que en el estado de Tamaulipas se pronostican **condiciones potenciales que van de altas a muy altas para el desarrollo de la plaga en el mes de mayo en el estado**. Para las zonas gregarígenas ubicadas en González, Xicoténcatl, Gómez Farías, Ocampo, Antiguo Morelos y El Mante se identifican **condiciones favorables altas a muy altas para el desarrollo de la plaga**.

**3****Situación actual de la plaga y determinación del riesgo fitosanitario asociado**

- Durante el mes de abril las poblaciones de la langosta centroamericana se identificaron principalmente en **caña de azúcar en desarrollo vegetativo; zacate y maíz, sorgo en finalización de cosecha y pasto**.
- No se registraron mangas.
- **Dos municipios** con acciones de control en 100 ha de superficie.
- Las zonas de riesgo alto se localizan en las localidades Guemez, Barretal, Aldama, Mante, Ocampo, Nvo Morelos, Plan de Ayala, Antiguo Morelos, González, Gómez Farías, El Limón, Xicoténcatl, entre otros.
- **Se identifican 14 municipios en riesgo alto de presentar condiciones para la presencia de la plaga (Anexo 1).**

Análisis y estudio de riesgo espacial-multicriterio

4

Impacto económico conforme al modelo espacial multicriterio

- Se identifican **14 municipios en riesgo alto**, con cultivos agrícolas hospedantes susceptibles al mes de mayo, con **aproximadamente 45,711 ha.**




5,851 Mdp

- Posible afectación a **117,646 ha de pastos y praderas con un valor de 2,237 Mdp.**

Possible Impacto económico en los municipios con riesgo alto.


- La dependencia económica* en promedio es de **47%** para los **municipio en riesgo alto.**

Valor de la producción de cultivos hospedantes en riesgo alto (MDP)



*Dependencia económica de cultivos hospedantes, en municipios en riesgo, respecto al valor total de su producción agrícola. Información obtenida de SIAP 2021 con cultivos de seguimiento económico a nivel municipal.

Dependencia económica de cultivos hospedantes, en municipios en riesgo alto, respecto al valor total de su producción agrícola




Proyección de superficie sembrada de cultivos hospedantes con probable impacto en los municipios de riesgo alto

Municipio	Hospedante	Superficie sembrada (ha)	Dependencia económica
Xicoténcatl	Agave, Caña de azúcar, Limón y Naranja.	9,238	47 %
Ocampo	Caña de azúcar y Naranja.	6,473	41 %
Güémez	Limón, Naranja y Toronja.	5,350	19 %
Padilla	Limón, Naranja y Toronja.	4,841	31 %

continua en la siguiente hoja

-Los datos pueden estar redondeados al inmediato superior.





4

Impacto económico conforme al modelo espacial multicriterio

Proyección de superficie sembrada de cultivos hospedantes con probable impacto en los municipios de riesgo alto

Municipio	Hospedante	Superficie sembrada (ha)	Dependencia económica
Llera	Agave, Limón, Naranja y Toronja.	4,102	10 %
El Mante	Agave, Caña de azúcar, Limón y Naranja.	3,703	25 %
González	Agave, Caña de azúcar, Limón y Naranja.	2,824	66 %
Antiguo Morelos	Caña de azúcar y Naranja.	2,625	100 %
Gómez Farías	Caña de azúcar, Limón, Naranja y Toronja.	2,426	47 %
Nuevo Morelos	Caña de azúcar y Naranja.	1,831	100 %
Victoria	Limón, Naranja y Toronja.	1,621	17 %
Casas	Limón y Toronja.	372	3 %
Aldama	Agave, Limón y Naranja.	225	67 %
Altamira	Agave, Limón y Naranja.	80	91 %
Total general:		45,711	47%

-Los datos pueden estar redondeados al inmediato superior.

Impacto Potencial en Pastos y Praderas

Municipio	Superficie sembrada (ha)	Volumen de la Producción (ton)	Valor de la Producción (Mdp)
Aldama	87,345	2,398,782	1,935
González	11,082	128,775	111
El Mante	5,078	41,776	37
Altamira	3,186	37,201	33
Padilla	2,483	34,023	33
Gómez Farías	1,711	19,229	17
Xicoténcatl	1,628	14,694	13
Casas	1,385	16,026	16
Ocampo	1,089	7,569	7
Victoria	1,064	20,427	20
Antiguo Morelos	667	4,602	4
Llera	487	5,667	6
Nuevo Morelos	243	1,677	1
Güémez	198	2,223	2
Total general:	117,646	2,732,670	2,237

*Se identifica superficie de pastos y praderas con valor económicos en los 14 municipios en riesgo alto, SIAP, 2021. Los datos pueden estar redondeados al inmediato superior





5 Conclusiones y/o consideraciones


Se sugiere la emisión del comunicado del riesgo al personal técnico, con el propósito de prevenir el probable desarrollo y dispersión de la plaga en los cultivos de los municipios identificados con base a los siguientes puntos:

1. Conforme a la gráfica de canal endémico, **el índice endémico de la langosta centroamericana en el mes de abril de 2023 se registró en la zona de alarma.**
2. Para **abril el índice promedio de infestación para el Estado es de 2.15 individuos/100m², destacándose solitaria/solitario, con densidad poblacional baja (consultar anexo 2). Sin embargo en este mes, los municipios de El Mante (Rancho Santa María y Rancho San Roberto) y Xicotencatl (Rancho San Manuel), presentaron un índice promedio de infestación de 30 y 29.5 individuos/100m² (Transiens congregans/Manchón), con densidad poblacional alta (Consultar Anexo 2).**
3. Las **condiciones agroclimáticas** pronosticadas para el mes de mayo van **de altas a muy altas para el desarrollo de la plaga**, incluyendo las zonas gregarígenas. Asimismo, existen zonas donde las condiciones de humedad del suelo y verdor de la vegetación son favorables para su desarrollo, resultando en la **identificación de zonas de alto riesgo de presencia de las condiciones para el desarrollo de langosta en la porción sur y centro del estado.**
4. **Al mes de mayo se presentan 14 municipios en riesgo alto, con una superficie de hospedantes susceptibles de 45,711 ha con un valor aproximado de 5,851 Mdp.** representado en promedio a nivel municipal una dependencia económica, respecto al valor total de su producción agrícola, del **47%**. Destacan por su valor los cultivos como: caña de azúcar, naranja, limón, agave y toronja. Se identifican los municipios de Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y Altamira con dependencia económica alta en caso de un impacto potencial en cultivos hospedantes. Respecto a zonas de resguardo identificadas como pastos y praderas, representan una superficie de 117,646 ha con un valor estimado de 2,237 Mdp.





Anexo 1.- Son 14 municipios identificados con nivel de riesgo alto y presencia de cultivos agrícolas que se verían afectados en caso de dispersarse la plaga o invada dichas zonas.



Clave	Municipio	Control (ha)	Riesgo	Localidades (>50 ha)
28002	Aldama		Alto	Barra del Tordo, Mariano Matamoros Dos, Paraíso Tortugas, Aldama
28003	Altamira			La Colonia (Estación Colonias), Esteros, Francisco Medrano, Lomas del Real, Maclovio Herrera (Miradores), Torno Largo, Velamar, La Pedrera, Ricardo Flores Magón, Altamira Servicios de Infraestructura (ASISA) [Parque Industrial], Altamira [Puerto Industrial], Altamira, Cuauhtémoc, Miramar
28004	Antiguo Morelos			México Libre, Antiguo Morelos, Fortines y Emiliano Zapata (Fortines)
28008	Casas			Campo Número Dos, Campo Número Tres, Casas, Campo Número Uno (Campo Alto)
28011	Gómez Farías			Loma Alta (Loma Alta de Gómez Farías), Gómez Farías
28012	González			Adolfo Ruiz Cortines, Magiscatzin, Francisco I. Madero Dos, Venustiano Carranza Dos, López Rayón, San Antonio Rayón, La Esperanza, Nueva Esperanza, Campo Nuevo, Campo Verde, Buena Vista [Colonia Menonita], Tamaholipa, González, Graciano Sánchez, Estación Manuel (Úrsulo Galván), González [Ejido], Santa Fe
28013	Güémez			Plan de Ayala, San Cayetano, Güémez, Balconcitos
28019	Llera			Casa del Campesino (La Clementina), Las Compuertas, Emiliano Zapata, El Nuevo Encino (El Encino), San Rafael, Ignacio Zaragoza, Llera de Canales
28021	El Mante	60		Celaya, Triunfo Número Dos, Plan de Ayala, División del Norte, Tantoyuquita, Magdalena Aguilar, Nuevo Tantoán, Nueva Apolonia, Los Aztecas, Camotero Número Dos, Quintero, El Abra, Ciudad Mante, El Limón
28028	Nuevo Morelos			Santa Cruz del Toro, Nuevo Morelos





Anexo 1.- Son 14 municipios identificados con nivel de riesgo alto y presencia de cultivos agrícolas que se verían afectados en caso de dispersarse la plaga o invada dichas zonas. Además se identifican 13 municipios en riesgo medio y 16 municipios en riesgo bajo.

Clave	Municipio	Control (ha)	Riesgo	Localidades (>50 ha)
28029	Ocampo		Alto	La Muralla, Ricardo Flores Magón, Adolfo López Mateos (Chamal Nuevo), Ocampo, El Pensil
28030	Padilla			Plan de Ayala, La Soledad, Nueva Villa de Padilla, Barretal
28041	Victoria			Alianza de Caballeros, Congregación Caballeros, El Olivo, Santa Librada, Los Olivos, Cerrada los Olivos [Fraccionamiento Campestre], El Olmo (Rancho Nuevo del Castillo), Miguel Hidalgo [Colonia], Ciudad Victoria, La Presa, La Libertad
28043	Xicoténcatl	40		Segunda Unidad Xicoténcatl (El Aquiche), Xicoténcatl, Primero de Mayo

Clave	Municipio	Riesgo
28001	Abasolo	Medio
28005	Burgos	
28009	Ciudad Madero	
28010	Cruillas	
28014	Guerrero	
28016	Hidalgo	
28018	Jiménez	
28023	Méndez	
28034	San Carlos	
28035	San Fernando	
28037	Soto la Marina	
28038	Tampico	
28042	Villagrán	





Anexo 1.- Se identifican 16 municipios en riesgo bajo.

Clave	Municipio	Riesgo
28006	Bustamante	Bajo
28007	Camargo	
28015	Gustavo Díaz Ordaz	
28017	Jaumave	
28020	Mainero	
28022	Matamoros	
28024	Mier	
28025	Miguel Alemán	
28026	Miquihuana	
28027	Nuevo Laredo	
28031	Palmillas	
28032	Reynosa	
28033	Río Bravo	
28036	San Nicolás	
28039	Tula	
28040	Valle Hermoso	





Anexo 2.-Criterios para acciones de prevención conforme a las actividades de prospección y determinación de las densidades poblacionales.

Cuadro 1. Criterios para acciones de prevención conforme a las actividades de prospección.

Etapa fásica	NDVI*	Nivel de riesgo	Estrategia técnica	Acciones de prevención
Solitario	-0.203 - 0.605	Baja	Exploración	Vigilar y monitorear ninfas y adultos para determinar la densidad poblacional, aplicar medidas de manejo de manera preventiva.
Transiens	0.137 - 0.461	Media	Exploración permanente y muestreo	Vigilar y monitorear ninfas y adultos para determinar la densidad poblacional, aplicar estrategias de acción que mitiguen el impacto de la plaga.
Gregaria	0.282 - 0.481	Alta	Exploración permanente y muestreo	Monitorear el número de manchones y bandos, implementar acciones de control para suprimir, erradicar o confinar el brote epidemiológico.

*NDVI obtenidos a partir de imágenes satelitales MODIS

Determinación del nivel de riesgo con base en la densidad poblacional.

Densidad de individuos (ninfas y adultos):

Alta= ≥ 30 individuos/100 m²

Media= 11 a 29 individuos/100 m²

Baja= $0 \leq 10$ individuos/100 m²





Glosario de términos

Agroclimático: Término que hace referencia a la influencia que tienen los factores climáticos en la producción. Una vez conseguido este objetivo su aplicación garantiza la utilización racional de este conocimiento en la toma de decisiones para la optimización de la planificación agrícola.

Análisis espacial multicriterio (AEMC): El AEMC ofrece la posibilidad de definir los estándares metodológicos para el mapeo de servicios ecosistémicos, esta técnica es flexible en su forma, permite rescatar la opinión de expertos y actores sociales, la cual es espacializada a través de una plataforma de Sistemas de Información Geográfica (SIG). La evaluación multicriterio incorpora la opinión o percepción de los actores en las variables y criterios que componen el modelo de evaluación. Los criterios son seleccionados, cuidadosamente, por expertos (evitando la presencia de sesgos), para luego ser ponderados y valorados por los actores locales, mientras que los SIG permiten integrar las variables y sus criterios con atributos geoespaciales.

Consiste en identificar las variables de análisis y generar capas de información geoespacial (Esse, et al., 2014). Cada variable se pondera mediante el método de análisis jerárquico ponderado con el objetivo de identificar las variables que podrían estar determinando la presencia de la langosta centroamericana y delimitar esas zonas de interés.

Área gregarígena: Sitio donde se opera la transformación fásica en el sentido = solitaria-transiens-congregans, gregaria.

Área de invasión: Área geográfica determinada que tiene condiciones favorables para el establecimiento, cópula, reproducción y gregarización de la langosta, dondese forman las mangas y/o bandos.

Bando: Agrupamiento de ninfas de color oscuro con rojo, con desplazamiento en dirección definida, formada por individuos gregarios que pueden cubrir desde unos metros a varios kilómetros cuadrados

Canal endémico/Corredor endémico: Es la representación gráfica del número de casos que se presentan en un área en períodos definidos (semana, mes), comparado con los datos de años anteriores (5 o 7 años). Permite ver representada gráficamente la incidencia actual de una plaga sobre la incidencia histórica de la misma, dando lugar a la detección temprana de cifras anormalmente altas (o bajas) de los casos de la plaga en estudio.

Combate: utilización de cualquier medio químico, cultural o biológico para mantener una plaga a una densidad menor a los daños económicos que pudiera causar.

Conspicuo: Eminente, notable, llamativo, sobresaliente, ilustre, visible.

Control (de una plaga): Supresión, contención o erradicación de una población de plagas

Curva epidemiológica: Es un gráfico estadístico utilizado en epidemiología para visualizar el inicio de un brote epidémico.

Densidad: Número de individuos de langosta (alados o saltones) por unidad de superficie.

Dependencia económica: Es una situación en la que una región o área depende de otro con un nivel productivo mayor, para su crecimiento económico, debido a sus fuertes vínculos financieros, o comerciales.

Diapausa imaginal: Es un estado fisiológico de inactividad con factores desencadenantes y terminantes bien específicos. Se usa para sobrevivir a condiciones desfavorables y predecibles, como temperaturas extremas, sequía o carencia de alimento.

Dinámica poblacional: La dinámica poblacional o de poblaciones comprende el estudio de todas las variaciones que experimenta un conjunto de individuos de una misma especie. Estos cambios se miden en términos de variabilidad de parámetros como número de individuos, crecimiento poblacional, estructura social y de edades, entre otras.

Estadio: Cada una de las etapas por las que pasa un insecto durante su ciclo biológico.

Etapas fásicas: La "langosta" durante su ciclo de vida presenta "transformaciones" (polimorfismo), los cuales debido a un incremento en la densidad poblacional modifican su comportamiento, pasando de la fase solitaria a una fase gregaria, alterándose posteriormente su color y forma. Si los grupos están compuestos por adultos alados se llaman "mangas", si sus miembros son ninfas se denominan "bandos".

Fototropismo: Corresponde a una respuesta del organismo frente al estímulo luminoso. El fototropismo positivo hace referencia al crecimiento del organismo hacia la fuente de luz, mientras el fototropismo negativo implica un crecimiento del organismo en la dirección contraria a la de la fuente lumínica.

Fluctuaciones poblacionales: Cambios en la densidad de población, que describen oscilaciones cíclicas en el número de individuos, dependiendo de variaciones estacionales de clima, disponibilidad de alimento, entre otros (factores bióticos y abióticos), que son resultado de controles intrínsecos del tamaño poblacional; estas fluctuaciones denotan una condición de equilibrio dinámico a la población.

Gregarización: Agrupación de individuos por inmigración o multiplicación en áreas delimitadas, formando bandos o mangas.

Impacto potencial: La asignación de un valor de impacto potencial es una forma de cuantificar los efectos negativos que puede tener una especie plaga, respecto de otras. Asimismo, el potencial de control es una medida relativa de la facilidad con que puede ser controlada o erradicada la especie plaga.

Índice Normalizado de Precipitación: Cuantifica el déficit de precipitación para varias escalas temporales, las cuales reflejan el impacto de la sequía en la disponibilidad de los diferentes recursos hídricos; valores SPI < -1 indican una condición de sequía, cuanto más negativo el valor, más severa la condición de sequía. Valores SPI > +1 indican condiciones más húmedas comparadas con una climatología. Para este caso se determinó usar un SPI de tres meses que ofrece una comparación de la precipitación sobre un período de tres meses específicos con los totales de precipitación del mismo período de tres meses para todos los años incluidos en el registro histórico. Refleja condiciones de humedad a corto y mediano plazo y formula una estimación estacional de la precipitación, por lo que en cuestiones agrícolas puede ser más eficaz.





Glosario de términos

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI): Es un tipo de índice de vegetación obtenido a partir de imágenes satelitales de tipo multispectral. Es uno de los índices más utilizados para el monitoreo global del estado fitosanitario de la vegetación ya que permite identificar fácilmente las zonas de mayor densidad y salud de las coberturas vegetales. Se calcula con las bandas espectrales del rojo (RED) y el infrarrojo cercano (NIR) aplicando la siguiente fórmula:

$$NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED)$$

Los valores del NDVI se expresan desde -1.0 a 1.0, siendo los valores negativos las zonas con nubes, agua y nieve, mientras que los valores cercanos a cero corresponden a suelos desnudos. Los valores mayores a 0 indican la presencia de vegetación, desde escasa (menor a 0.2) hasta muy densa (mayor a 0.6), teniendo que los valores más altos del NDVI indican zonas con vegetación sana (verde), con buen contenido de humedad y muy densa, por ejemplo bosques o cultivos forestales bajo riego.

Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI): Es un tipo de índice de vegetación obtenido a partir de imágenes satelitales de tipo multispectral que fue diseñado para reducir los errores del brillo del suelo en los índices de vegetación. Es más utilizado en regiones áridas o donde la vegetación está muy dispersa y es escasa. Este índice agrega un factor de ajuste del suelo (L) a las bandas espectrales del rojo (RED) y el infrarrojo cercano (NIR) mediante la siguiente fórmula:

$$SAVI = (NIR - RED) / (NIR - RED + L) * (1 + L)$$

Al igual que el NDVI, el SAVI se expresa desde -1.0 a 1.0, siendo los valores negativos las zonas con nubes, agua y nieve, mientras que los valores cercanos a cero corresponden a suelos desnudos. Los valores mayores a 0 indican la presencia de vegetación, siendo los valores cercanos a 1 las zonas con mayor concentración de vegetación.

Índice de Humedad de la Vegetación de Diferencia Normalizada (NDWI): Es un tipo de índice de vegetación que permite resaltar el contenido de humedad en la vegetación y de la capa más superficial del suelo. Se utiliza para identificar zonas agrícolas inundadas, tierras de regadío o distribución de humedales. Existen diferentes fórmulas para su cálculo, pero la más utilizada es la diseñada por Gao (1996) que utiliza las bandas espectrales del infrarrojo (NIR) y el infrarrojo cercano de onda corta (SWIR) mediante la siguiente fórmula:

$$NDWI = (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR)$$

Al igual que el NDVI y el SAVI, el NDWI se expresa con valores desde -1.0 a 1.0, siendo los valores negativos las zonas con nubes, cuerpos profundos de agua y nieve, mientras que los valores cercanos a cero corresponden a suelos secos y desprovistos de vegetación. Los valores mayores a 0 indican la presencia de vegetación con humedad, siendo los valores cercanos a 1 las zonas con mayor concentración de humedad en la vegetación y el suelo.

Langosta solitaria: Individuos dispersos en grandes áreas, sin movimiento definido, con baja actividad, poco voraces, con dimorfismo sexual y ninfas de color verde.

Langosta transiens: Evolución de la fase solitaria a gregaria o viceversa; los saltones con diferentes colores: verde manchado, amarillento, amarillo o rosa.

Langosta gregaria: Individuos siempre agrupados en pequeñas o medianas áreas, muy activos, con movimiento definido, muy voraces, se desplazan en mangas y/o bandas, sin dimorfismo sexual y saltones negros con rojo.

Manchones: Agrupación de langosta (adulto o ninfa) proveniente de individuos solitarios dispersos, debido a la acción de factores diversos como quema, inundación, sequía prolongada o pastoreo.

Manga: Conjunto o agrupación de langosta gregaria en estado adulto volador, capaz de desplazarse a grandes distancias, muy voraz y activa.

Nicho ecológico: El concepto ecológico de nicho describe, de forma general, el rango de condiciones ambientales, físicas y bióticas, en las cuales una especie, o más precisamente, una población local, puede vivir y perpetuarse exitosamente. Para referirnos al nicho de las especies frecuentemente hacemos énfasis en una o dos variables del ambiente, como las condiciones, el hábitat o los recursos que usan los organismos para su existencia.

Ninfa: Estado inmaduro de la langosta, semejante al adulto, pero sin alas o con primordios alares y no es fértil.

OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.

Perspectiva climática: La Perspectiva del Clima es una estimación sobre el posible comportamiento de la lluvia y la temperatura realizada con herramientas estadísticas, comparación con años análogos y análisis de los resultados de modelos globales y regionales sobre las temperaturas de la superficie del mar, los patrones de viento, presión atmosférica y la precipitación, que tienen como objetivo complementar las actividades de pronóstico.

Riesgo fitosanitario: Es la evaluación del impacto fitosanitario o agroecológico que se determina ante el supuesto de la introducción o establecimiento de un organismo en un lugar del cual no es nativo o no está establecido;

Riesgo de plagas: Probabilidad de introducción y dispersión de una plaga y magnitud de las potenciales consecuencias económicas asociadas a ella.

Saltón: Estado inmaduro de langosta denominado ninfa, recién emergida del huevecillo y sin alas.

Termotropismo: Es la reacción de curvatura provocada por la acción del calor. El calor actúa sobre el crecimiento, volviéndolo anormal, cuando el organismo está expuesto a condiciones térmicas desiguales. Puede ser negativo o positivo.

Transgregans: Individuo en la fase de transición, al pasar de la fase solitaria a la gregaria.

Transiens congregans: Forma intermedia por la que pasa la langosta cuando cambia de la fase solitaria a la fase gregaria.

Transiens disocians: Forma intermedia por la que pasa la langosta cuando cambia de la fase gregaria a la fase solitaria.

Zonas potenciales: Áreas con probabilidad de desarrollo y/o dispersión de la plaga conforme a sus requerimientos térmicos y zonas con disponibilidad de los diferentes recursos hídricos.

