



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

inifap

Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias




Sistema de Alerta Temprana

N° 03

Marzo 2023



CESAVE
VERACRUZ



**Boletín del Sistema de
Alerta temprana del
SENASICA
para Langosta
Centroamericana
en el estado de
Veracruz**

Colaboración Técnico-Científica:

Dirección en Jefe

Dirección General de Sanidad Vegetal

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Campo Experimental Bajío


Comité de Sanidad Vegetal del estado de Veracruz



2023
Francisco
VILLA

El Sistema de Alerta temprana del SENASICA enfocado a la Langosta Centroamericana en el estado de Veracruz, y conforme al análisis espacial multicriterio derivado de la información de los censos realizados en campo, datos agroclimáticos favorables pronosticados y antecedentes de la plaga, se emite el siguiente boletín para los municipios identificados con riesgo.


1 Comportamiento histórico y dinámica poblacional de la plaga (2016-2023)




o Conforme al gráfico de canal endémico se observa mayor actividad poblacional de la langosta centroamericana en el 2do semestre del ciclo anual, particularmente a partir del mes de julio. Destacan picos poblacionales importantes en los meses de agosto y octubre-noviembre. **El índice endémico de la langosta centroamericana en el mes de febrero de 2023 se registró en la zona de alarma.**

* El índice endémico de enero a febrero 2023, corresponde a la actividad de prospección registrada por el OASV y los meses subsiguientes son índices esperados conforme al comportamiento.


o Respecto al mes de febrero de 2023, se registraron **3,353** adultos, con un índice promedio de infestación de **3.30 individuos/100 m²**. El 100 % de la población son adultos en etapa fásica/tipo de formación: solitaria/solitario



- En el gráfico de la dinámica poblacional de los estados biológicos de 2021 a 2023, se observa que la población de adultos de la 2da generación de los últimos dos años (2021-2022), se presentó **de noviembre a mayo-junio**. Por lo que, **la 1ra generación se presenta de junio a octubre en 2021 y 2022**.




- Para el gráfico de fluctuaciones poblacionales de ninfas del año 2021 y 2022, se observa que la población de ninfas de **la 1ra generación se presentó de abril-junio a septiembre**. Se registraron instares N1-N4 y N1-N5, con la mayor densidad poblacional en el mes de junio - julio. Destacan la presencia de las Etapas fásica/Tipo de formación: Solitaria/Solitario. **La 2da generación, se presentó de octubre a noviembre-diciembre, se registraron instares N1-N5 y N1-N4, respectivamente**, con mayor densidad poblacional en los meses de noviembre (pico máximo). Sobresaliendo las poblaciones de la Etapa fásica/Tipo de formación: Gregaria/Manchón y Solitaria/Solitario
- Para febrero de 2023, no se han presentado poblaciones de ninfas.



2

Perspectiva climática asociada a la dinámica poblacional de la plaga


Con base en el **análisis agroclimático** y los **requerimientos de temperatura y precipitación**, se observa que en el estado de Veracruz se pronostican **condiciones potenciales predominantemente altas y muy altas para el desarrollo de la plaga en el mes de marzo**. Para las zonas gregarígenas ubicadas en Pánuco, El Higo, Zentla, Omealca, Tierra Blanca y Juan Rodríguez Clara se identificaron **condiciones favorables de altas a muy altas para el desarrollo de la plaga**.

**3**

Situación actual de la plaga y determinación del riesgo fitosanitario asociado

- Durante el mes de febrero las poblaciones de la langosta centroamericana se identificaron principalmente en **caña de azúcar en desarrollo vegetativo/madurez fisiológica, limón en desarrollo vegetativo/en producción, naranja, piña en floración, finalización de cosecha y abandonada, así como en pasto y zacate**.
- No se registraron mangas.
- **Dos municipios** con acciones de control en 353 hectáreas.
- Las zonas de riesgo alto se localizan en las localidades Vega Cercada, Guayalejo, El Higo, Villa Emiliano Zapata, Tierra Blanca, Las Puertas, Juan Alfaro, Rancho del Padre, El Tejar, Valente Díaz, Tres Valles, Villa Azueta, Juan Rodríguez C., Estación Juanita, San Juan, entre otras
- **En total, 20 municipios son los que presentan riesgo alto (Anexo 1).**

Análisis y estudio de riesgo espacial-multicriterio



4

Impacto económico conforme al modelo espacial multicriterio

- Se identifican **20 municipios con riesgo alto**, de los cuales **18**** cuentan con superficie aproximada de **41,688 ha** hospedantes de cultivos agrícolas susceptibles al mes de marzo.




1,891 Mdp

- Posible afectación a **23,835 ha de pastos y praderas** con un valor de **487 Mdp**.
- La dependencia económica* en promedio es de **65%** para los **municipio en riesgo alto**.

Posible Impacto económico en los municipios con riesgo alto.


Valor de la producción de cultivos hospedantes en riesgo alto (Mdp)



**Nota: No se identifica cultivos hospedantes, SIAP 2022 en los municipios: Boca del Río y Medellín de Bravo.

*Dependencia económica de cultivos hospedantes, en municipios en riesgo, respecto al valor total de su producción agrícola. Información obtenida de SIAP 2021 con cultivos de seguimiento económico a nivel municipal.

Dependencia económica de cultivos hospedantes, en principales municipios en riesgo alto, respecto al valor total de su producción agrícola



Proyección de superficie sembrada de cultivos hospedantes con probable impacto en los municipios de riesgo alto

Municipio	Hospedante	Superficie sembrada (ha)	Dependencia económica
Pánuco	Naranja, Maíz, Caña de azúcar y Frijol.	7,577	10 %
Cosamaloapan de Carpio	Sorgo, Maíz, Caña de azúcar y Frijol.	6,720	71 %
Tierra Blanca	Sorgo, Limón, Maíz, Caña de azúcar y Frijol.	5,700	77%

Continúa en la siguiente hoja

-Los datos pueden estar redondeados al inmediato superior.





4

Impacto económico conforme al modelo espacial multicriterio

Proyección de superficie sembrada de cultivos hospedantes con probable impacto en los municipios de riesgo alto

**Municipio	Hospedante	Superficie sembrada (ha)	Dependencia económica
El Higo	Naranja, Sorgo, Limón, Maíz, Caña de azúcar y Frijol.	5,641	95 %
Tres Valles	Sorgo, Maíz, Caña de azúcar y Frijol.	2,774	90 %
San Juan Evangelista	Sorgo, Naranja, Maíz, Limón y Frijol.	2,615	59 %
Juan Rodríguez Clara	Maíz, Naranja, Frijol, Caña de azúcar y Chile verde.	2,381	93 %
Tlalixcoyan	Plátano, Sorgo, Limón, Maíz, Caña de azúcar y Chile verde.	1,895	76 %
Actopan	Maíz, Jitomate, Limón, Frijol, Caña de azúcar y Chile verde.	1,461	52 %
Carrillo Puerto	Limón, Caña de azúcar y Maíz.	1,365	100 %
Manlio Fabio Altamirano	Plátano, Naranja, Maíz, Limón, Jitomate, Caña de azúcar y Frijol.	1,196	40 %
Cotaxtla	Plátano, Naranja, Maíz, Limón, Frijol, Caña de azúcar y Chile verde.	839	50 %
Cuitláhuac	Limón, Caña de azúcar y Maíz.	687	100 %
Soledad de Doblado	Plátano, Naranja, Limón, Maíz, Caña de azúcar y Frijol.	368	37 %
Camarón de Tejeda	Limón, Maíz, Caña de azúcar y Frijol.	239	50 %
Veracruz	Naranja y Maíz.	120	45 %
Jamapa	Plátano, Maíz, Limón y Frijol.	78	39 %
Apazapan	Limón.	33	79 %
Total general:		41,688	65%

**Nota: No se identifica cultivos hospedantes, SIAP 2022 en los municipios: Boca del Río y Medellín de Bravo.

*Dependencia económica de cultivos hospedantes, en municipios en riesgo, respecto al valor total de su producción agrícola. Información obtenida de SIAP 2022 con cultivos de seguimiento económico a nivel municipal.

Impacto Potencial en Pastos y Praderas

Municipio	Superficie sembrada (ha)	Volumen de la Producción (ton)	Valor de la Producción (Mdp)
Cotaxtla	9205	162,468	141
Soledad de Doblado	3757	66,875	57
Camarón de Tejeda	3503	61,653	53
Tierra Blanca	2783	92,396	90
Medellín de Bravo	2061	66,673	65
Tlalixcoyan	1556	51,737	50
Manlio Fabio Altamirano	970	31,525	31
Total general:	23,835	533,327	487

*Se identifica superficie de pastos y praderas con valor económicos 7 de los 18 municipios en riesgo alto, SIAP, 2021
Los datos pueden estar redondeados al inmediato superior





5

Conclusiones y/o consideraciones


Se sugiere la emisión del comunicado del riesgo al personal técnico, con el propósito de prevenir el probable desarrollo y dispersión de la plaga en los cultivos de los municipios identificados con base a los siguientes puntos:

1. Conforme a la gráfica de canal endémico, **el índice endémico del mes de febrero de 2023 se registró en la zona de alarma.**
2. Para **febrero el índice promedio de infestación para el Estado es de 3.30 individuos/100m² en solitaria/solitario, con una densidad poblacional baja. Sin embargo, en el municipio de Juan Rodríguez Clara (Colonia Domínguez y Cerro del Indio) se presentó un índice promedio de infestación de 28.2 individuos/100m² (Solitaria/Solitario) sobre piña y pasto, con una densidad poblacional media (consultar anexo 2).**
3. Las condiciones agroclimáticas pronosticadas para el mes de marzo son altas y muy altas para el desarrollo de la plaga, incluyendo las zonas gregarígenas. Asimismo, existen zonas donde las condiciones de humedad del suelo y verdor de la vegetación son favorables para su desarrollo, resultando en la identificación de zonas de alto riesgo de presencia de las condiciones para el desarrollo de langosta al norte, centro y sur del territorio veracruzano.
4. Al mes de marzo el estado de **Veracruz presenta 20 municipios en riesgo alto**, de los cuales **sólo en 18 se identifica superficie de hospedantes susceptibles con 41,688 ha con un valor aproximado de 1,891 Mdp.** representado en promedio a nivel municipal una dependencia económica, respecto al valor total de su producción agrícola, del **65%**. Destacan por su valor los cultivos como: caña de azúcar, maíz, limón, naranja, chile verde, tomate rojo, frijol, plátano, sorgo y toronja. Se identifican los municipios de Carrillo Puerto, Cuitláhuac, El Higo, Juan Rodríguez Clara, Tres Valles, Apazapan, Tierra Blanca, Tlalixcoyan y Cosamaloapan de Carpio, entre otros, con mayor dependencia económica en caso de un impacto potencial en cultivos hospedantes. Respecto a zonas de resguardo identificadas con valor económico como pastos y praderas, representan una superficie de 23,835 ha con un valor estimado de 487 Mdp.





Anexo 1.- Son 20 municipios identificados con nivel de riesgo alto y presencia de cultivos agrícolas que se verían afectados en caso de dispersarse la plaga o invada dichas zonas.



Clave	Municipio	Control (Ha)	Riesgo	Localidades (mayores a 50 ha)
30004	Actopan		Alto	Santa Rosa (General Pinzón), El Farallón, San Isidro, Actopan, Mozomboa, Tinajitas
30007	Camarón de Tejeda			Camarón de Tejeda
30017	Apazapan			
30028	Boca del Río			Residencial el Dorado, Boca del Río, Veracruz
30031	Carrillo Puerto			El Palmar, Tamarindo, Mexcala
30045	Cosamaloapan de Carpio			Poblado Dos (Ampliación Piedras Negras), Cerro Colorado, San Francisco (Oyozontle), Cosamaloapan, Gabino Barreda, Nopaltepec, Paraíso Novillero
30049	Cotaxtla			La Capilla, Cotaxtla, La Tinaja
30053	Cuitláhuac			Cuitláhuac, San Francisco (Mata Clara)
30090	Jamapa			El Chicle, Las Puertas, El Rincón, El Zanjón, Jamapa
30094	Juan Rodríguez Clara	322		Angostura, Huayacanes, La Unión, Nopalapan, Juan Rodríguez Clara, Los Tigres (San Marcos)
30100	Manlio Fabio Altamirano		Tenenexpan, Mata Loma, Manlio Fabio Altamirano	





Anexo 1.- Son 98 municipios identificados con nivel de riesgo medio

Clave	Municipio	Control (Ha)	Riesgo	Localidades (mayores a 50 ha)
30105	Medellín de Bravo		Alto	Juan de Alfaro, La Laguna y Monte del Castillo, Mata Ortiz, San Miguel, Ixcoalco, Rancho del Padre, Medellín, Paso del Toro, Los Robles, El Tejar, Fraccionamiento Arboledas San Ramón, Fraccionamiento Puente Moreno, Las Palmas de Medellín
30123	Pánuco			Chijol Diecisiete, Nuevo Michoacán (La Michoacana), Tampuche, Oviedo, El Molino, Aquiles Serdán, Nuevo Chicayán, Tamante, Vega Cercada, Lázaro Cárdenas, Confederación Nacional Campesina (Canoas), Potrero de la Isleta, Ex-Hacienda Chintón (La Quina), Colonia Piloto, Villa Cacalilao Dos, Antonio J. Bermúdez, Pánuco, Tamos, Moralillo, Guayalejo
30142	San Juan Evangelista			Achotal, Loma Bonita, Ejido Villa Guerrero Melchor Ocampo, Colonia Villahermosa, San Juan Evangelista, La Cerquilla, Estación Juanita
30148	Soledad de Doblado			Soledad de Doblado
30174	Tierra Blanca	31		La Campana (La Ica), El Jícara, Joachín, Poblado Cinco (Nuevo Villa Ojitlán), San Nicolás (La Burrera), Rodríguez Tejeda, Tierra Blanca, Huixcolotla
30181	Tlaxiucoyan			El Sauce (Cerro Grande), El Zapote, Paso de la Boca, El Cocuite, Tlaxiucoyan, Piedras Negras
30193	Veracruz			Hacienda Sotavento, Nuevo Veracruz, Colonia el Renacimiento, Valle Alto, Hacienda Paraíso, Vargas, Veracruz, Las Amapolas, Delfino Victoria (Santa Fe), Valente Díaz, Las Amapolas Dos, Fraccionamiento Geovillas los Pinos, Colinas de Santa Fe, Lomas de Río Medio Cuatro, Los Torrentes
30205	El Higo			San Andrés, Cuve de Badeas, El Higo, El Pueblito
30207	Tres Valles			Nuevo San José Independencia, Poblado Tres, Colonia Agrícola Independencia, La Guadalupe, Tres Valles, Los Naranjos, Novara

Clave	Municipio	Riesgo
30003	Acayucan	Medio
30005	Acula	
30009	Alto Lucero de Gutiérrez Barrios	
30011	Alvarado	
30012	Amatitlán	
30013	Naranjos Amatlán	
30014	Amatlán de los Reyes	
30015	Angel R. Cabada	
30016	La Antigua	
30021	Atoyac	
30024	Tlaltetela	
30027	Benito Juárez	
30033	Cazones de Herrera	
30034	Cerro Azul	
30035	Citlaltépetl	
30039	Coatzacoalcos	
30040	Coatzintla	
30043	Comapa	
30048	Cosoleacaque	
30050	Coxquihui	





Anexo 1.- Son 98 municipios identificados con nivel de riesgo medio

Clave	Municipio	Riesgo
30179	Tlacotepec de Mejía	Medio
30189	Tuxpan	
30190	Tuxtilla	
30191	Ursulo Galván	
30196	Yanga	
30199	Zaragoza	
30200	Zentla	
30204	Agua Dulce	
30208	Carlos A. Carrillo	
30210	Uxpanapa	
30211	San Rafael	
30212	Santiago Sochiapan	

Clave	Municipio	Riesgo
30001	Acajete	Bajo
30002	Acatlán	
30006	Acultzingo	
30008	Alpatláhuac	
30010	Altotonga	
30018	Aquila	
30019	Astacinga	
30020	Atlahuilco	
30022	Atzacan	
30023	Atzacan	
30025	Ayahualulco	
30026	Banderilla	
30029	Calchahuaco	
30030	Camerino Z. Mendoza	
30032	Catemaco	
30036	Coacoatzintla	
30037	Coahuilán	
30038	Coatepec	
30041	Coetzala	
30042	Colipa	
30044	Córdoba	
30046	Cosautlán de Carvajal	
30047	Coscomatepec	
30057	Chiconquiaco	





Anexo 1.- Son 94 municipios identificados con nivel de riesgo bajo

Clave	Municipio	Riesgo
30062	Chocamán	Bajo
30067	Filomeno Mata	
30068	Fortín	
30071	Huatusco	
30072	Huayacocotla	
30074	Huiloapan de Cuauhtémoc	
30076	Ilamatlán	
30079	Ixhuacán de los Reyes	
30080	Ixhuatlán del Café	
30081	Ixhuatlancillo	
30082	Ixhuatlán del Sureste	
30085	Ixtaczoquitlán	
30086	Jalacingo	
30087	Xalapa	
30092	Xico	
30093	Jilotepec	
30095	Juchique de Ferrer	
30096	Landero y Coss	
30098	Magdalena	
30099	Maltrata	
30101	Mariano Escobedo	
30103	Mecatlán	
30106	Miahuatlán	
30107	Las Minas	
30109	Misantla	
30110	Mixtla de Altamirano	
30112	Naolinco	
30113	Naranjal	
30114	Nautla	
30115	Nogales	
30118	Orizaba	
30127	La Perla	
30128	Perote	
30132	Las Vigas de Ramírez	
30135	Rafael Delgado	
30136	Rafael Lucío	
30137	Los Reyes	
30138	Río Blanco	
30140	San Andrés Tenejapan	
30146	Sochiapa	
30147	Soledad Atzompa	
30150	Tamalín	
30156	Tatatila	
30159	Tehuipango	
30163	Tenochtitlán	
30164	Teocelo	
30165	Tepatlaxco	
30166	Tepetlán	
30168	Tequila	
30170	Texcatepec	
30171	Texhuacán	
30177	Tlacolulan	
30180	Tlachichilco	
30182	Tlalnelhuayocan	
30183	Tlapacoyan	
30184	Tlaquilpa	
30185	Tlilapan	
30186	Tomatlán	
30187	Tonayán	
30188	Totutla	
30192	Vega de Alatorre	
30194	Villa Aldama	
30195	Xoxocotla	





Anexo 1.- Son 94 municipios identificados con nivel de riesgo bajo

Clave	Municipio	Riesgo
30197	Yecuatla	Bajo
30198	Zacualpan	
30201	Zongolica	
30202	Zontecomatlán de López y Fuentes	
30203	Zozocolco de Hidalgo	
30206	Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río	
30209	Tatahuicapan de Juárez	





Anexo 2.-Criterios para acciones de prevención conforme a las actividades de prospección y determinación de las densidades poblacionales.

Cuadro 1. Criterios para acciones de prevención conforme a las actividades de prospección.

Etapa fásica	NDVI*	Nivel de riesgo	Estrategia técnica	Acciones de prevención
Solitario	-0.203 - 0.605	Baja	Exploración	Vigilar y monitorear ninfas y adultos para determinar la densidad poblacional, aplicar medidas de manejo de manera preventiva.
Transciens	0.137 - 0.461	Media	Exploración permanente y muestreo	Vigilar y monitorear ninfas y adultos para determinar la densidad poblacional, aplicar estrategias de acción que mitiguen el impacto de la plaga.
Gregaria	0.282 - 0.481	Alta	Exploración permanente y muestreo	Monitorear el número de manchones y bandos, implementar acciones de control para suprimir, erradicar o confinar el brote epidemiológico.

*NDVI obtenidos a partir de imágenes satelitales MODIS

Determinación del nivel de riesgo con base en la densidad poblacional.

Densidad de individuos (ninfas y adultos):

Alta= ≥ 30 individuos/100 m²

Media= 11 a 29 individuos/100 m²

Baja= $0 \leq 10$ individuos/100 m²





Glosario de términos

Agroclimático: Término que hace referencia a la influencia que tienen los factores climáticos en la producción. Una vez conseguido este objetivo su aplicación garantiza la utilización racional de este conocimiento en la toma de decisiones para la optimización de la planificación agrícola.

Análisis espacial multicriterio (AEMC): El AEMC ofrece la posibilidad de definir los estándares metodológicos para el mapeo de servicios ecosistémicos, esta técnica es flexible en su forma, permite rescatar la opinión de expertos y actores sociales, la cual es espacializada a través de una plataforma de Sistemas de Información Geográfica (SIG). La evaluación multicriterio incorpora la opinión o percepción de los actores en las variables y criterios que componen el modelo de evaluación. Los criterios son seleccionados, cuidadosamente, por expertos (evitando la presencia de sesgos), para luego ser ponderados y valorados por los actores locales, mientras que los SIG permiten integrar las variables y sus criterios con atributos geoespaciales.

Consiste en identificar las variables de análisis y generar capas de información geoespacial (Esse, et al., 2014). Cada variable se pondera mediante el método de análisis jerárquico ponderado con el objetivo de identificar las variables que podrían estar determinando la presencia de la langosta centroamericana y delimitar esas zonas de interés.

Área gregarígena: Sitio donde se opera la transformación fásica en el sentido = solitaria-transiens-congregans, gregaria.

Área de invasión: Área geográfica determinada que tiene condiciones favorables para el establecimiento, cópula, reproducción y gregarización de la langosta, dondese forman las mangas y/o bandos.

Bando: Agrupamiento de ninfas de color oscuro con rojo, con desplazamiento en dirección definida, formada por individuos gregarios que pueden cubrir desde unos metros a varios kilómetros cuadrados

Canal endémico/Corredor endémico: Es la representación gráfica del número de casos que se presentan en un área en períodos definidos (semana, mes), comparado con los datos de años anteriores (5 o 7 años). Permite ver representada gráficamente la incidencia actual de una plaga sobre la incidencia histórica de la misma, dando lugar a la detección temprana de cifras anormalmente altas (o bajas) de los casos de la plaga en estudio.

Combate: utilización de cualquier medio químico, cultural o biológico para mantener una plaga a una densidad menor a los daños económicos que pudiera causar.

Conspicuo: Eminente, notable, llamativo, sobresaliente, ilustre, visible.

Control (de una plaga): Supresión, contención o erradicación de una población de plagas

Curva epidemiológica: Es un gráfico estadístico utilizado en epidemiología para visualizar el inicio de un brote epidémico.

Densidad: Número de individuos de langosta (alados o saltones) por unidad de superficie.

Dependencia económica: Es una situación en la que una región o área depende de otro con un nivel productivo mayor, para su crecimiento económico, debido a sus fuertes vínculos financieros, o comerciales.

Diapausa imaginal: Es un estado fisiológico de inactividad con factores desencadenantes y terminantes bien específicos. Se usa para sobrevivir a condiciones desfavorables y predecibles, como temperaturas extremas, sequía o carencia de alimento.

Dinámica poblacional: La dinámica poblacional o de poblaciones comprende el estudio de todas las variaciones que experimenta un conjunto de individuos de una misma especie. Estos cambios se miden en términos de variabilidad de parámetros como número de individuos, crecimiento poblacional, estructura social y de edades, entre otras.

Estadio: Cada una de las etapas por las que pasa un insecto durante su ciclo biológico.

Etapas fásicas: La "langosta" durante su ciclo de vida presenta "transformaciones" (polimorfismo), los cuales debido a un incremento en la densidad poblacional modifican su comportamiento, pasando de la fase solitaria a una fase gregaria, alterándose posteriormente su color y forma. Si los grupos están compuestos por adultos alados se llaman "mangas", si sus miembros son ninfas se denominan "bandos".

Fototropismo: Corresponde a una respuesta del organismo frente al estímulo luminoso. El fototropismo positivo hace referencia al crecimiento del organismo hacia la fuente de luz, mientras el fototropismo negativo implica un crecimiento del organismo en la dirección contraria a la de la fuente lumínica.

Fluctuaciones poblacionales: Cambios en la densidad de población, que describen oscilaciones cíclicas en el número de individuos, dependiendo de variaciones estacionales de clima, disponibilidad de alimento, entre otros (factores bióticos y abióticos), que son resultado de controles intrínsecos del tamaño poblacional; estas fluctuaciones denotan una condición de equilibrio dinámico a la población.

Gregarización: Agrupación de individuos por inmigración o multiplicación en áreas delimitadas, formando bandos o mangas.

Impacto potencial: La asignación de un valor de impacto potencial es una forma de cuantificar los efectos negativos que puede tener una especie plaga, respecto de otras. Asimismo, el potencial de control es una medida relativa de la facilidad con que puede ser controlada o erradicada la especie plaga.

Índice Normalizado de Precipitación: Cuantifica el déficit de precipitación para varias escalas temporales, las cuales reflejan el impacto de la sequía en la disponibilidad de los diferentes recursos hídricos; valores SPI < -1 indican una condición de sequía, cuanto más negativo el valor, más severa la condición de sequía. Valores SPI > +1 indican condiciones más húmedas comparadas con una climatología. Para este caso se determinó usar un SPI de tres meses que ofrece una comparación de la precipitación sobre un período de tres meses específicos con los totales de precipitación del mismo período de tres meses para todos los años incluidos en el registro histórico. Refleja condiciones de humedad a corto y mediano plazo y formula una estimación estacional de la precipitación, por lo que en cuestiones agrícolas puede ser más eficaz.





Glosario de términos

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI): Es un tipo de índice de vegetación obtenido a partir de imágenes satelitales de tipo multiespectral. Es uno de los índices más utilizados para el monitoreo global del estado fitosanitario de la vegetación ya que permite identificar fácilmente las zonas de mayor densidad y salud de las coberturas vegetales. Se calcula con las bandas espectrales del rojo (RED) y el infrarrojo cercano (NIR) aplicando la siguiente fórmula:

$$NDVI = \frac{(NIR-RED)}{(NIR+RED)}$$

Los valores del NDVI se expresan desde -1.0 a 1.0, siendo los valores negativos las zonas con nubes, agua y nieve, mientras que los valores cercanos a cero corresponden a suelos desnudos. Los valores mayores a 0 indican la presencia de vegetación, desde escasa (menor a 0.2) hasta muy densa (mayor a 0.6), teniendo que los valores más altos del NDVI indican zonas con vegetación sana (verde), con buen contenido de humedad y muy densa, por ejemplo bosques o cultivos forestales bajo riego.

Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI): Es un tipo de índice de vegetación obtenido a partir de imágenes satelitales de tipo multiespectral que fue diseñado para reducir los errores del brillo del suelo en los índices de vegetación. Es más utilizado en regiones áridas o donde la vegetación está muy dispersa y es escasa. Este índice agrega un factor de ajuste del suelo (L) a las bandas espectrales del rojo (RED) y el infrarrojo cercano (NIR) mediante la siguiente fórmula:

$$SAVI = \frac{(NIR-RED)}{(NIR+RED+L)} * (1+L)$$

Al igual que el NDVI, el SAVI se expresa desde -1.0 a 1.0, siendo los valores negativos las zonas con nubes, agua y nieve, mientras que los valores cercanos a cero corresponden a suelos desnudos. Los valores mayores a 0 indican la presencia de vegetación, siendo los valores cercanos a 1 las zonas con mayor concentración de vegetación.

Índice de Humedad de la Vegetación de Diferencia Normalizada (NDWI): Es un tipo de índice de vegetación que permite resalta el contenido de humedad en la vegetación y de la capa más superficial del suelo. Se utiliza para identificar zonas agrícolas inundadas, tierras de regadío o distribución de humedales. Existen diferentes fórmulas para su cálculo, pero la más utilizada es la diseñada por Gao (1996) que utiliza las bandas espectrales del infrarrojo (NIR) y el infrarrojo cercano de onda corta (SWIR) mediante la siguiente fórmula:

$$NDWI = \frac{(NIR-SWIR)}{(NIR+SWIR)}$$

Al igual que el NDVI y el SAVI, el NDWI se expresa con valores desde -1.0 a 1.0, siendo los valores negativos las zonas con nubes, cuerpos profundos agua y nieve, mientras que los valores cercanos a cero corresponden a suelos secos y desprovistos de vegetación. Los valores mayores a 0 indican la presencia de vegetación con humedad, siendo los valores cercanos a 1 las zonas con mayor concentración de contenido de humedad en la vegetación y el suelo.

Langosta solitaria: Individuos dispersos en grandes áreas, sin movimiento definido, con baja actividad, poco voraces, con dimorfismo sexual y ninfas de color verde.

Langosta transiens: Evolución de la fase solitaria a gregaria o viceversa; los saltones con diferentes colores: verde manchado, amarillento, amarillo o rosa.

Langosta gregaria: Individuos siempre agrupados en pequeñas o medianas áreas, muy activos, con movimiento definido, muy voraces, se desplazan en mangas y/o bandas, sin dimorfismo sexual y saltones negros con rojo.

Manchones: Agrupación de langosta (adulto o ninfa) proveniente de individuos solitarios dispersos, debido a la acción de factores diversos como quema, inundación, sequía prolongada o pastoreo.

Manga: Conjunto o agrupación de langosta gregaria en estado adulto volador, capaz de desplazarse a grandes distancias, muy voraz y activa.

Nicho ecológico: El concepto ecológico de nicho describe, de forma general, el rango de condiciones ambientales, físicas y bióticas, en las cuales una especie, o más precisamente, una población local, puede vivir y perpetuarse exitosamente. Para referirnos al nicho de las especies frecuentemente hacemos énfasis en una o dos variables del ambiente, como las condiciones, el hábitat o los recursos que usan los organismos para su existencia.

Ninfa: Estado inmaduro de la langosta, semejante al adulto, pero sin alas o con primordios alares y no es fértil.

OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.

Perspectiva climática: La Perspectiva del Clima es una estimación sobre el posible comportamiento de la lluvia y la temperatura realizada con herramientas estadísticas, comparación con años análogos y análisis de los resultados de modelos globales y regionales sobre las temperaturas de la superficie del mar, los patrones de viento, presión atmosférica y la precipitación, que tienen como objetivo complementar las actividades de pronóstico.

Riesgo fitosanitario: Es la evaluación del impacto fitosanitario o agroecológico que se determina ante el supuesto de la introducción o establecimiento de un organismo en un lugar del cual no es nativo o no está establecido;

Riesgo de plagas: Probabilidad de introducción y dispersión de una plaga y magnitud de las potenciales consecuencias económicas asociadas a ella.

Saltón: Estado inmaduro de langosta denominado ninfa, recién emergida del huevecillo y sin alas.

Termotropismo: Es la reacción de curvatura provocada por la acción del calor. El calor actúa sobre el crecimiento, volviéndolo anormal, cuando el organismo está expuesto a condiciones térmicas desiguales. Puede ser negativo o positivo.

Transgregans: Individuo en la fase de transición, al pasar de la fase solitaria a la gregaria.

Transiens congregans: Forma intermedia por la que pasa la langosta cuando cambia de la fase solitaria a la fase gregaria.

Transiens disocians: Forma intermedia por la que pasa la langosta cuando cambia de la fase gregaria a la fase solitaria.

Zonas potenciales: Áreas con probabilidad de desarrollo y/o dispersión de la plaga conforme a sus requerimientos térmicos y zonas con disponibilidad de los diferentes recursos hídricos.



Contacto

Correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx

Teléfono gratuito: 800 987 987 9