



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias



Sistema de Alerta Temprana

N° 01

Enero 2023



Boletín del Sistema de
Alerta temprana del
SENASICA
para Langosta
Centroamericana
en el estado de
Yucatán

Colaboración Técnico-Científica:

Dirección en Jefe

Dirección General de Sanidad Vegetal

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Campo Experimental Bajío


Comité de Sanidad Vegetal del estado de Yucatán




El Sistema de Alerta temprana del SENASICA enfocado a la Langosta Centroamericana en el estado de Yucatán, y conforme al análisis espacial multicriterio derivado de la información de los censos realizados en campo, datos agroclimáticos favorables pronosticados y antecedentes de la plaga, se emite el siguiente boletín para los municipios identificados con riesgo.

1 Comportamiento histórico y dinámica poblacional de la plaga (2015-2022)

- Conforme al gráfico de canal endémico se observa mayor actividad poblacional de la langosta Centroamericana en el 2do semestre del ciclo anual, particularmente a partir del mes de junio. Destacan picos poblacionales importantes en los meses de enero ($n=5,773$), julio ($n=21,857$), septiembre ($n=24,583$) y diciembre ($n=12,788$). **El índice endémico de los meses de febrero a mayo se registraron en los límites de la zona de seguridad y zona de alarma, los meses de junio a diciembre se registraron en la zona de éxito.**



- Conforme al gráfico de la curva epidemiológica se observa que en el mes de agosto se aprecia un pico máximo de adultos pero mínimo de ninfas y en el mes de octubre se observa un máximo de ninfas pero mínimo de adultos. Para ambos estados biológicos es notorio el inicio poblacional de la 1ra y 2da generación.




- Con respecto al año 2022, los adultos inician el ciclo anual (Enero-marzo) con densidades poblacionales bajas ($n= 597$). Sin embargo, de abril a diciembre aumentaron las detecciones de adultos y ninfas ($n= 11,448$), con un índice endémico de $n= 2,407$. Se presentaron los primeros estadios ninfales en el mes de mayo, aumentando en octubre (pico poblacional máximo) y disminuyendo en diciembre.






- En el gráfico de la Dinámica Poblacional de los Estados Biológicos de la Langosta Centroamericana se observó que en 2020, los niveles máximos de infestación de adultos de la plaga se destacan en los meses de julio y noviembre que corresponden a la 1ra y 2da generación, respectivamente. En relación a las ninfas, en los meses de julio y septiembre se observan picos de infestación importantes, mismos que corresponden a la 1ra y 2da generación, respectivamente. Asimismo, en los meses de enero a marzo los adultos presentan, presumiblemente, la diapausa imaginal, que se caracteriza por una menor densidad poblacional derivado del termotropismo y fototropismo en respuesta a las condiciones climáticas extremas de su entorno (nicho ecológico).
- Para el 2021, se registraron poblaciones de adultos entre los meses de enero a mayo, posiblemente estos individuos pertenezcan a la 2da generación 2020 que se reactivan después de concluir la diapausa imaginal. Es importante mencionar que durante el período de diciembre de 2020 a mayo de 2021 (6 meses) no se tienen registros de estadios ninfales. Se observan niveles bajos de infestación de adultos entre los meses de julio a septiembre de 2021, correspondientes a la 1ra generación. La 2da generación se observó entre los meses de octubre de 2021 a mayo de 2022. Con respecto a las ninfas, la 1ra generación presenta fluctuaciones poblacionales poco definidas (junio a julio); la 2da generación inicia en el mes de agosto y finaliza en noviembre.
- Para el 2022, de enero a diciembre se observaron niveles bajos de infestación de adultos; registrándose de enero a mayo poblaciones de la 2da generación de 2021, así mismo, de junio a septiembre se observó la 1ra generación y de octubre a diciembre la 2da generación. Finalmente, en el caso de los estadios ninfales se registro de mayo a julio la 1ra generación, posteriormente dio inicio la 2da generación en el mes de octubre continuando hasta diciembre.





- En el gráfico de fluctuaciones poblacionales de ninfas de 2020 a 2022, se observa que **para el año 2020 la 1ra generación tuvo sus inicios en el mes de junio para concluir en el mes de julio, registrándose estadios ninfales N1-N5. La 2da generación inició en el mes de agosto para concluir en el mes de noviembre; las mayores densidades se presentaron en los meses de septiembre y octubre (pico máximo poblacional), destacando la Etapa fásica/tipo de formación: Gregaria/Bando. En esta generación se registraron instares N2-N5. Es importante mencionar que entre los meses de diciembre de 2020 y mayo de 2021 (6 meses) no se registraron estadios ninfales.**
- **Para el año 2021, la 1ra generación empezó a partir del mes junio para concluir el mes de julio; durante esta generación destaca la Etapa fásica/Tipo de formación: Solitaria/Solitario y Transciens congregans/Manchón. En esta generación se registraron instares N1-N4. La 2da generación inició en el mes de agosto para concluir en el mes de noviembre, la mayor densidad poblacional se presentó en el mes de septiembre donde destacó la Etapa fásica/Tipo de formación: Transciens congregans/Manchón y Solitaria/Solitario. En esta generación se registraron instares N1-N5.**
- **Para el año 2022, se presentaron los primeros estadios ninfales en el mes de mayo, iniciando la 1ra generación en densidades poblacionales bajas abarcando hasta el mes de julio, destacando la Etapa fásica/Tipo de formación: Solitaria/Solitario. En esta generación se registraron instares N1-N5. La 2da generación inicio a partir del mes de agosto abarcando hasta el mes de noviembre, con instares N1 a N5.**






2

Perspectiva climática asociada a la dinámica poblacional de la plaga

Con base en el análisis agroclimático y los requerimientos de temperatura e índice normalizado de precipitación, se observa que en el estado de Tamaulipas se pronostican condiciones potenciales medias y bajas para el desarrollo de la plaga en el mes de enero.




3

Situación actual de la plaga y determinación del riesgo fitosanitario asociado

Análisis y estudio de riesgo espacial-multicriterio

- Durante el mes de diciembre las poblaciones de la langosta centroamericana se identificaron en **pasto en desarrollo vegetativo**.
- No se registraron mangas.
- **Seis municipios** con acciones de control en 525 hectáreas.
- Las zonas de riesgo alto se localizan cercanas a las localidades Loché, San Francisco, Sucopó, Yaxchekú, Dzalbay, Kanxoc, Yalcobá, entre otras
- **En total, 1 municipio es el que presentan riesgo alto (Anexo 1).**





4 Impacto económico conforme al modelo espacial multicriterio

- Se identifican un municipio en riesgo alto, con cultivos agrícolas hospedantes susceptibles al mes de Enero, con aproximadamente 13 ha.



38 mil pesos

- Posible afectación a **37,870 ha de pastos y praderas con un valor de 102 Mdp.**

Posible Impacto económico en los municipios con riesgo alto.

- La dependencia económica* en promedio es de **100%** para los **municipio en riesgo alto.**

Valor de la producción de cultivos hospedantes en riesgo alto (Pesos MXN)



*Dependencia económica de cultivos hospedantes, en municipios en riesgo, respecto al valor total de su producción agrícola. Información obtenida de SIAP 2021 con cultivos de seguimiento económico a nivel municipal.

Dependencia económica de cultivos hospedantes, en el municipio en riesgo alto, respecto al valor total de su producción agrícola



Proyección de superficie sembrada de cultivos hospedantes con probable impacto en los municipios de riesgo alto

Municipio	Hospedante	Superficie sembrada (ha)	Dependencia económica
Panabá	Frijol.	13	100 %
Total general:		13	100%

-Los datos pueden estar redondeados al inmediato superior.






4

Impacto económico conforme al modelo espacial multicriterio

Impacto Potencial en Pastos y Praderas

Municipio	Superficie sembrada (ha)	Volumen de la Producción (ton)	Valor de la Producción (Mdp)
Panabá	37,870	308,172	102
Total general:	37,870	308,172	102

*Se identifica superficie de pastos y praderas con valor económicos en el municipio en riesgo alto, SIAP,2021. Los datos pueden estar redondeados al inmediato superior





5 Conclusiones y/o consideraciones

Se sugiere la emisión del comunicado del riesgo al personal técnico, con el propósito de prevenir el probable desarrollo y dispersión de la plaga en los cultivos de los municipios identificados con base a los siguientes puntos:

1. Conforme al gráfico de canal endémico se observa mayor actividad poblacional de la langosta Centroamericana en el 2do semestre del ciclo anual, particularmente a partir del mes de junio. Destacan picos poblacionales importantes en los meses de enero (n=5,773), julio (n=21,857), septiembre (n=24,583) y diciembre (n=12,788). **El índice endémico de los meses de febrero a mayo se registraron en los límites de la zona de seguridad y zona de alarma, los mes de junio a diciembre se registraron en la zona de éxito.**
2. De acuerdo con los gráficos de Curva Epidemiológica y Dinámica Poblacional de Estados Biológicos de la plaga se tiene lo siguiente:

Estado biológico	1ra Generación	Pico máximo poblacional	2da Generación	Pico máximo poblacional
Ninfas	Junio - Julio	Julio	Agosto a Noviembre	Septiembre
Adultos	Junio - Septiembre	Julio-Agosto	Octubre - Mayo	Noviembre-Diciembre

Es importante precisar que las fechas de inicio/fin de la 1ra y 2da generaciones en los estados biológicos de la langosta Centroamericana pueden variar (adelantarse o atrasarse) debido a los factores climáticos que inciden en tiempo/espacio.

3. Conforme al gráfico de Fluctuaciones Poblacionales de Estadios Ninfales 2020 a 2022; **para el año 2022, se presentó la 1ra generación de ninfas de mayo a julio, con densidades poblacionales bajas, destacando la Etapa fásica/Tipo de formación: Solitaria/Solitario. En esta generación se han registrado instares N1-N5. La 2da generación inicio a partir del mes de agosto abarcando hasta el mes de noviembre, con instares N1 a N5, destacando la Etapa fásica/Tipo de formación: Solitaria/Solitario y Transciens congregans/Manchón.**
4. **Las condiciones agroclimáticas pronosticadas durante el mes de enero para el desarrollo de la plaga son de nivel medio y bajo.** Se observa que la densidad de la plaga es baja, pero existen zonas donde las condiciones de humedad del suelo y verdor de la vegetación son favorables para su desarrollo Estas zonas se localizan principalmente en los municipios de Buctzotz Cenotillo Dzoncauich Panabá Sucilá Tekal de Venegas y Tizimín






5. **Al mes de Enero el estado de Yucatán presenta una superficie de hospedantes susceptibles en un municipio con 13 ha con un valor aproximado de 38 mil pesos**, representado en promedio a nivel municipal una dependencia económica, respecto al valor total de su producción agrícola del 100%. Destacan por su valor cultivo del frijol. Respecto a zonas de resguardo identificadas como pastos y praderas, representan una superficie de 38,870 ha con un valor estimado de 102 Mdp.





Anexo 1.- Son 1 municipio identificado con nivel de riesgo alto y presencia de cultivos agrícolas que se verían afectados en caso de dispersarse la plaga o invada dichas zonas. Además, se identifican 105 municipios en riesgo medio



Clave	Municipio	Control (Ha)	Riesgo	Localidades
31057	Panabá	16	Alto	Panabá, Loché

Clave	Municipio	Riesgo
31001	Abalá	Medio
31002	Acankeh	
31003	Akil	
31004	Baca	
31005	Bokobá	
31006	Buctzotz	
31007	Cacalchén	
31008	Calotmul	
31009	Cansahcab	
31010	Cantamayec	
31011	Celestún	
31012	Cenotillo	
31013	Conkal	
31014	Cuncunul	





Anexo 1.- Son 105 municipios identificados con nivel de riesgo medio

Clave	Municipio	Riesgo
31015	Cuzamá	Medio
31016	Chacsinkín	
31017	Chankom	
31018	Chapab	
31019	Chemax	
31020	Chicxulub Pueblo	
31021	Chichimilá	
31022	Chikindzonot	
31023	Chocholá	
31024	Chumayel	
31025	Dzan	
31026	Dzemul	
31027	Dzidzantún	
31028	Dzilam de Bravo	
31029	Dzilam González	
31030	Dzitás	
31031	Dzoncauich	
31032	Espita	
31033	Halachó	
31034	Hocabá	
31035	Hoctún	
31036	Homún	
31037	Huhí	
31038	Hunucmá	
31039	Ixil	
31040	Izamal	
31041	Kanasín	
31042	Kantunil	
31043	Kaua	
31044	Kinchil	
31045	Kopomá	
31046	Mama	
31047	Maní	
31048	Maxcanú	
31049	Mayapán	
31050	Mérida	
31051	Mocochá	
31052	Motul	
31053	Muna	
31054	Muxupip	
31055	Opichén	
31056	Oxkutzcab	
31058	Peto	
31059	Progreso	
31060	Quintana Roo	
31061	Río Lagartos	
31062	Sacalum	
31063	Samahil	
31064	Sanahcat	
31065	San Felipe	





Anexo 1.- Son 105 municipios identificados con nivel de riesgo medio

Clave	Municipio	Riesgo
31066	Santa Elena	Medio
31067	Seyé	
31068	Sinanché	
31069	Sotuta	
31070	Sucilá	
31071	Sudzal	
31072	Suma	
31073	Tahdziú	
31074	Tahmek	
31075	Teabo	
31076	Tecoh	
31077	Tekal de Venegas	
31078	Tekantó	
31079	Tekax	
31080	Tekit	
31081	Tekom	
31082	Telchac Pueblo	
31083	Telchac Puerto	
31084	Temax	
31085	Temozón	
31086	Tepakán	
31087	Tetiz	
31088	Teya	
31089	Ticul	
31090	Timucuy	
31091	Tinum	
31092	Tixcacalcupul	
31093	Tixkokob	
31094	Tixmehuac	
31095	Tixpéhual	
31096	Tizimín	
31097	Tunkás	
31098	Tzucacab	
31099	Uayma	
31100	Ucú	
31101	Umán	
31102	Valladolid	
31103	Xocchel	
31104	Yaxcabá	
31105	Yaxkukul	
31106	Yobaín	





Glosario de términos

Agroclimático: Término que hace referencia a la influencia que tienen los factores climáticos en la producción. Una vez conseguido este objetivo su aplicación garantiza la utilización racional de este conocimiento en la toma de decisiones para la optimización de la planificación agrícola.

Análisis espacial multicriterio (AEMC): El AEMC ofrece la posibilidad de definir los estándares metodológicos para el mapeo de servicios ecosistémicos, esta técnica es flexible en su forma, permite rescatar la opinión de expertos y actores sociales, la cual es espacializada a través de una plataforma de Sistemas de Información Geográfica (SIG). La evaluación multicriterio incorpora la opinión o percepción de los actores en las variables y criterios que componen el modelo de evaluación. Los criterios son seleccionados, cuidadosamente, por expertos (evitando la presencia de sesgos), para luego ser ponderados y valorados por los actores locales, mientras que los SIG permiten integrar las variables y sus criterios con atributos geoespaciales.

Consiste en identificar las variables de análisis y generar capas de información geoespacial (Esse, et al., 2014). Cada variable se pondera mediante el método de análisis jerárquico ponderado con el objetivo de identificar las variables que podrían estar determinando la presencia de la langosta centroamericana y delimitar esas zonas de interés.

Área gregarígena: Sitio donde se opera la transformación fásica en el sentido = solitaria-transiens-congregans, gregaria.

Área de invasión: Área geográfica determinada que tiene condiciones favorables para el establecimiento, cópula, reproducción y gregarización de la langosta, dondese forman las mangas y/o bandos.

Bando: Agrupamiento de ninfas de color oscuro con rojo, con desplazamiento en dirección definida, formada por individuos gregarios que pueden cubrir desde unos metros a varios kilómetros cuadrados

Canal endémico/Corredor endémico: Es la representación gráfica del número de casos que se presentan en un área en períodos definidos (semana, mes), comparado con los datos de años anteriores (5 o 7 años). Permite ver representada gráficamente la incidencia actual de una plaga sobre la incidencia histórica de la misma, dando lugar a la detección temprana de cifras anormalmente altas (o bajas) de los casos de la plaga en estudio.

Combate: utilización de cualquier medio químico, cultural o biológico para mantener una plaga a una densidad menor a los daños económicos que pudiera causar.

Conspicuo: Eminente, notable, llamativo, sobresaliente, ilustre, visible.

Control (de una plaga): Supresión, contención o erradicación de una población de plagas

Curva epidemiológica: Es un gráfico estadístico utilizado en epidemiología para visualizar el inicio de un brote epidémico.

Densidad: Número de individuos de langosta (alados o saltones) por unidad de superficie.

Dependencia económica: Es una situación en la que una región o área depende de otro con un nivel productivo mayor, para su crecimiento económico, debido a sus fuertes vínculos financieros, o comerciales.

Diapausa imaginal: Es un estado fisiológico de inactividad con factores desencadenantes y terminantes bien específicos. Se usa para sobrevivir a condiciones desfavorables y predecibles, como temperaturas extremas, sequía o carencia de alimento.

Dinámica poblacional: La dinámica poblacional o de poblaciones comprende el estudio de todas las variaciones que experimenta un conjunto de individuos de una misma especie. Estos cambios se miden en términos de variabilidad de parámetros como número de individuos, crecimiento poblacional, estructura social y de edades, entre otras.

Estadio: Cada una de las etapas por las que pasa un insecto durante su ciclo biológico.

Etapa fásica: La "langosta" durante su ciclo de vida presenta "transformaciones" (polimorfismo), los cuales debido a un incremento en la densidad poblacional modifican su comportamiento, pasando de la fase solitaria a una fase gregaria, alterándose posteriormente su color y forma. Si los grupos están compuestos por adultos alados se llaman "mangas", si sus miembros son ninfas se denominan "bandos".

Fototropismo: Corresponde a una respuesta del organismo frente al estímulo luminoso. El fototropismo positivo hace referencia al crecimiento del organismo hacia la fuente de luz, mientras el fototropismo negativo implica un crecimiento del organismo en la dirección contraria a la de la fuente lumínica.

Fluctuaciones poblacionales: Cambios en la densidad de población, que describen oscilaciones cíclicas en el número de individuos, dependiendo de variaciones estacionales de clima, disponibilidad de alimento, entre otros (factores bióticos y abióticos), que son resultado de controles intrínsecos del tamaño poblacional; estas fluctuaciones denotan una condición de equilibrio dinámico a la población.

Gregarización: Agrupación de individuos por inmigración o multiplicación en áreas delimitadas, formando bandos o mangas.

Impacto potencial: La asignación de un valor de impacto potencial es una forma de cuantificar los efectos negativos que puede tener una especie plaga, respecto de otras. Asimismo, el potencial de control es una medida relativa de la facilidad con que puede ser controlada o erradicada la especie plaga.

Índice Normalizado de Precipitación: Cuantifica el déficit de precipitación para varias escalas temporales, las cuales reflejan el impacto de la sequía en la disponibilidad de los diferentes recursos hídricos; valores SPI < -1 indican una condición de sequía, cuanto más negativo el valor, más severa la condición de sequía. Valores SPI > +1 indican condiciones más húmedas comparadas con una climatología. Para este caso se determinó usar un SPI de tres meses que ofrece una comparación de la precipitación sobre un período de tres meses específicos con los totales de precipitación del mismo período de tres meses para todos los años incluidos en el registro histórico. Refleja condiciones de humedad a corto y mediano plazo y formula una estimación estacional de la precipitación, por lo que en cuestiones agrícolas puede ser más eficaz.





Glosario de términos

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI): Es un tipo de índice de vegetación obtenido a partir de imágenes satelitales de tipo multispectral. Es uno de los índices más utilizados para el monitoreo global del estado fitosanitario de la vegetación ya que permite identificar fácilmente las zonas de mayor densidad y salud de las coberturas vegetales. Se calcula con las bandas espectrales del rojo (RED) y el infrarrojo cercano (NIR) aplicando la siguiente fórmula:

$$NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED)$$

Los valores del NDVI se expresan desde -1.0 a 1.0, siendo los valores negativos las zonas con nubes, agua y nieve, mientras que los valores cercanos a cero corresponden a suelos desnudos. Los valores mayores a 0 indican la presencia de vegetación, desde escasa (menor a 0.2) hasta muy densa (mayor a 0.6), teniendo que los valores más altos del NDVI indican zonas con vegetación sana (verde), con buen contenido de humedad y muy densa, por ejemplo bosques o cultivos forestales bajo riego.

Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI): Es un tipo de índice de vegetación obtenido a partir de imágenes satelitales de tipo multispectral que fue diseñado para reducir los errores del brillo del suelo en los índices de vegetación. Es más utilizado en regiones áridas o donde la vegetación está muy dispersa y es escasa. Este índice agrega un factor de ajuste del suelo (L) a las bandas espectrales del rojo (RED) y el infrarrojo cercano (NIR) mediante la siguiente fórmula:

$$SAVI = (NIR - RED) / (NIR - RED + L) * (1 + L)$$

Al igual que el NDVI, el SAVI se expresa desde -1.0 a 1.0, siendo los valores negativos las zonas con nubes, agua y nieve, mientras que los valores cercanos a cero corresponden a suelos desnudos. Los valores mayores a 0 indican la presencia de vegetación, siendo los valores cercanos a 1 las zonas con mayor concentración de vegetación.

Índice de Humedad de la Vegetación de Diferencia Normalizada (NDWI): Es un tipo de índice de vegetación que permite resaltar el contenido de humedad en la vegetación y de la capa más superficial del suelo. Se utiliza para identificar zonas agrícolas inundadas, tierras de regadío o distribución de humedales. Existen diferentes fórmulas para su cálculo, pero la más utilizada es la diseñada por Gao (1996) que utiliza las bandas espectrales del infrarrojo (NIR) y el infrarrojo cercano de onda corta (SWIR) mediante la siguiente fórmula:

$$NDWI = (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR)$$

Al igual que el NDVI y el SAVI, el NDWI se expresa con valores desde -1.0 a 1.0, siendo los valores negativos las zonas con nubes, cuerpos profundos de agua y nieve, mientras que los valores cercanos a cero corresponden a suelos secos y desprovistos de vegetación. Los valores mayores a 0 indican la presencia de vegetación con humedad, siendo los valores cercanos a 1 las zonas con mayor concentración de humedad en la vegetación y el suelo.

Langosta solitaria: Individuos dispersos en grandes áreas, sin movimiento definido, con baja actividad, poco voraces, con dimorfismo sexual y ninfas de color verde.

Langosta transiens: Evolución de la fase solitaria a gregaria o viceversa; los saltones con diferentes colores: verde manchado, amarillento, amarillo o rosa.

Langosta gregaria: Individuos siempre agrupados en pequeñas o medianas áreas, muy activos, con movimiento definido, muy voraces, se desplazan en mangas y/o bandas, sin dimorfismo sexual y saltones negros con rojo.

Manchones: Agrupación de langosta (adulto o ninfa) proveniente de individuos solitarios dispersos, debido a la acción de factores diversos como quema, inundación, sequía prolongada o pastoreo.

Manga: Conjunto o agrupación de langosta gregaria en estado adulto volador, capaz de desplazarse a grandes distancias, muy voraz y activa.

Nicho ecológico: El concepto ecológico de nicho describe, de forma general, el rango de condiciones ambientales, físicas y bióticas, en las cuales una especie, o más precisamente, una población local, puede vivir y perpetuarse exitosamente. Para referirnos al nicho de las especies frecuentemente hacemos énfasis en una o dos variables del ambiente, como las condiciones, el hábitat o los recursos que usan los organismos para su existencia.

Ninfa: Estado inmaduro de la langosta, semejante al adulto, pero sin alas o con primordios alares y no es fértil.

OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.

Perspectiva climática: La Perspectiva del Clima es una estimación sobre el posible comportamiento de la lluvia y la temperatura realizada con herramientas estadísticas, comparación con años análogos y análisis de los resultados de modelos globales y regionales sobre las temperaturas de la superficie del mar, los patrones de viento, presión atmosférica y la precipitación, que tienen como objetivo complementar las actividades de pronóstico.

Riesgo fitosanitario: Es la evaluación del impacto fitosanitario o agroecológico que se determina ante el supuesto de la introducción o establecimiento de un organismo en un lugar del cual no es nativo o no está establecido;

Riesgo de plagas: Probabilidad de introducción y dispersión de una plaga y magnitud de las potenciales consecuencias económicas asociadas a ella.

Saltón: Estado inmaduro de langosta denominado ninfa, recién emergida del huevecillo y sin alas.

Termotropismo: Es la reacción de curvatura provocada por la acción del calor. El calor actúa sobre el crecimiento, volviéndolo anormal, cuando el organismo está expuesto a condiciones térmicas desiguales. Puede ser negativo o positivo.

Transgregans: Individuo en la fase de transición, al pasar de la fase solitaria a la gregaria.

Transiens congregans: Forma intermedia por la que pasa la langosta cuando cambia de la fase solitaria a la fase gregaria.

Transiens disocians: Forma intermedia por la que pasa la langosta cuando cambia de la fase gregaria a la fase solitaria.

Zonas potenciales: Áreas con probabilidad de desarrollo y/o dispersión de la plaga conforme a sus requerimientos térmicos y zonas con disponibilidad de los diferentes recursos hídricos.

