



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Fitosanitario



03 de agosto de 2021



DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO

Monitor Fitosanitario

Contenido

México: Productores del municipio de Huamantla, Tlaxcala, alertaron de plaga de chapulín que pone en riesgo sus cultivos de maíz y alfalfa..... 2

Colombia: El Instituto Colombiano Agropecuario adelanta vigilancia fitosanitaria en cultivos de plátano en el departamento de Córdoba..... 3

Panamá: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario realiza acciones para contener la plaga del Huanglongbing de los cítricos (HLB)..... 4

Argentina: El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria confirmó la detección del Picudo del algodnero (*Anthonomus grandis*) en Córdoba..... 5

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO**México: Productores del municipio de Huamantla, Tlaxcala, alertaron de plaga de chapulín que pone en riesgo sus cultivos de maíz y alfalfa.**

SENASICA (2016). Chapulín.

Recientemente, a través de una nota periodística se comunicó que, productores del municipio de Huamantla, Tlaxcala, alertaron que alrededor de dos mil hectáreas de cultivo de alfalfa y maíz, principalmente, en el ejido de San Luis Huamantla, se encuentran en riesgo por la plaga de chapulín.

Indicaron que si bien, no es una situación generalizada, hay áreas en las que su presencia es mayor, sobre todo en la parte colindante con el ejido de Benito Juárez en Huamantla, Tlaxcala. Comentaron que, el problema es que el chapulín se reproduce y se dispersa rápidamente, razón por la cual ven necesaria la intervención de las autoridades sanitarias.

Asimismo, señalaron que desde años anteriores, se han efectuado reuniones para abordar específicamente este asunto y buscar una estrategia integral de control.

El chapulín es una plaga con amplia distribución. Los géneros más comunes y de mayor importancia en el país son: *Melanoplus*, *Sphenarium* y *Brachystola*, los cuales se alimentan de hojas, tallos y frutos tiernos, de granos básicos, leguminosas, hortalizas, frutales y otros.

Referencia: Diario La Jornada de Oriente. (02 de agosto de 2021). Plaga de chapulín pone en riesgo a alrededor de dos mil hectáreas de cultivo en Huamantla. Recuperado de: <https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/chapulín-pone-riesgo-cultivo-huamantla/>

FICHA 030820

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO**Colombia: El Instituto Colombiano Agropecuario adelanta vigilancia fitosanitaria en cultivos de plátano en el departamento de Córdoba.**FAO (2014). Marchitez por *Fusarium*.

Recientemente, funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), llevaron a cabo una jornada de toma de muestras de tejido vegetal para identificar la presencia o ausencia de *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* Raza 4 Tropical (Foc R4T) en los cultivos de plátano en el departamento de Córdoba.

Las actividades se realizaron en el municipio de Puerto Escondido, El Palmar, Sabalito Medio y Arriba, San José, Galápagos y El Prieto, atendiendo el plan nacional de muestreo.

De igual manera, el gerente seccional del ICA en Córdoba indicó que a nivel nacional se realiza la vigilancia fitosanitaria para descartar la presencia o ausencia de Foc R4T y los diagnósticos de laboratorio correspondientes, con la finalidad de establecer las acciones que sean necesarias para la prevención y control de la plaga, así como el manejo técnico fitosanitario en los cultivos de plátano en la región.

A la fecha, en el departamento de Córdoba se han realizado un total de 21 muestreos de tejido vegetal para diagnóstico de Foc R4T, en los municipios de Puerto Escondido, Canalete y Moñitos.

Referencia: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2 de agosto de 2021). El ICA adelanta vigilancia fitosanitaria en cultivos de plátano en Córdoba. Recuperado de: <https://www.ica.gov.co/noticias/ica-vigilancia-cultivos-platano-banano-foc>

FUS-2021-030820

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO**Panamá: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario realiza acciones para contener la plaga del Huanglongbing de los cítricos (HLB).**

CESVVER (2020). Síntomas de HLB en cítricos

De acuerdo con una nota periodística, en la provincia de Coclé en Panamá, las entidades agropecuarias están preocupadas por la dispersión de la plaga de Huanglongbing de los cítricos (HLB), la cual sigue en aumento; por lo que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), estableció un equipo técnico y científico para aplicar estrategias y

buscar soluciones a la emergencia fitosanitaria.

La provincia de Coclé es una de las regiones donde se encuentra la mayor cantidad de cítricos en Panamá, con un 46.8% de la producción nacional que equivalen a unas 6 mil 995 hectáreas cultivadas.

Investigadores del Instituto de Innovación Agropecuaria, explicaron que se está trabajando en ubicar todas las fincas donde está presente esta plaga, y se están verificando las metodologías de muestreo de los técnicos para mejorarlas, al igual que la parte de taxonomía y biología para identificar al psílido vector.

Asimismo, se hizo un llamado a las personas que tengan cítricos en traspatios, a estar atentos de los árboles, y en caso de observar síntomas dar aviso a las agencias del MIDA, quienes realizarán la inspección.

Por último, el MIDA recomienda adquirir plántulas de cítricos en viveros certificados y no trasladar material de propagación sin certificado fitosanitario para su movilización.

Referencia: TVN Noticias. (01 de agosto de 2021). Autoridades del MIDA siguen tratando de contener la plaga que afecta a cítricos. Recuperado de: https://www.tvn-2.com/nacionales/Autoridades-MIDA-tratando-contener-citricos_O_5911658821.html

16/05/2021

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO**Argentina: El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria confirmó la detección del Picudo del algodónero (*Anthonomus grandis*) en Córdoba.**

SENASICA (2016). Picudo del algodón.

De manera reciente, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (Senasa) confirmó la detección de un ejemplar de Picudo del algodónero (*Anthonomus grandis*) en la zona de Los Chañaritos en el departamento Cruz del Eje en Córdoba.

La captura de la plaga se dio a través de una trampa de la Red de Vigilancia oficial del organismo, la cual fue

confirmada por el laboratorio central. Por ende, se indicó que ya establecieron una serie de medidas preventivas para actuar de manera inmediata y evitar la dispersión de la plaga.

Durante 90 días, el Senasa intensificará las medidas fitosanitarias predeterminadas y aumentará la cantidad de trampas instaladas en la zona de la detección y su frecuencia del monitoreo.

Asimismo, se están haciendo monitoreos en los lotes con cultivo y controles en ruta de los transportes para fiscalizar el correcto encarpado.

Pese a que la provincia de Córdoba es Área Libre de la Plaga (APL), cuenta un total de 600 hectáreas de algodón para la campaña 2020/21, y Cruz del Eje es una de las zonas que mayor concentración del cultivo tiene.

A su vez, el Senasa asegura que actualmente se realizan reuniones con el Comité de Crisis y se analiza la situación y las medidas llevadas a cabo para evitar el establecimiento de la plaga y su posterior dispersión.

Referencia: Portal Infocampo. (02 de agosto de 2021). Detectaron picudo algodonerero en Córdoba y se activó un plan para frenarlo. Recuperado de: <https://www.infocampo.com.ar/detectaron-picudo-algodonerero-en-cordoba-y-se-activo-un-plan-para-frenarlo/>

INFO 03/08/2021 05:03