



AGRICULTURA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



22 de febrero de 2021



DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO

Monitor Zoonosanitario

Contenido

Colombia: ICA informó de un caso sospechoso de Fiebre Porcina Clásica (FPC) en el municipio de Venecia en el departamento de Cundinamarca..... 2

EUA: Detección de la Enfermedad Crónica Desgastante (CWD) en nueve venados cola blanca en el condado de Houston, Minnesota. 3

Malasia: Detección del primer caso de Peste Porcina Africana (PPA) en cerdos en el distrito de Pitas, estado de Sabah..... 4

China: Casos de Peste Porcina Africana (PPA) en una explotación en la provincia de Shandong..... 5

Rusia: Primer caso de Influenza Aviar (IA) subtipo H5N8 en seres humanos. 6

España: Detección del Virus de la Diarrea Epidémica Porcina (PEDV) en granjas. 7

Internacional: Seguimiento al cierre de la interfaz WAHIS y su transición a la plataforma OIE-WAHIS. 8

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO**Colombia: ICA informó de un caso sospechoso de Fiebre Porcina Clásica (FPC) en el municipio de Venecia en el departamento de Cundinamarca.**

Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: Instituto Colombiano Agropecuario.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), informó de la sospecha de un caso de Fiebre Porcina Clásica (FPC) en una explotación de traspatio en el municipio de Venecia, departamento de Cundinamarca.

Refieren que, las autoridades sanitarias atendieron y controlaron oportunamente el caso y exhortaron a los productores a vacunar a sus animales contra la enfermedad.

Señalan que, se implementan acciones de capacitación en temas relacionados con las enfermedades de control oficial, el sistema de alerta temprana y la notificación de sospecha de enfermedades con el fin de reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica.

En México, la FPC se considera una enfermedad exótica y forma parte del grupo 1 del ACUERDO mediante el cual se dan a conocer en los Estados Unidos Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos (DOF, 29/11/2018).

Referencia: Instituto Colombiano Agropecuario. (22 de febrero de 2021). En ICA refuerza la vigilancia contra la PPC en la Provincia de Sumapaz. Recuperado de <https://www.ica.gov.co/noticias/ica-refuerza-la-vigilancia-contra-la-ppc-cundinama>

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO**EUA: Detección de la Enfermedad Crónica Desgastante (CWD) en nueve venados cola blanca en el condado de Houston, Minnesota.**

Imagen representativa de la especie afectada.
<https://extincionanimal.org/venado-cola-blanca/>

El Consejo de Salud Animal de Minnesota, Estados Unidos de América, informó de la confirmación de la Enfermedad Crónica Desgastante (CWD) en nueve venados cola blanca en el condado de Houston, se trata de cinco hembras y cuatro machos. Los resultados fueron confirmados por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios.

Refieren que, son casos adicionales a la despoblación de finales de enero, donde un total de 46 animales fueron despoblados, en donde determinaron como medida de control de la enfermedad que dicha explotación no puede tener ciervos ni alces durante cinco años.

Señalan que, en la explotación se detectó por primera vez la enfermedad en un venado de cola blanca de dos años y medio, el pasado octubre de 2020.

En México, la CDW es una enfermedad exótica y está considerada dentro del grupo 1 del ACUERDO mediante el cual se dan a conocer en los Estados Unidos Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos (DOF, 29/11/2018).

De acuerdo con el módulo de consulta de requisitos zoosanitarios para importación de mercancías, se cuenta con la hoja de requisitos 106-31-2403-USA-USA para rumiantes silvestres, para exhibición y reproducción.

Referencia: Consejo de Salud Animal de Minnesota. (22 de febrero de 2021). Nine more deer added to tally of CWD positive whitetails at Houston County farm. Recuperado de:
https://www.bah.state.mn.us/news_release/nine-more-deer-added-to-tally-of-cwd-positive-whitetails-at-houston-county-farm/

ZOOT.148.005.04.22022021

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO



Malasia: Detección del primer caso de Peste Porcina Africana (PPA) en cerdos en el distrito de Pitas, estado de Sabah.



Imagen representativa de la especie afectada
<https://www.agronegocios.co/>

De acuerdo con una nota periodística, informaron de la detección del primer caso de Peste Porcina Africana (PPA) en cerdos en el distrito de Pitas, estado de Sabah, Malasia.

Refieren que, trece cerdos domésticos fueron confirmados positivos y que se están realizando pruebas de secuenciación de ADN para su confirmación.

Por lo anterior, las autoridades sanitarias, han intensificado las medidas de bioseguridad e implementado medidas contraepidémicas. Refieren que, en el mes de enero del presente año, se hallaron jabalíes y cerdos salvajes muertos en este distrito.

Señalan que, las principales zonas productoras de cerdos en el estado de Sabah son Tamparuli, Tuaran y Papar.

Referencia: Capital post (22 de febrero de 2021). African swine fever detected in Sabah. Recuperado de https://www.capitalpost.com.my/2021/02/22/african-swine-fever-detected-in-sabah/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=african-swine-fever-detected-in-sabah#.YDPbVo9Kipo
ZOOT.052.232.04.22022021

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO**China: Casos de Peste Porcina Africana (PPA) en una explotación en la provincia de Shandong.**

Imagen representativa de la especie afectada
https://agrovisual.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/porcinos-fnal_1589562624_1599135283.jpg

El Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación de Grecia notificó, ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), un foco de Peste Porcina Africana (PPA), por el motivo de “recurrencia de la enfermedad”.

El foco fue localizado en una explotación en la provincia de Shandong, donde se contabilizaron 147 animales susceptibles, 20 casos, 18 animales muertos y 129 que

tuvieron que ser sacrificados para prevenir la propagación del virus.

Asimismo el Ministerio informó que, el 11 de febrero de 2021, llevaron a cabo la identificación del patógeno. Las muestras fueron analizadas por los laboratorios nacionales de servicios veterinarios, utilizando la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa con Transcriptasa Inversa (RT-PCR)

En México, esta enfermedad tiene el estatus de exótica, por lo cual, forma parte del grupo 1 dentro del ACUERDO mediante el cual se dan a conocer en los Estados Unidos Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos (DOF, 29/11/2018).

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (20 de febrero de 2021) Peste porcina africana, China. Recuperado de: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/CUTOVER_OIE-WAHIS/CHINA_ASF_22012021.pdf

ZOOT. 2023. 0

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO



Rusia: Primer caso de Influenza Aviar (IA) subtipo H5N8 en seres humanos.



Imagen representativa de personal en granjas avícolas.
https://imagenes.20minutos.es/files/image_656_370/uploads/imagenes/2007/02/23/564656a.jpg

A través de diversas notas periodísticas, se comunicó que la responsable de la Agencia Sanitaria Rusa, Anna Popova, notificó ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) el primer caso de Influenza Aviar (IA) subtipo H5N8 en siete trabajadores de una explotación avícola en Rusia.

De acuerdo con las notas, los trabajadores contrajeron el virus por el contacto directo con las aves de corral, en donde se presentó un brote de IA el pasado diciembre de 2020.

Indican que, el contagio no ha tenido consecuencias graves para la salud, sin embargo, determinaron que se investigará más a fondo el caso para prevenir la transmisión de humano a humano.

Referencias:

Agencia de noticias AFP. (20 de febrero de 2021). Rusia dice que se detectó el primer caso de transmisión de la gripe aviar H5N8 a humanos. Vía Twitter. Recuperado de <https://twitter.com/AFP/status/1363109315226136578>

El Universal. (20 de febrero de 2021) Rusia afirma que detectó primer caso de transmisión de cepa H5N8 de gripe aviar al ser humano. Recuperado de <https://www.eluniversal.com.mx/mundo/rusia-afirma-que-detecto-primer-caso-de-transmision-de-cepa-h5n8-de-gripe-aviar-al-ser-humano>

20 Minutos. (20 de febrero de 2021). Rusia alerta a la OMS al detectar el primer caso de transmisión a humanos de la cepa H5N8 de la gripe aviar. Recuperado de <https://www.20minutos.es/noticia/4592610/0/rusia-alerta-oms-detectar-primer-caso-transmision-humanos-cepa-gripe-aviar/?autoref=true>

NDTV. MundoAgence France-Presse. (21 de febrero de 2021). Rusia informa del "primer caso mundial" de transmisión de la gripe aviar a los seres humanos. Recuperado de <https://www.ndtv.com/world-news/russia-reports-first-cases-of-bird-flu-in-humans-2374913>

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO



España: Detección del Virus de la Diarrea Epidémica Porcina (PEDV) en granjas.



Investigadores del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de León, España <https://www.animalshealth.es/fileuploads/news/universidad-leon-equipo-investigacion-ana-carvajal-coronavirus-porcino-granjas-espana-116135633571.jpg>

El Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de León, España, publicó un artículo en la revista científica *Frontiers* sobre la investigación de coronavirus entéricos porcinos en granjas españolas.

De acuerdo con la metodología, los investigadores colectaron diferentes muestras en 106 granjas porcinas de España entre los años 2017 y 2019, en donde fueron detectados brotes de diarrea.

Posteriormente, a través del análisis de las pruebas, detectaron al virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV), representando el 38.7% de los brotes positivos, es decir 41 de 106. Asimismo, confirmaron que el virus de la gastroenteritis transmisible porcina (TGEV), el virus recientemente identificados como el coronavirus entérico porcino (SeCoV) y el deltacoronavirus porcino (PDCoV) no fueron detectados durante el estudio.

Como resultado, lograron confirmar que el PEDV es una causa relevante de trastornos entéricos en porcinos en España, mientras que hasta el momento no se han detectado nuevos coronavirus emergentes, por lo cual se hará el seguimiento de estos virus para frenar su aparición y propagación.


Referencia: *Frontiers* (20 de febrero de 2021) Héctor P., Mencía O., Manuel G., Detection and genetic diversity of porcine coronavirus involved in diarrhoea outbreaks in Spain. Recuperado de: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.651999/abstract>



DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO



Internacional: Seguimiento al cierre de la interfaz WAHIS y su transición a la plataforma OIE-WAHIS.



La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) comunicó que el acceso al sistema mundial de información zoosanitaria dejará de existir para el 19 de febrero de 2020, debido a la actualización que recibirá el portal OIE-WAHIS.

Informan que, la reanudación a través de esta nueva plataforma será en aproximadamente dos semanas, asimismo, esperan con esta actualización proporcionar a los usuarios una manera más fácil y rápida para el acceso de la información, además de contar con una nueva herramienta cartográfica y mejoras en el diseño del portal.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (20 de febrero de 2021) CIERRE DE WAHIS Y TRANSICIÓN A OIE-WAHIS: DISPOSICIONES PARA LOS USUARIOS QUE CONSULTAN LA INFORMACIÓN. Recuperado de: <https://mailchi.mp/oie/closure-of-wahis-fermeture-de-wahis-cierre-de-wahis-lpsys2nd4k?e=0a680f8b55>

https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2-TransitionInfographic-Consulting_ES.pdf

https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/4-BEFOREAFTER-ES.pdf

11:00 03.22.2021