Gobierno de México

Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Zoosanitario

11 de abril de 2025

Contenido

Honduras: Situación epidemiológica del Gusano Barrenador del Ganado, con 105 nuevos casos y un acumulado de 1,207. 2

EUA: Universidad de Cornell investiga la mortalidad sin precedentes de colonias de abejas en el país. 3

Japón: Notifica casos de Influenza Equina en una explotación de équidos ubicada en la prefectura de Kumamoto. 4

Chile: Informa un caso de Anemia Infecciosa Equina en una explotación de équidos ubicada en la región de Ñuble. 5

Honduras: Situación epidemiológica del Gusano Barrenador del Ganado, con 105 nuevos casos y un acumulado de 1,207.

Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 11 de abril de 2025, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) de Honduras, a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), informó sobre la situación epidemiológica del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en el país.

Durante la semana epidemiológica N° 14 de 2025 (30 de marzo al 5 de abril), se confirmaron 105 nuevos casos, lo que elevó el total acumulado a 1,207, distribuidos en 17 departamentos. No se especificaron las especies afectadas.

La distribución geográfica de los casos nuevos por departamento es la siguiente:

Departamento	Casos nuevos	Casos acumulados
Atlántida	4	24
Choluteca	6	266
Colón	11	96
Comayagua	4	35
Copán	2	16
Cortés	2	12
El Paraíso	4	240
Gracias a Dios	38	65
Intibucá	0	9

Departamento	Casos nuevos	Casos acumulados
Francisco Morazán	4	29
La Paz	1	12
Lempira	0	15
Ocotepeque	0	1
Olancho	13	245
Santa Bárbara	3	36
Valle	3	21
Yoro	10	85
Total	**105**	**1,207**

Se observa una marcada concentración de casos nuevos en el departamento de Gracias a Dios (38 casos, 36.2% del total semanal), sugiriendo un brote activo en esta región costera. Le siguen en incidencia Olancho (13 casos) y Colón (11 casos), ambos ubicados en la región oriental del país, indicando una tendencia de mayor actividad en la zona este de Honduras.

La mayor incidencia semanal, Choluteca (266 casos), Olancho (245 casos) y El Paraíso (240 casos) presentan las mayores cargas acumuladas, representando el 62.2% del total nacional.

Referencia: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) (11 de abril de 2025). Gusano Barrenador del Ganado (GBG), semana epidemiológica N° 14 año 2025. Del 30/03/2025 al 05/04/2025.
Recuperado de: https://senasa.gob.hn/alertazoo/

EUA: Universidad de Cornell investiga la mortalidad sin precedentes de colonias de abejas en el país.

Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

La Universidad de Cornell informó que el 20 de marzo de 2025 expertos apícolas iniciaron análisis de muestras de abejas y material relacionado para identificar las causas de pérdidas sin precedentes de colonias de abejas melíferas manejadas durante este invierno en Estados Unidos, la mortalidad de colonias se hizo evidente y fue detectada cuando los apicultores comerciales preparaban el traslado de sus colmenas a California para la polinización anual de almendros.

Según una encuesta en curso realizada por la organización Project Apis m., la Federación Americana de Apicultura, la Asociación Americana de Productores de Miel y diversos programas de extensión con 234 apicultores participantes, las pérdidas recientes superan el 60% de las colonias, representando pérdidas financieras de al menos $139 millones de dólares.

De acuerdo con el especialista en entomología y director del Laboratorio Dyce para Estudios de Abejas en Cornell, advierte que será la mayor pérdida de colonias de abejas melíferas en la historia de Estados Unidos agravando la situación de apicultores que ya enfrentaron tasas de pérdidas del 70-100% durante los últimos 12 meses. Mientras el Laboratorio de Investigación de Abejas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Maryland analiza muestras de colmenas vivas y muertas para detectar parásitos y virus; indicaron que los recortes presupuestarios y el alto costo de análisis de pesticidas llevaron a solicitar ayuda al Laboratorio de Ecología Química de Cornell. El equipo utilizará espectrometría de masas para analizar 500 muestras (50 semanales) e identificar residuos químicos, con un costo de $120 por muestra financiado por un donante anónimo.

Los resultados de estos análisis no estarán disponibles por al menos un mes. Un precedente similar ocurrió hace dos años en Florida, donde los apicultores experimentaron pérdidas de hasta el 90% de sus colonias. Las investigaciones preliminares de aquel incidente, cuyos resultados serán publicados próximamente, apuntan a los pesticidas neonicotinoides utilizados para controlar el psílido asiático de los cítricos en naranjos como los principales responsables.

Referencia: Universidad de Cornell (20 de marzo de 2025) Cornell to help pinpoint cause of massive honeybee die-offs
Recuperado de: https://news.cornell.edu/stories/2025/03/cornell-help-pinpoint-cause-massive-honeybee-die-offs
https://www.projectapism.org/pam-e-news-sign-up
https://t.co/eNbayswk8v
https://cals.cornell.edu/pollinator-network/beekeeping

Japón: Notifica casos de Influenza Equina en una explotación de équidos ubicada en la prefectura de Kumamoto.

Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 11 de abril de 2025, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada" debido a la detección de casos de Influenza Equina, en una explotación de équidos ubicada en la localidad de Kikuyo, prefectura de Kumamoto.

De acuerdo con el informe, se indica que el evento continúa en curso, especificando lo siguiente:

Prefectura	Lugar	Animales susceptibles	Casos
Kumamoto	Kikuyo	519 Équidos	9

El agente patógeno fue identificado por el Laboratorio del Centros de Servicios de Higiene del Ganado, mediante la prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa de retrotranscripción (RT-PCR), el genotipado está en curso.

Las medidas de control aplicadas fueron: desinfección, restricción de la movilización, cuarentena, pruebas diagnósticas tamiz y vacunación.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (11 de abril de 2025). Influenza Equina, Japón. Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/6420

Chile: Informa un caso de Anemia Infecciosa Equina en una explotación de équidos ubicada en la región de Ñuble.

Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 10 de abril de 2025, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Primera aparición en una zona o un compartimento" debido a la detección de un caso de Anemia Infecciosa Equina (AIE) en una explotación de équidos ubicada en la localidad de Quillón, región de Ñuble.

De acuerdo con el informe, se indica que el evento continúa en curso, especificando lo siguiente:

Región	Lugar	Animales susceptibles	Casos
Ñuble	Quillón	7 Équidos	1

El agente patógeno fue identificado por el Laboratorio Lo Aguirre del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) mediante la prueba diagnóstica de Coggin.

Las medidas de control aplicadas fueron: vigilancia dentro y fuera de la zona de restricción, desinfección, cuarentena, trazabilidad, sacrificio sanitario, y desinfestación.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (10 de abril de 2025). Anemia Infecciosa Equina. Chile Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/6417?fromPage=event-dashboard-url

Gobierno de México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Peste Porcina Africana

11 de abril de 2025

Monitor de Peste Porcina Africana

Contenido

República Dominicana: Informan afectación de Peste Porcina Africana a 72 explotaciones de traspatio en diversas localidades del país. 2

Rumania: Informa nuevos casos de Peste Porcina Africana, en cerdos domésticos y jabalís de diversas localidades del país. 3

Internacional: FAO actualiza informe de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana, en Asia y el Pacífico. 4

República Dominicana: Informan afectación de Peste Porcina Africana a 72 explotaciones de traspatio en diversas localidades del país.

Imagen representativa de productos y especie afectada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 10 de abril de 2025, diversos medios de comunicación reportaron que el director general de ganadería informó que, desde principios de este año, los rebrotes de Peste Porcina Africana (PPA) han afectado a 72 explotaciones de traspatio ubicadas en diversas localidades del país.

Las zonas más afectadas incluyen a la localidad de Guanábano en La Vega, Guanuma en Monte Plata y El Pino en Dajabón, entre otras.

Señalaron que aunque estos rebrotes son menos graves que los registrados en 2021, se ha observado un aumento en los últimos 20 días. Las autoridades destacan que la tasa de positividad se mantiene por debajo del 1%, lo que evidencia la efectividad de las medidas preventivas implementadas. En respuesta a la situación, el Gobierno está preparando un plan de compensación económica para los porcicultores afectados, el cual será anunciado próximamente por el presidente.

El ministro de agricultura recordó que la PPA es un virus endémico y que los rebrotes pueden ocurrir de manera esporádica. Además, se ha reforzado la vigilancia sanitaria en un radio de 20 kilómetros a lo largo de la frontera con Haití y en las provincias más vulnerables, como Dajabón, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, La Vega y Espaillat.

Referencia: RCC Noticias (10 de abril de 2025). Rebrotes de peste porcina africana afectan a 72 criadores de cerdos en varias provincias
Recuperado de: https://rccnoticias.com.do/rebrotes-de-peste-porcina-africana-afectan-a-72-criadores-de-cerdos-en-varias-provincias-333221/
Recuperado de: https://dominicantoday.com/dr/health/2025/04/11/african-swine-fever-affects-72-pig-farmers-in-dominican-provinces/
Recuperado de: https://informativosta.com.do/2025/04/10/rebrotes-de-peste-porcina-africana-afectan-a-mas-de-70-criadores-en-cuatro-provincias/
Recuperado de: https://telenoticias.com.do/los-rebrotes-de-la-ppa-afectan-a-unos-72-criadores-de-cerdos/
Recuperado de: https://redsocialcodi.com/rebrotes-de-peste-porcina-africana-afectan-a-72-criadores-de-cerdos-en-varias-provincias/

Rumania: Informa nuevos casos de Peste Porcina Africana, en cerdos domésticos y jabalís de diversas localidades del país.

Imagen representativa de la especie involucrada. Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 11 de abril de 2025, la Autoridad Nacional Sanitaria, Veterinaria y de Inocuidad de los Alimentos de Rumania, realizó el informe de seguimiento N° 177, ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada", debido a nuevos casos de Peste Porcina Africana (PPA), en cerdos domésticos y jabalís ubicados en diversas localidades del país.

De acuerdo con el informe, el evento continúa en curso y se específica que:

- En una explotación comercial de cerdos, ubicada en el condado de Argeș (localidad de Costesti), se confirmaron 17,796 casos positivos de la enfermedad, de los cuales 126 animales murieron y 95 fueron sacrificados.
- En una explotación de cerdos de traspatio ubicada en la localidad de Pestera (ciudad de Constanța), se confirmaron 15 casos positivos de la enfermedad, 2 animales murieron y 13 fueron sacrificados.
- En una explotación de cerdos un traspatio ubicada en el distrito de Mureș (localidad de Cinta), se registró un total de 25 casos positivos, de los cuales 6 animales murieron y los otros 19 fueron sacrificados.
- Otro traspatio situado en la ciudad de Botoșani (localidad de Plopenii Mici), 5 cerdos fueron sacrificados a causa de la enfermedad.
- En la localidad de Lisna, un traspatio reportó 3 casos de PPA, de los cuales 2 fueron sacrificados y 1 murió.
- Finalmente, se reportaron 10 casos de PPA en jabalís, distribuidos en las localidades de Sarlota, Garbou, Mirsid, Ileanda, Vingard, Ibanesti, Sendriceni y Mica. De estos, 9 jabalís murieron y 1 fue sacrificado.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (11 de abril de 2025). Peste Porcina Africana, Rumania. Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/3721?fromPage=event-dashboard-url

Internacional: FAO actualiza informe de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana, en Asia y el Pacífico.

Imagen representativa de la especie involucrada. Créditos: https://www.istockphoto.com/

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) actualizó, con corte al 3 de abril de 2025, su informe sobre la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana (PPA) en la región de Asia y el Pacífico. Este informe se basa en datos proporcionados por los Ministerios de Agricultura y Ganadería, artículos científicos y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Al respecto, se mencionan los siguientes datos:

- **Corea del Sur:** Ocho de los últimos diez casos de jabalís infectados notificados entre el 27 de febrero y el 12 de marzo se encontraron en la ciudad de Andong y el condado de Uiseong.
- **Filipinas:** Al 14 de marzo de 2025, 39 localidades de 27 municipios en 13 provincias reportaron casos activos de PPA.
- **Malasia:** 58 granjas se han visto afectadas por la enfermedad.
- **Vietnam:** Hasta el 26 de marzo, se habían notificado 77 brotes en 22 provincias y ciudades, con 4,494 cerdos muertos o sacrificados. Además, al 28 de marzo, se confirmaron brotes en la provincia de Ha Tinh, específicamente en los distritos de Cam Xuyen, Thach Ha, Huong Khe y la ciudad de Ha Tinh.
- **India:** El brote resurgió en los distritos de Lawngtlai y Lunglei, en el estado de Mizoram. El 26 de marzo, también se informaron brotes en el distrito de Sonitpur, en el estado de Assam.

La FAO recomendó intensificar los controles fronterizos y aduaneros durante los próximos festivales importantes en la región, como el Qingming en China y el sudeste asiático (4 de abril), el Año Nuevo en varios países del sudeste y sur de Asia, como el Songkran en Tailandia (13 de abril), y la Pascua (20 de abril). Estos eventos suelen generar un aumento significativo en los viajes internacionales, por lo que se recomienda un control riguroso del equipaje y los paquetes de los pasajeros en las oficinas de correos internacionales.

Referencia: Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (11 de abril de 2025). African swine fever (ASF) situation update in Asia & Pacific
Recuperado de: https://www.fao.org/animal-health/situation-updates/asf-in-asia-pacific