Gobierno de México

Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Zoosanitario

12 de febrero de 2025



Monitor Zoosanitario

Dirección en Jefe

Contenido

Costa Rica: Situación epidemiológica actual de Gusano Barrenador del Ganado en animales, con 301 nuevos casos. 2

Japón: Informan de nuevo foco de Fiebre Porcina Clásica, en una explotación comercial de cerdos ubicada en la prefectura de Gunma. 3

China: Informa dos nuevos casos de Influenza Aviar subtipo H9N2, en humanos residentes de la provincia de Hunan. 4

EUA: Alerta de restricción para productos avícolas que se originan o transitan por nuevas áreas de Australia. 5

Alemania: Anuncia el inicio del levantamiento gradual de las restricciones implementadas por el brote de Fiebre Aftosa. 6

EUA: Informa primer caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1, en una parvada de aves de traspatio en el Condado de Mason. 7

Costa Rica: Situación epidemiológica actual de Gusano Barrenador del Ganado en animales, con 301 nuevos casos.



Casos de miasis de GBG por especie.
Créditos: SENASA

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) de Costa Rica a través de su cuenta oficial de Facebook publicó su informe de actualización correspondiente a la semana epidemiológica (SE) N.° 5, del 26 enero al 1 de febrero de 2025, con 301 nuevos casos de miasis por Gusano Barrenador del Ganado (GBG) (*Cochliomyia hominivorax*) registrados en el país.

De acuerdo con el informe, durante la SE N.° 5, se reportó un total acumulado de 14,614 casos.

La distribución de los casos revela una alta concentración en algunos cantones, siendo Limón (58), Pérez Zeledón (28), Puntarenas (28), Turrialba (20) y Osa (20) los de mayor número de nuevos casos, lo que sugiere áreas con alta infestación que requieren medidas urgentes de control. En cuanto a la afectación por especie, los bovinos son los más impactados, con 11,891 casos, representando el 81% del total, lo que confirma su rol como principal huésped del parásito. Le siguen los caninos, con 1,376 casos (9%), especialmente en áreas rurales, y otras especies como ovinos (466 casos), porcinos (302), equinos (269) y caprinos (116), todas afectadas en menor proporción.

Entre las especies menos comunes, se reportaron 71 casos en felinos, particularmente en áreas rurales. Asimismo, se registraron 52 casos en humanos, lo que confirma el impacto zoonótico de la enfermedad y la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica en la población. La fauna silvestre también juega un papel en la propagación del parásito, con 22 casos en mamíferos terrestres, 16 en aves silvestres, 2 en mulas y 18 en bubalinos, 5 en otros mamíferos, 3 en conejos y 2 en aves silvestres, lo que sugiere un posible papel de algunas especies en la transmisión o dispersión del parásito.

Referencia: Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) (6 de febrero de 2025). Actualización de los casos nuevos de gusano barrenador, semana epidemiológica #5 del 2025 (del 26 de enero al 1° de febrero).
Recuperado de:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1045446534284473&id=100064574086501&rdid=PrBEe3sBPFleHT1d#

Japón: Informan de nuevo foco de Fiebre Porcina Clásica, en una explotación comercial de cerdos ubicada en la prefectura de Gunma.

Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 12 de febrero de 2025, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, realizó el informe de seguimiento N°33 ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada" debido a un nuevo foco de Fiebre Porcina Clásica (FPC), en una explotación comercial de cerdos ubicada en la prefectura de Gunma.

De acuerdo con el reporte, mencionaron que el evento continúa en curso y se puntualizó lo siguiente:

Prefectura	Lugar	Animales susceptibles	Casos	Animales Eliminados
Gunma	Ciudad de Maebashi	5529	6	5529

El agente patógeno fue identificado por el laboratorio nacional del Instituto de Salud Animal y el laboratorio local del Centro de Servicio de Higiene Ganadero, mediante las pruebas diagnósticas de reacción en cadena de la polimerasa de retrotranscripción (RT-PCR) y secuenciación de genes.

Se señala que las medidas de control aplicadas fueron: cuarentena, inspección ante y post-mortem, trazabilidad, sacrificio de animales, desinfección, control de fauna silvestre, vigilancia dentro y fuera de la zona de restricción, y eliminación oficial de cadáveres, subproductos y desechos de origen animal.

Por último, se menciona que desde el 16 de febrero de 2024 se lleva a cabo la vacunación en cerdos domésticos en 46 prefecturas: Aichi, Akita, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu, Gunma, Hiroshima, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto, Kyoto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara, Niigata, Oita, Okayama, Osaka, Okinawa, Saga, Saitama, Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokyo, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (12 de febrero de 2025). Fiebre Porcina Clásica, Japón. Recuperado: https://wahis.woah.org/#/in-review/4382?fromPage=event-dashboard-url

China: Informa dos nuevos casos de Influenza Aviar subtipo H9N2, en humanos residentes de la provincia de Hunan.

Imagen representativa del virus de Influenza
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 11 de febrero de 2025, el Centro de Protección de la Salud de Hong Kong publicó su informe de actualización de la semana epidemiológica N.° 6 (del 2 al 8 de febrero de 2025), en el que se reportaron dos nuevos casos de infección humana por el virus de la Influenza Aviar tipo A subtipo H9N2.

El primer caso correspondió a un niño de 2 años, con síntomas que comenzaron el 27 de diciembre, lo que elevó el total de casos de 2024 a 18.

El segundo paciente fue un adolescente de 15 años, cuyos síntomas iniciaron el 8 de enero, marcando así el primer caso del virus H9N2 en 2025. Ambos casos se registraron en la provincia de Hunan.

El informe no precisó si los pacientes tuvieron contacto con aves de corral o acuáticas, ni si otros miembros de sus familias o contactos cercanos presentaron síntomas.

El virus H9N2 circula principalmente en aves de corral en Asia, donde se han reportado infecciones esporádicas, sobre todo en niños, usualmente tras la exposición a estas aves. No se ha registrado transmisión sostenida del virus entre personas.

Referencia: Centre for Health Protection (11 de febrero de 2025). Avian Influenza Report volume 21, number 6 Reporting period: Feb 2, 2025 – Feb 8, 2025 (Week 6)
Recuperado de:
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/2025_avian_influenza_report_vol21_wk06.pdf

EUA: Alerta de restricción para productos avícolas que se originan o transitan por nuevas áreas de Australia.



Imagen representativa de productos avícolas
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 12 de febrero de 2025, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), a través de su Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), emitió una alerta sobre las restricciones a la importación de productos avícolas de ciertas áreas de Australia debido a brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP).

Las zonas afectadas incluyen Meredith y Terang en Victoria (desde mayo 2024), la cuenca del Gran Sydney en Nueva Gales del Sur (desde junio 2024), el Territorio de la Capital Australiana (desde junio 2024) y más recientemente Strathbogie en Victoria (desde el 8 de febrero de 2025).

Las restricciones prohíben la importación de aves vivas comerciales, ratites, huevos para incubar y productos avícolas no procesados provenientes de estas zonas. Para los productos procesados, se requiere un permiso de importación y certificación veterinaria que confirme el tratamiento adecuado según los requisitos de APHIS.

Sin embargo, se establecen excepciones para aves mascotas y de zoológico, palomas y pichones, que pueden importarse bajo permiso especial y cuarentena de 30 días en centros designados.

APHIS considera que las áreas fuera de las zonas restringidas y de control no están afectadas por la IAAP y, por lo tanto, no están sujetas a restricciones, permitiendo un enfoque regionalizado para gestionar el riesgo comercial.

Referencia: Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (12 de febrero de 2025). Import Alert: HPAI restrictions for Avian Commodities Originating from or Transiting Through Australia
Recuperado de: https://content.govdelivery.com/accounts/USDAAPHIS/bulletins/3d1fad1

Alemania: Anuncia el inicio del levantamiento gradual de las restricciones implementadas por el brote de Fiebre Aftosa.

Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 11 de febrero de 2025, el Ministerio de Agricultura, Alimentación, Medio Ambiente y Protección del Consumidor del Estado de Brandeburgo anunció el inicio del levantamiento gradual de las restricciones implementadas por el brote de Fiebre Aftosa (FA).

El veterinario estatal y Director del Centro de Crisis, la zona de protección de 3 kilómetros alrededor del foco inicial en una explotación de búfalos de agua en Hönow ha sido reclasificada como zona de vigilancia, lo que flexibiliza el régimen de control para las granjas en esta área, aunque se mantiene la prohibición de movilización de animales de pezuña hendida hacia y desde la zona de vigilancia.

Este levantamiento sigue los plazos establecidos por la legislación de la Unión Europea (UE), iniciando el conteo el 25 de enero de 2025, cuando se verificó la limpieza y desinfección preliminar del establecimiento afectado. La normativa permite levantar la zona de protección tras 15 días, mientras que la zona de vigilancia podrá ser liberada 30 días después de la verificación de la desinfección, aproximadamente el 25 de febrero.

Para recuperar el estatus internacional de "Libre de FA", se mantendrá una zona de restricción reducida con medidas de vigilancia hasta el 11 de abril. Esta estrategia permitirá que las áreas fuera de esta zona, incluidos los otros 14 estados federales y las zonas no afectadas de Berlín y Brandeburgo, recuperen su estatus comercial sin restricciones. La decisión final sobre el restablecimiento del estatus "Libre de FA" para Alemania dependerá de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Referencia: Ministerio de Agricultura, Alimentación, Medio Ambiente y Protección del Consumidor del Estado de Brandeburgo. (11 de febrero de 2025). Land Brandenburg beginnt heute mit der schrittweisen Aufhebung der mit der Maul- und Klauenseuche verbundenen Restriktionen.
Recuperado de: https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/aktuelles/presseinformationen/detail/~11-02-2025-aufhebung-der-mit-der-maul-und-klauenseuche-verbundenen-restriktionen

EUA: Informa primer caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1, en una parvada de aves de traspatio en el Condado de Mason.

Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 11 de febrero de 2025, el Departamento de Agricultura del Estado de Washington (WSDA) informó el primer caso, de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) subtipo H5N1 en el Condado de Mason, detectado en una parvada de aves de traspatio.

De acuerdo con el informe, personal oficial fue notificado de aves enfermas, asimismo, el pasado el 10 de febrero fueron confirmados los resultados de laboratorio.

Este caso se suma a un total de 55 parvadas afectadas desde mayo de 2022, de las cuales 3 son comerciales y 52 de traspatio. El contacto con aves acuáticas silvestres es identificado como el principal factor de riesgo. El WSDA ha establecido zonas de vigilancia de 10 kilómetros alrededor de cada detección y ha implementado un sistema de reporte en línea para propietarios de aves en estas áreas.

Se han recomendado medidas de bioseguridad mejorada, que incluyen resguardar las aves, restringir el acceso a fuentes de agua frecuentadas por aves silvestres, limpiar las instalaciones, limitar la entrada de visitantes y evitar compartir equipos. Además, se ha establecido una línea directa para reportar casos sospechosos y protocolos para el manejo de aves muertas, que incluyen el doble embolsado y refrigeración para su muestreo, así como medidas para prevenir el acceso de aves carroñeras y evitar la propagación del virus.

Este evento subraya la importancia de mantener una vigilancia continua y aplicar rigurosas medidas de bioseguridad para prevenir y controlar la propagación de la IAAP.

Referencia: Departamento de Agricultura de Washington (10 de febrero de 2025). WSDA confirms HPAI in Mason County Recuperado de: https://content.govdelivery.com/accounts/WAAGR/bulletins/3d1c655

Gobierno de México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Peste Porcina Africana

12 de febrero de 2025



Monitor de Peste Porcina Africana

Dirección en Jefe

Contenido

Croacia: Notifica nuevo caso de Peste Porcina Africana, en un jabalí ubicado en el condado de Vukovarsko-Srijemska. 2

Alemania: Informa nuevo caso de Peste Porcina Africana, en un jabalí ubicado en el distrito de Bautzen, estado de Sajonia. 3

Moldavia: Informa nuevos casos de Peste Porcina Africana, en cerdos criados en libertad en diversas localidades del país. 4

Internacional: FAO actualiza informe de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana, en Asia y el Pacífico. 5

Grecia: Informa nuevos casos de Peste Porcina Africana en jabalís, ubicados en la ciudad de Drama. 6

Estonia: Informa nuevo caso de Peste Porcina Africana, en un jabalí ubicado en la ciudad de Pärnu. 7

Dirección en Jefe

Croacia: Notifica nuevo caso de Peste Porcina Africana, en un jabalí ubicado en el condado de Vukovarsko-Srijemska.

Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 12 de febrero de 2025, el Ministerio de Agricultura de Croacia, realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de una "Recurrencia de una enfermedad erradicada" debido a la detección de un caso de Peste Porcina Africana (PPA) en un jabalí ubicado en el condado de Vukovarsko-Srijemska.

De acuerdo con la notificación, evento continúa en curso, y se puntualiza lo siguiente:

- En la zona de protección XVI/11 Spačva, se registró la muerte de un jabalí a causa de la enfermedad.

Se menciona que el agente patógeno fue identificado por el Laboratorio del Instituto Veterinario, mediante la prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Las medidas sanitarias aplicadas fueron: desinfección, eliminación oficial de productos, subproductos y desechos de origen animal, matanza selectiva y eliminación, restricción de la movilización, inspección ante y post-mortem, vigilancia dentro y fuera de la zona de restricción, y zonificación.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (12 de febrero de 2025). Peste Porcina Africana, Croacia. Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/6260?fromPage=event-dashboard-url

Alemania: Informa nuevo caso de Peste Porcina Africana, en un jabalí ubicado en el distrito de Bautzen, estado de Sajonia.

Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 11 de febrero de 2025, la Asociación de Criadores de Cerdos de Alemania (ISN) informó sobre la detección de un nuevo caso de Peste Porcina Africana (PPA) en un jabalí ubicado en el distrito de Bautzen (estado de Sajonia), después de casi seis meses sin detecciones de la enfermedad.

El caso fue identificado en un jabalí en el municipio de Königswartha el 26 de enero de 2025, y el diagnóstico fue confirmado por el Instituto Estatal de Sanidad Animal de Sajonia y el Laboratorio Nacional de Referencia.

Este brote impide la reducción de la zona de restricción que se había previsto para abril de 2025. Las restricciones de protección continúan vigentes en la zona de exclusión 2, y se están llevando a cabo búsquedas de cadáveres de animales con drones para evaluar la extensión de la situación.

Los porcicultores en la zona deben notificar a las autoridades sobre sus rebaños y cumplir con estrictas medidas de bioseguridad en el transporte de animales.

El ISN destacó que este caso subraya la necesidad de adoptar un nuevo enfoque para el manejo de la PPA, con un enfoque en reducir al máximo los daños económicos derivados de las restricciones. Además, se hace un llamado al gobierno federal para que tome medidas urgentes y adapte las directrices actuales para combatir la enfermedad de manera eficaz.

Referencia: Asociación de Criadores de Cerdos de Alemania (ISN) (11 de febrero de 2025). Rückschlag bei ASP-Bekämpfung in Sachsen: Neuer ASP-Fall bei Wildschweinen
Recuperado de: https://www.schweine.net/news/rueckschlag-bei-asp-bekaempfung-in-sachsen.html

Moldavia: Informa nuevos casos de Peste Porcina Africana, en cerdos criados en libertad en diversas localidades del país.



Imagen representativa de la especie involucrada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 12 de febrero de 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria de Moldavia realizó el informe de seguimiento N° 12, ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada", debido a nuevos casos de Peste Porcina Africana (PPA), en un cerdo criado en libertad, ubicado en el distrito de Ialoveni, y en un jabalí de la ciudad de Anenii Noi.

De acuerdo con el informe, el evento continúa en curso; especificándose lo siguiente:

- En la localidad de Răzeni (distrito de Ialoveni), se reportó la muerte de 1 cerdo a causa de PPA.
- En la localidad de Geamăna (ciudad de Anenii Noi), 1 jabalí murió a causa de la enfermedad.

El agente patógeno fue identificado en el Centro Republicano de Diagnóstico Veterinario (RVDC), mediante la prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR).

Se indica que las medidas sanitarias aplicadas fueron: desinfección, restricción de la movilización, cuarentena, zonificación, y la eliminación oficial de productos, subproductos y desechos de origen animal.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (12 de febrero de 2025). Peste Porcina Africana, Moldavia. Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/6092?fromPage=event-dashboard-url

Internacional: FAO actualiza informe de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana, en Asia y el Pacífico.



Imagen representativa de la especie involucrada. Créditos: https://www.istockphoto.com/

Con corte al 6 de febrero de 2025, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), actualizó su informe sobre la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana (PPA) en la región de Asia y el Pacífico, el cual recopila datos de Ministerios de Agricultura y Ganadería, artículos científicos y de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Al respecto, se mencionan los siguientes datos:

- **Corea del Sur:** El último brote de este año se registró el 28 de enero de 2025 en una explotación con 4,450 cerdos, ubicada en la ciudad de Yangju (provincia de Gyeonggi-do).
- **Filipinas**: Al 31 de enero de 2025, 130 localidades en 40 municipios de 15 provincias reportaron casos activos de PPA.
- **Indonesia**: En el distrito de Nabire, en la provincia de Papúa Central, el número de muertes por PPA sigue en aumento. Entre el 14 de octubre de 2024 y el 1 de febrero de 2025, se registraron 2,674 cerdos muertos. Además, a finales de enero, en la provincia de Sumatra del Norte, aproximadamente 800 cerdos fallecieron, con sospecha de infección por PPA. Se tomaron muestras de sangre y de las instalaciones para su análisis y confirmación.
- **Vietnam**: El 19 de enero de 2025, en la provincia de Thai Binh, las muestras de un rastro de cerdos resultaron positivo para PPA. Asimismo, el primer brote de este año se confirmó el 1 de febrero en el distrito de Tran Van Thoi (provincia de Ca Mau). Finalmente, se menciona que, se realizó la carga de 2043 datos en el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS) de la Organización Mundial de Sanidad Animal sobre brotes registrados de enero de 2022 a junio de 2024.
- **India:** Durante enero de 2025, no se reportaron muertes ni sacrificios de cerdos a causa de la PPA.

Referencia: Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (12 de febrero de 2025). African swine fever (ASF) situation update in Asia & Pacific
Recuperado de: https://www.fao.org/animal-health/situation-updates/asf-in-asia-pacific

Grecia: Informa nuevos casos de Peste Porcina Africana en jabalís, ubicados en la ciudad de Drama.

Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 12 de febrero de 2025, el Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación de Grecia, realizó el informe de seguimiento N° 52 ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada", debido a nuevos casos de Peste Porcina Africana en jabalís, ubicados en la ciudad de Drama.

De acuerdo con el reporte, se menciona que el evento epidemiológico continúa en curso y se especifica lo siguiente:

- En la localidad de Kato Nevrokopi, se registró la muerte de 2 jabalís debido al virus de la PPA.

El agente patógeno fue identificado por el Departamento de Virología del Centro Veterinario de Atenas, mediante la prueba diagnósticas de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR).

Por último, se indica que las medidas de control aplicadas fueron: control de fauna silvestre reservorio, desinfección, restricción de la movilización, vigilancia dentro y fuera de la zona de restricción, trazabilidad, zonificación, matanza selectiva y eliminación.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (12 de febrero de 2025). Peste Porcina Africana, Grecia. Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/4849?fromPage=event-dashboard-url

Estonia: Informa nuevo caso de Peste Porcina Africana, en un jabalí ubicado en la ciudad de Pärnu.

Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 11 de febrero de 2025, el Ministerio de Asuntos Rurales de Estonia, realizó el informel de seguimiento N° 2 ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada", debido a un nuevo caso de Peste Porcina Africana (PPA), en un jabali ubicado en la ciudad de Pärnu.

De acuerdo con el reporte, se menciona que el evento continúa en curso y se puntualiza lo siguiente:

- En la localidad de Lanksaare, se sacrificó 1 jabalí, a causa de la PPA.

El agente patógeno fue identificado por el Centro Nacional de Investigación de Laboratorio y Evaluación de Riesgos (LABRIS), mediante la prueba diagnósticas de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR)

Finalmente, se señala que la medida sanitaria aplicada fue la eliminación oficial de productos, subproductos y desechos de origen animal.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (11 de febrero de 2025). Peste Porcina Africana, Estonia. Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/6240?fromPage=event-dashboard-url