Gobierno de México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Zoosanitario

20 de marzo de 2025

Monitor Zoosanitario

Dirección en Jefe

Contenido

EUA: Anuncia la ampliación de evaluaciones y auditorías de bioseguridad para productores avícolas comerciales para controlar la Influenza Aviar. 2

EUA: Informa situación actual de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en ganado lechero, con nuevas detecciones en Idaho y Nevada. 3

Corea del Sur: Informa tres nuevos focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad, en explotaciones de gallinas de postura. 4

Tailandia: Notifica casos de Rabia en animales de diversas especies ubicados en varias provincias. 5

Santa Helena: Notifica casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1, en aves silvestres ubicadas en la Isla Gough. 6

Armenia: Notifica caso de Rabia, en un perro doméstico ubicado en la provincia de Shirak. 7

México: Informa nuevos casos de Gusano Barrenador del Ganado, en diversas especies domésticas ubicadas en el estado de Chiapas. 8

EUA: Anuncia la ampliación de evaluaciones y auditorías de bioseguridad para productores avícolas comerciales para controlar la Influenza Aviar.

Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 19 de marzo de 2025, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), a través del Servicio de Inspección y Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), anunció la expansión de evaluaciones y auditorías de bioseguridad para los productores avícolas comerciales. Esta medida se toma como parte de un esfuerzo proactivo para combatir la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) y, al mismo tiempo, reducir los precios de los huevos.

La iniciativa fue impulsada por el reciente anuncio de la Secretaria de Agricultura sobre fondos de emergencia destinados a apoyar directamente a los agricultores y ganaderos de Estados Unidos, como parte de una estrategia más amplia para mitigar los efectos de la crisis sanitaria.

El APHIS liderará dos programas de evaluación dirigidos a los productores avícolas comerciales que aún no han sido afectados por la IAAP. El primero de estos programas se enfoca en la bioseguridad relacionada con la vida silvestre. En este caso, el Servicio de Vida Silvestre realizará inspecciones en las granjas y proporcionará recomendaciones para mejorar las instalaciones y las técnicas de manejo de fauna, incluyendo la identificación de peligros, el monitoreo de la abundancia de fauna y la gestión de la vida silvestre en estas propiedades.
El segundo programa se centra en la mejora de la bioseguridad a través de incentivos. En este caso, el APHIS trabajará directamente con los productores para revisar sus planes de bioseguridad, evaluando las medidas físicas existentes y ayudando a identificar posibles brechas que podrían permitir la introducción de la enfermedad. El objetivo es mitigar esos riesgos antes de que ocurran brotes.

De acuerdo con la Norma Final Provisional de diciembre de 2024, las instalaciones avícolas comerciales que hayan sido confirmadas como positivas para IAAP deberán aprobar una Auditoría de Bioseguridad para la Repoblación de Instalaciones Infectadas antes de repoblar, si desean ser elegibles para indemnización. Además, aquellas que trasladen aves a una zona de amortiguamiento designada deberán pasar una Auditoría de Bioseguridad para ser consideradas aptas para la indemnización federal. El USDA cubrirá hasta el 75% de los costos para resolver los problemas de bioseguridad más críticos identificados, priorizando las instalaciones de producción de huevos en los estados con mayor volumen de producción.

Referencia: Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (19 de marzo de 2025). USDA Announces Biosecurity Assessments and Audits to Support Avian Influenza Prevention
Recuperado de: https://www.aphis.usda.gov/news/agency-announcements/usda-announces-biosecurity-assessments-audits-support-avian-influenza

Dirección en Jefe

EUA: Informa situación actual de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en ganado lechero, con nuevas detecciones en Idaho y Nevada.

Distribución de casos confirmados de IAAP en ganado
Créditos: APHIS

El Servicio de Inspección y Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó, a través de su tablero de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 (IAAP), con corte al 20 de marzo de 2025, sobre la detección de 989 casos confirmados en bovinos productores de leche en 17 estados.

Los casos más recientes, confirmados el 14 de marzo, incluyen uno en California y tres en Idaho. Anteriormente, el 11 de marzo se confirmaron dos casos adicionales en Idaho, y el 7 de marzo, otro caso en California.

De acuerdo con los datos proporcionados por el APHIS, la distribución de los casos es la siguiente:

N°	Estado	Casos	N°	Estado	Casos
1	California	755	10	Minnesota	9
2	Colorado	64	11	Dakota del Sur	7
3	Idaho	41	12	Kansas	4
4	Michigan	31	13	Oklahoma	2
5	Texas	27	14	Carolina del Norte	1
6	Iowa	13	15	Ohio	1
7	Utah	13	16	Wyoming	1
8	Nevada	10	17	Arizona	1
9	Nuevo México	9			

Además, en 2024 se registró un caso en un cerdo de traspatio en el estado de Oregón. Cabe destacar que el primer caso positivo en el país se detectó el 25 de marzo de 2024 en una explotación lechera en el estado de Texas.

California, el principal productor de lácteos del país, ha visto cómo los casos en el Valle Central han afectado a casi un tercio de las 1,300 explotaciones lácteas del estado.

Referencia: Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) (20 de marzo de 2025). HPAI Confirmed Cases in Livestock
Recuperado de: https://www.aphis.usda.gov/livestock-poultry-disease/avian/avian-influenza/hpai-detections/hpai-confirmed-cases-livestock

Corea del Sur: Informa tres nuevos focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad, en explotaciones de gallinas de postura.

Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 20 de marzo de 2025, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) de Corea del Sur informó que el Centro de Control de Influenza Aviar detectó antígenos de tipo H5 en tres granjas de gallinas ponedoras: una en Cheongju (Chungbuk) el 20 de marzo, y dos en Cheonan (Chungnam) y Sejong el 19 de marzo de 2025. Las granjas afectadas albergan aproximadamente 54 mil, 80 mil y 65 mil aves, respectivamente.

Las autoridades han implementado de inmediato medidas de control conforme a los protocolos establecidos, que incluyen el despliegue de equipos de respuesta, control de acceso, sacrificio sanitario y la realización de estudios epidemiológicos. Aunque las pruebas de patogenicidad están en curso, se ha adoptado un enfoque preventivo debido a la alta probabilidad de que las cepas sean altamente patógenas.

Estos nuevos brotes elevan a 39 el número total de casos registrados desde octubre de 2024, distribuidos en las siguientes regiones: Incheon (1), Sejong (2), Gyeonggi (4), Gangwon (1), Chungbuk (6), Chungnam (5), Jeonbuk (11), Jeonnam (5), Gyeongbuk (2) y Gyeongnam (2). Las granjas afectadas el 19 de marzo se encuentran dentro de la zona de control (10 km) establecida tras el brote del 8 de marzo en Cheonan.

Además, se emitió una orden de restricción de la movilización por 24 horas para prevenir la propagación del virus: a nivel nacional para los casos del 19 de marzo y a nivel regional para el del 20 de marzo.

Se recomendó a los productores evitar áreas con presencia de aves migratorias, aplicar un proceso de desinfección en dos etapas para los vehículos, prohibir el ingreso de transportes de huevos a las instalaciones, utilizar calzado específico y desinfectar los equipos. Además, deben informar de inmediato cualquier síntoma sospechoso, como un aumento de la mortalidad, disminución en la producción de huevos, reducción en el consumo de alimento, o síntomas leves como depresión, somnolencia, problemas respiratorios o diarrea verdosa.

Referencia: El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) (20 de marzo de 2025).
충북 청주 산란계 농장에서 H5형 조류인플루엔자 항원 확인
충남 천안 및 세종 산란계 농장에서 H5형 조류인플루엔자 항원 확인
Recuperado de: https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/573624/artclView.do
https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/573606/artclView.do

Tailandia: Notifica casos de Rabia en animales de diversas especies ubicados en varias provincias.

Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: https://www.istockphoto.com

El 20 de marzo de 2025, el Ministerio de Agricultura y Cooperativas de Tailandia realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada", debido a casos de Rabia en animales de diversas especies ubicados en varias provincias.

Se menciona que el evento epidemiológico continúa en curso y se puntualiza lo siguiente:

Provincias	Animales susceptibles	Casos
Buri Ram, Surin, Nakhon Ratchasima, Ubon Ratchathani, Khon Kaen, Maha Sarakham, Si Sa Ket, Songkhla, Sa Kaeo, Amnat Charoen, Chachoengsao, Nakhon Nayok y Chanthaburi.	bovinos	5
	gatos	3
	perros	16
	búfalos	1

El agente patógeno fue identificado por el Centro de Investigación y Desarrollo Veterinario Regional, mediante Ensayo de inmunofluorescencia directa para la detección de anticuerpos (Ab DIFT).

Por último, se indicó que, como parte del protocolo de respuesta a los brotes detectados en las provincias afectadas, se aplicaron las siguientes medidas: el plan integral de control que incluye la eliminación oficial de cadáveres, subproductos y desechos de origen animal, así como vigilancia tanto dentro como fuera de las zonas de restricción, se han establecido medidas de cuarentena y trazabilidad para controlar el movimiento y origen de los animales afectados. Adicionalmente, se aplicó un programa de vacunación como respuesta directa complementado con una estrategia de zonificación para delimitar y manejar las áreas afectadas y prevenir una mayor propagación.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (20 de marzo de 2025) Rabia, Tailandia. Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/6256?fromPage=event-dashboard-url

Santa Helena: Notifica casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1, en aves silvestres ubicadas en la Isla Gough.

Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El Departamento de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Planificación (ENRP), de Santa Helena, realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Primera aparición en una zona o un compartimento" debido a nuevos casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1, en aves silvestres ubicadas en la Isla Gough.

De acuerdo con el reporte, se menciona que el evento continúa en curso y se puntualiza lo siguiente:

Isla	Lugar	Aves susceptibles	Casos	Aves muertas
Gough	Tristán da Cunha	Págalo subantártico (*Stercorarius antarcticus hamiltoni*)	3	3

El agente patógeno fue identificado en el Laboratorio de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHA) (laboratorio de Weybridge) del Reino Unido; mediante las pruebas diagnósticas de reacción en cadena de la polimerasa de retrotranscripción en tiempo real (rRT-PCR).

Por último, se indica que las medidas de control aplicadas fueron: eliminación oficial de cadáveres, subproductos y desechos de origen animal, desinfección, restricción de la movilización, vigilancia dentro y fuera de la zona de restricción, trazabilidad, zonificación y procedimiento para inactivar el agente patógeno en productos y sub-productos.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (20 de marzo de 2025). Influenza Aviar de Alta Patogenicidad, H5N1. Santa Helena
Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/6354

Armenia: Notifica caso de Rabia, en un perro doméstico ubicado en la provincia de Shirak.

Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 20 de marzo de 2025, el Organismo de Inspección de Seguridad Alimentaria de Armenia realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada", debido a un caso de Rabia en un perro doméstico ubicado en la provincia de Shirak.

Se indica que este evento epidemiológico ha sido resuelto, y se especifica lo siguiente:

En la provincia de Shirak (localidad de Mets Mantash), en un traspatio se registró la muerte de un perro doméstico a causa del virus.

El agente patógeno fue identificado en el Laboratorio del Centro Republicano de Servicios Veterinarios y Fitosanitarios, mediante la prueba diagnóstica de inmunofluorescencia indirecta para la detección de antígenos (Ag IFA).

Finalmente, se menciona que no se implementaron medidas de control.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (20 de marzo de 2025). Rabia, Armenia. Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/6353?fromPage=event-dashboard-url

México: Informa nuevos casos de Gusano Barrenador del Ganado, en diversas especies domésticas ubicadas en el estado de Chiapas.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 19 de marzo de 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), realizó el informe de seguimiento N° 12 ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada", debido a 70 nuevos casos de miasis por Gusano Barrenador del Ganado (GBG) (*Cochliomyia hominivorax*) en diversas especies domésticas ubicadas en el estado de Chiapas.

Se menciona que el evento epidemiológico continúa en curso y se puntualiza lo siguiente:

Municipios	Especie susceptible	Casos
Maravilla Tenejapa, Ocosingo, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Tumbalá, Salto de Agua, Palenque, Acacoyagua, Tapachula, Mapastepec, Catazajá y Acapetahua.	3,228 bovinos	67
	1 canino	1
	19 équidos	1
	110 ovinos	1

El agente patógeno fue identificado en el laboratorio del Centro Nacional de Referencia en Parasitología Animal y Tecnología Analítica (CENAPA), mediante examen parasitológico, resultando positivas a *C. hominivorax* por identificación taxonómica.

Por último, se menciona que las medidas de control aplicadas fueron: restricción de la movilización, vigilancia dentro y fuera de la zona de restricción, desinfestación, trazabilidad, y tratamiento.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (19 de marzo de 2025). Gusano Barrenador del Ganado (GBG) (*Cochliomyia hominivorax*). Chiapas, México.
Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/6059?fromPage=event-dashboard-url

Gobierno de México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Peste Porcina Africana

20 de marzo de 2025

Monitor de Peste Porcina Africana

Contenido

India: Confirma un brote de Peste Porcina Africana, en la aldea de Yachem en el estado de Nagaland. 2

Moldavia: Confirma un nuevo brote de Peste Porcina Africana, en cerdos de una explotación comercial ubicada en el distrito de Criuleni. 3

Reino Unido: NPA insta a reforzar medidas de bioseguridad ante un posible brote de Peste Porcina Africana. 4

Alemania: Publica actualización de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana, en Europa. 5

India: Confirma un brote de Peste Porcina Africana, en la aldea de Yachem en el estado de Nagaland.

Imagen representativa de la especie involucrada. Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 20 de marzo de 2025, el Departamento de Información y Relaciones Públicas del Gobierno de Nagaland, informó la confirmación de un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en una explotación de cerdos ubicada en la aldea de Yachem, distrito de Longleng, estado de Nagaland, tras los resultados de pruebas de laboratorio.

Para contener la propagación de la enfermedad, las autoridades establecieron las siguientes zonas de vigilancia:

- Zona de control: Comprende un radio de 1 km alrededor de las instalaciones afectadas.
- Zona de riesgo: Abarca un radio de 10 km desde la zona infectada.

Asimismo, se implementaron las siguientes restricciones:

- Prohibición de la movilización y comercio de cerdos y productos derivados.
- Restricción total de la exportación, importación o transporte de cerdos, lechones, carne de cerdo y productos derivados dentro y fuera de la zona afectada.

Las explotaciones porcinas, mercados y rastros dentro de la zona de vigilancia serán objeto de un seguimiento estricto. Se instó a reportar de inmediato cualquier muerte inusual de cerdos o sospecha de PPA al departamento veterinario local.

La colaboración de las partes involucradas es crucial para controlar el brote. Además, el incumplimiento de las medidas establecidas podría derivar en sanciones conforme a la legislación vigente.

Hasta el momento, el evento epidemiológico no ha sido registrado en el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS) de la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Referencia: Departamento de Información y Relaciones Públicas del Gobierno de Nagaland (20 de marzo de 2025). DC LONGLENG INFORMS ON OUTBREAK OFAFRICAM SWINE FEVER
Recuperado de: https://ipr.nagaland.gov.in/index.php/DC-LONGLENG-INFORMS-ON-OUTBREAK-OF-AFRICAN-SWINE-FEVER

Moldavia: Confirma un nuevo brote de Peste Porcina Africana, en cerdos de una explotación comercial ubicada en el distrito de Criuleni.

Imagen representativa de la especie involucrada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 20 de marzo de 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria (ANSA) de Moldavia confirmó un nuevo brote de Peste Porcina Africana (PPA) en una explotación comercial ubicada en la localidad de Cimișeni, distrito de Criuleni. El virus fue detectado el 19 de marzo tras pruebas de laboratorio y se implementaron medidas urgentes para contenerlo.

Las autoridades establecieron una cuarentena en la zona afectada, también implementaron restricciones de movilización, desinfección de instalaciones y sacrificio de los cerdos infectados. Crearon zonas de vigilancia de control a 3 km y de riesgo a 10 km alrededor de las instalaciones afectadas para evitar la propagación. Desde el inicio del año, Moldavia ha registrado 31 brotes, de los cuales 19 han sido erradicados.

La ANSA insta a los ganaderos y ciudadanos a reforzar medidas de bioseguridad, como evitar el contacto con cerdos enfermos, no alimentar a los animales con restos de comida y reportar cualquier caso sospechoso. Se prohíbe el transporte y comercio de cerdos en zonas afectadas.

Las autoridades continúan evaluando los daños y piden colaboración para frenar la propagación. Se advierte a la población sobre la compra de productos derivados de cerdo en mercados no autorizados y se enfatiza la importancia de seguir las medidas de bioseguridad.

Hasta el momento, no se ha registrado el evento epidemiológico en el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS) de la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Referencia: Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria (ANSA) (20 de marzo de 2025). ATENȚIE! Focar de Pestă porcină africană
Recuperado de: https://www.ansa.gov.md/media/comunicate-de-presa/atentie-focar-de-pesta-porcina-africana.html

Reino Unido: NPA insta a reforzar medidas de bioseguridad ante un posible brote de Peste Porcina Africana.

Imagen representativa de los productos involucrados. Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 19 de marzo de 2025, la Asociación Nacional de Cerdos (NPA) instó a los porcicultores a reforzar sus medidas de bioseguridad y a estar preparados ante posibles brotes de Peste Porcina Africana (PPA).

En el último año, las autoridades del Reino Unido, en colaboración con organizaciones del sector, han fortalecido su capacidad de respuesta. Como parte de estos esfuerzos, se llevaron a cabo tres talleres en conjunto con el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA), la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHA) y la Agencia de Normas Alimentarias (FSA):

- Ejercicio 1: Simulación teórica, donde se analizó el procedimiento a seguir ante la sospecha y posterior confirmación de la PPA en una explotación.
- Ejercicio 2: Enfoque en la fase posterior a la detección de un brote, con especial atención al impacto en los rastros.
- Ejercicio 3: Evaluación de la alimentación, el transporte y la gestión de cadáveres, así como la optimización del aprovechamiento de recursos.

Dado que las restricciones varían según la ubicación y el tipo de cerdos afectados (domésticos o silvestres), los porcicultores deben contar con planes de contingencia flexibles y adaptables a diferentes escenarios.

En caso de brote, las granjas afectadas deberán someterse a procesos de limpieza y desinfección. Inicialmente, estos serán supervisados por la APHA, seguidos de procedimientos adicionales financiados por los propios productores. La desinfección de unidades exteriores representa un reto mayor debido a la persistencia del virus en el suelo y la imposibilidad de limpiar ciertos materiales, como las cercas de madera.

Referencia: Asociación Nacional de Cerdos (NPA) (19 de marzo de 2025). Producers urged to do everything in their powers to prevent and prepare for ASF
Recuperado de: https://nationalpigassociation.co.uk/producers-urged-to-do-everything-in-their-powers-to-prevent-and-prepare-for-asf/

Alemania: Publica actualización de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana, en Europa.

Imagen representativa de la especie involucrada. Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 19 de marzo de 2025, el Instituto Friedrich Loeffler (FLI) publicó la actualización sobre la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana (PPA) en Europa.

Se menciona que, con corte al 11 de marzo de 2025, se registró un total de 3,864 casos (309 más en comparación con la actualización del pasado informe, con fecha de corte al 4 de marzo), de los cuales en lo que va del presente año se han identificado un total de 145 en cerdos y 3,719 en jabalís, distribuidos de la siguiente manera:

País	Número de cerdos	Número de jabalís
Bosnia y Herzegovina	6	12
Bulgaria	0	259
Alemania	0	799
Estonia	0	22
Grecia	0	54
Italia	1	186
Croacia	1	6
Letonia	0	445
Lituania	0	223
Moldavia	27	4
Polonia	0	1,156
Rumania	88	81
Serbia	11	12
Eslovaquia	0	90
Ucrania	11	15
Hungría	0	355

Referencia: Instituto Friedrich Loeffler (FLI) (19 de marzo de 2025). Afrikanische Schweinepest (Genotyp II) in Europa 2025
Recuperado de: https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/