Gobierno de México

Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Zoosanitario

9 de mayo de 2025



Monitor Zoosanitario

Dirección en Jefe

Contenido

EUA: Investigadores alertan sobre amenaza de Influenza Aviar en gatos y su potencial riesgo para humanos. 2

Namibia: Notifica casos de Peste Equina en diversas regiones del país. 3

México: Confirma segundo caso de miasis en humano por Gusano Barrenador en Chiapas en 2025. 4

Dirección en Jefe

EUA: Investigadores alertan sobre amenaza de Influenza Aviar en gatos y su potencial riesgo para humanos.



Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 7 de mayo de 2025, investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland publicaron en *Open Forum Infectious Diseases* un estudio que documenta la necesidad urgente de vigilancia de la Influenza Aviar (subtipo H5N1) en gatos para prevenir la transmisión entre humanos.

En dicha investigación, se revisó datos globales de 2004 a 2024, identificando 607 infecciones y 302 muertes en gatos de 18 países y 12 especies felinas. Los gatos se contagian al consumir aves infectadas, alimentos contaminados o a través de otros mamíferos, incluida la leche cruda de vacas infectadas y el contacto entre felinos.

La cepa más mortal tiene una tasa de letalidad del 90% en gatos, causando encefalitis aguda frecuentemente confundida con rabia, mientras que en humanos ha causado aproximadamente 950 infecciones globales con una letalidad del 50%. Los investigadores expresan particular preocupación por posibles brotes en refugios de animales y la evolución del virus hacia una transmisión aérea entre humanos, por lo que su futuro trabajo se enfocará en determinar la prevalencia del virus en poblaciones felinas de alto riesgo, como los gatos de granjas lecheras.

Referencia: University of Maryland School of Public Health (07 de mayo de 2025) Bird flu study points to risk of another pandemic
Recuperado de: https://sph.umd.edu/news/bird-flu-study-points-risk-another-pandemic

Namibia: Notifica casos de Peste Equina en diversas regiones del país.



Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 8 de mayo de 2025, el Ministerio de Agricultura, Agua y Silvicultura de Namibia realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada", debido a casos de Peste Equina, lo anterior, en équidos ubicados en diversas regiones del país.

Se mencionó que el evento continúa en curso y se puntualizó lo siguiente:

Regiones	Animales susceptibles	Casos	Animales muertos
Erongo, Hardap, Omaheke, Khomas, Otjozondjupa, Omaheke	35,677 équidos	29	21

El agente patógeno fue identificado por el Laboratorio Central Veterinario de Windhoek, mediante la prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR).

En respuesta al brote, se implementaron las siguientes medidas: restricción de la movilización y cuarentena.

En México, está considerada como enfermedad exótica, y pertenece al grupo 1 del ACUERDO mediante el cual se dan a conocer en los Estados Unidos Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos (DOF 29/11/2018).

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (8 de mayo de 2025). Peste Equina Namibia.
Recuperado de: https://wahis.woah.org/#/in-review/6467?fromPage=event-dashboard-url

México: Confirma segundo caso de miasis en humano por Gusano Barrenador en Chiapas en 2025.



Ciclo biológico de *Cochliomyia hominivorax*
Créditos: La Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG)

La Secretaría de Salud confirmó el 8 de mayo de 2025 un segundo caso de miasis causada por gusano barrenador del ganado (*Cochliomyia hominivorax*) en un hombre de 50 años, residente de Tuzantán, Chiapas, según el Boletín Epidemiológico emitido por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

El paciente, de ocupación campesino, desarrolló la infestación tras ser mordido por un perro en la pierna izquierda, presentando larvas en la herida, dolor intenso, fiebre y enrojecimiento días después. Fue atendido inicialmente en los servicios de salud municipales, donde se le extrajeron seis larvas, y posteriormente trasladado al Hospital General de Huixtla para lavado quirúrgico y tratamiento, siendo dado de alta por mejoría.

La Secretaría de Salud trabaja coordinadamente con el SENASICA aplicando el Manual de Procedimientos Estandarizados para esta enfermedad, que establece protocolos para detección, notificación y manejo de muestras, incluyendo la conservación de larvas en alcohol al 70% para análisis en el en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (INDRE).

Finalmente, instaron a la población de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán para extremar precauciones en el cuidado de heridas cutáneas, mantener higiene adecuada en zonas húmedas y buscar atención médica oportuna ante síntomas como secreción, dolor persistente o sensación de movimiento en las heridas.

Referencia: Secretaria de Salud, Portal de Twitter (8 de mayo de 2025) Tarjeta informativa sobre segundo caso de miasis por gusano barrenador en 2025.
Referencia: https://x.com/SSalud_mx/status/1920660165600153817

Gobierno de México

Agricultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Monitor Peste Porcina Africana

9 de mayo de 2025

Monitor de Peste Porcina Africana

Dirección en Jefe

Contenido

Letonia: Primer brote de Peste Porcina Africana, en cerdos domésticos de 2025. 2

Indonesia: Informa pérdidas económicas debido a la Peste Porcina Africana en Bali. 3

Filipinas: Actualiza clasificación sanitaria por Peste Porcina Africana en Visayas Occidentales. 4

Letonia: Primer brote de Peste Porcina Africana, en cerdos domésticos de 2025.

Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 9 de mayo de 2025, el Servicio de Alimentación y Veterinaria (PVD) de Letonia informó sobre la detección del primer brote de Peste Porcina Africana (PPA) en cerdos domésticos de este año, en una granja con 36 cerdos en Džūkste, región de Tukums.

El PVD implementó medidas de control, como el sacrificio de los cerdos afectados, una investigación epidemiológica en las instalaciones y el establecimiento de una zona de cuarentena alrededor de la granja.

Además, se intensificarán las inspecciones en la zona y se ha restringido el movimiento de cerdos y productos porcinos. Las medidas preventivas incluyen evitar el contacto entre los cerdos y los animales salvajes, no permitirles salir al exterior ni alimentarlos con forraje verde o restos de comida, y desinfectar el calzado antes de ingresar a las instalaciones. En caso de que los cerdos presenten síntomas, se debe contactar a un veterinario de inmediato.

La principal amenaza para los cerdos domésticos es la propagación del virus entre los jabalíes, cuya población en Letonia ha aumentado considerablemente. En 2025, ya se han registrado 756 jabalíes infectados. El PVD recalca que la única forma de proteger a los cerdos domésticos es garantizar el cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad en las granjas.

Referencia: Servicio de Alimentación y Veterinaria (PVD) de Letonia (9 de mayo de 2025). Latvijā konstatēts šogad pirmais ĀCM uzliesmojums mājas cūku novietnē
Recuperado de: https://www.pvd.gov.lv/lv/jaunums/latvija-konstatets-sogad-pirmais-acm-uzliesmojums-majas-cuku-novietne-0

Indonesia: Informa pérdidas económicas debido a la Peste Porcina Africana en Bali.



Imagen representativa de la especie involucrada. Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 9 de mayo de 2025, se informó a través de los medios de comunicación que, en los últimos seis años, la Peste Porcina Africana (PPA) ha provocado la muerte de cientos de miles de cerdos en Bali, ocasionando pérdidas económicas significativas para los ganaderos, que superan los 2 billones de IDR (rupias indonesias).

Según la vicepresidenta del Consejo Regional de Representantes Populares de Bali (DPRD), hasta la fecha han muerto 266 mil cerdos desde 2019. Sin embargo, estima que el número real podría ser considerablemente mayor, dado que muchos criadores no reportan las muertes. Además, se alertó sobre el riesgo de propagación del virus a través del transporte de ganado, particularmente por vía terrestre. En este sentido, se propuso que los envíos de cerdos se realicen por rutas más seguras.

A pesar de las grandes pérdidas, los criadores balineses están logrando una rápida recuperación del brote, aunque no han recibido compensación alguna del gobierno. Se destacó la falta de apoyo a los criadores de cerdos, especialmente en comparación con los ganaderos afectados por otras enfermedades como la Fiebre Aftosa. En respuesta, el DPRD de Bali ha sugerido que el transporte de ganado se realice preferentemente por vía marítima, con el fin de mitigar los riesgos de propagación del virus.

Finalmente, se resaltó la colaboración entre el gobierno y el sector privado en la gestión del transporte de cerdos desde el puerto de Celukan Bawang hacia Kalimantan Occidental, una ruta esencial para evitar el aumento de la inflación en la región.

Referencia: Balijani.id (9 de mayo de 2025). Waduh...!!! 500 Ribu Ekor Babi Bali Mati Akibat ASF, Peternak Rugi Rp 2 Triliun Lebih
Recuperado de: https://balijani.id/2025/05/09/500-ribu-babi-mati-akibat-asf-peternak-rugi-rp-2-triliun/
Recuperado de: https://denpasar.kompas.com/read/2025/05/09/181351778/500000-ekor-babi-di-bali-diperkirakan-mati-akibat-demam-afrika-peternak#google_vignette

Filipinas: Actualiza clasificación sanitaria por Peste Porcina Africana en Visayas Occidentales.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: https://www.istockphoto.com/

El 9 de mayo de 2025, la agencia oficial de noticias del gobierno filipino informó que, desde el 5 de mayo del presente año, tres municipios de Visayas Occidentales (Banga y Buruanga, en la provincia de Aklan y San José de Buenavista, en Antique) fueron reclasificados como zonas de vigilancia amarilla dentro del sistema nacional de clasificación de la Peste Porcina Africana (PPA).

Esta decisión se basó en el cumplimiento exitoso de los protocolos centinela establecidos por el Programa Nacional de Prevención y Control de la PPA.

El jefe de la División Regulatoria del Departamento de Agricultura en la región de Visayas Occidentales calificó estos avances como alentadores, señalando una tendencia positiva en los esfuerzos por contener la enfermedad. Asimismo, se prevé que más localidades pasen próximamente de la categoría de zona infectada a zona amarilla.

El protocolo centinela consiste en introducir lechones sanos en zonas previamente afectadas por la PPA y monitorear la aparición de síntomas, como parte del proceso de verificación sanitaria. Actualmente, 44 unidades de gobierno local han sido reclasificadas como zonas rosa (de amortiguamiento), reflejando el impacto de las medidas de bioseguridad implementadas.

En paralelo, la Oficina de la Industria Animal informó que continúa la vigilancia sanitaria activa en el país. Además, recordó la emisión de la Circular Memorándum No. 12 (2025), la cual exime de pruebas de sangre para influenza aviar a las aves vivas, huevos y productos avícolas transportados dentro del territorio nacional, con excepción de los patos vivos. Esta medida tiene como objetivo facilitar el comercio avícola desde Visayas Occidentales hacia otras regiones del país.

Referencia: Agencia de Noticias de Filipinas (PNA) (9 de mayo de 2025). 3 W. Visayas towns upgraded to ASF yellow zone
Recuperado de: https://www.pna.gov.ph/articles/1249814