



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Fitosanitario

19 de enero de 2026



Monitor Fitosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE


Monitor Fitosanitario

Contenido

Italia: Nueva detección de <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>pauca</i> en la provincia de Bari, infectando olivo.....	2
España: Detección del picudo rojo de las palmas (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>) en Getaria.....	3
Brasil: Reporte de presencia de <i>Oligonychus grypus</i> en la región de Ribeirão Preto, infestando caña de azúcar.....	4
Chile: Erradicación de la mosca del Mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>) en Malloa (región de O'Higgins).....	5



Italia: Nueva detección de *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* en la provincia de Bari, infectando olivo.



Ubicación de la planta infectada. Créditos: DASRA.

El 18 de enero de 2026, a través del portal Olivo News y con base en información del Observatorio Fitosanitario del Departamento de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Región de Apulia (DASRA), se informó la detección de *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* (Xfp) en la provincia de Bari, Italia.

Se señala que, derivado de las actividades de vigilancia fitosanitaria realizadas por el DASRA, se encontró un olivo infectado por la bacteria, en la zona de Bitonto. Por lo anterior, el DASRA determinó la eliminación inmediata de dicho árbol y de otros olivos presentes en un radio de 50 m (con o sin síntomas de sospecha de infección), de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación fitosanitaria vigente. También se implementan medidas y acciones fitosanitarias adicionales, para la contención y control del fitopatógeno.

Finalmente, se destaca que el nuevo Plan Nacional del Aceite de Oliva estima que se requieren mil millones de euros (aproximadamente 20,476 millones de pesos mexicanos) para atender la problemática asociada con Xfp y proteger la producción de olivo en las zonas afectadas.

En el contexto nacional, *X. fastidiosa* figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentra bajo Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en 30 entidades federativas.

Referencia:

Portal Olivo News (18 de enero de 2026). La *Xylella* ha llegado también a la patria del cultivo del olivo, Bari. Recuperado de: <https://olivonews.it/es/La-Xylella-tambi%C3%A9n-ha-llegado-a-la-patria-del-olivo-en-Bari/>



España: Detección del picudo rojo de las palmas (*Rhynchophorus ferrugineus*) en Getaria.



R. ferrugineus. Créditos: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay.

El 18 de enero de 2026, a través del portal Noticias de Gipuzkoa, se dio a conocer que el ayuntamiento de Getaria (provincia de Guipúzcoa, Comunidad Autónoma del País Vasco, España) informó la detección del picudo rojo de las palmas (*Rhynchophorus ferrugineus*).

Se señala que, según los informes técnicos del Departamento de Equilibrio Territorial Verde, *R. ferrugineus* ha sido identificado en dos palmeras ubicadas en el municipio costero referido; estas pertenecen a especies susceptibles a la plaga. Derivado del hallazgo, las autoridades locales han contratado a una empresa especializada, para llevar a cabo los trabajos de extracción y eliminación de las palmeras infestadas, conforme a la normatividad vigente; también se aplican tratamientos insecticidas a otras palmeras cercanas, mediante endoterapia. El costo total de estas actividades asciende a 4,321 euros (≈ \$124,566 MXN).

Se destaca que el ayuntamiento continuará implementando medidas y acciones fitosanitarias enfocadas en la prevención y control de la plaga.

En el contexto nacional, *R. ferrugineus* figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentra bajo Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en 14 entidades federativas.

Referencias:

Portal Noticias de Gipuzkoa (18 de enero de 2026). La plaga del picudo rojo afecta a palmeras de Getaria y el Ayuntamiento pide ayuda a los vecinos. Recuperado de: <https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/gipuzkoa/bertan/2026/01/17/plaga-picudo-rojo-afecta-palmeras-getaria-retirada-10578831.html>



Brasil: Reporte de presencia de *Oligonychus grypus* en la región de Ribeirão Preto, infestando caña de azúcar.



Daños *O. grypus*. Créditos: Ramos G. Y D. J. Andrade,

En la revista científica *Entomological Communications* (núm. de enero de 2026), investigadores de la Universidad Estadual Paulista (São Paulo) publicaron un reporte de presencia de *Oligonychus grypus* en la región de Ribeirão Preto, en dicho estado de Brasil.

Se refiere que *O. grypus* (araña roja de la caña de azúcar) fue detectada por primera vez en Brasil en 2009, en la región de Piracicaba (São Paulo).

En la nota científica actual, se informa la presencia de *O. grypus* en campos comerciales de caña de azúcar, en la región de Ribeirão Preto (São Paulo). Asimismo, se documentan los síntomas y posibles impactos de la plaga en el cultivo, subrayando la importancia de su seguimiento. Se resalta que, en infestaciones severas, el ácaro causa daños al follaje, caracterizados por manchas amarillentas a blanquecinas; estas lesiones reducen el rendimiento y afectan la calidad de las materias primas para el procesamiento industrial.

En el contexto nacional, *O. grypus* no figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentra bajo Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en todo el país. Este tetránquido también ha sido reportado en países de África (Camerún, Congo, Madagascar, Malaui y Sudáfrica), Asia (India), y Oceanía (Australia y Papúa Nueva Guinea) (GBIF, 2026).

Referencia:

Ramos G. Y D. J. Andrade (enero de 2026). Occurrence and symptom characterization of *Oligonychus grypus* Baker & Pritchard (Acari: Tetranychidae) in sugarcane. *Entomological Communications*: <https://doi.org/10.37486/2675-1305.ec07037>



Chile: Erradicación de la mosca del Mediterráneo (*Ceratitis capitata*) en Malloa (región de O'Higgins).



C. capitata. Imagen: SAG.

El 18 de enero de 2026, a través del portal El Rancagüino y con base en información del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG), se dio a conocer la erradicación de la mosca del Mediterráneo (*Ceratitis capitata*) en la comuna de Malloa (provincia de Cachapoal, región de O'Higgins).

Se refiere que el primer ejemplar de la plaga fue detectado en Malloa el 10 de marzo de 2025, en el sector rural de Pelequén Viejo, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de acción por parte del SAG, con el objetivo de controlar y erradicar el brote en una zona destacada por sus exportaciones de cereza, manzana y otras frutas. Desde esa fecha, se registraron 24 ejemplares adultos silvestres y 15 focos larvarios; el último hallazgo ocurrió el 5 de mayo.

Se resalta que la finalización de la campaña fitosanitaria de Malloa se sustenta técnicamente en la ausencia de detecciones durante tres ciclos de la plaga, tras el monitoreo permanente realizado mediante 2,005 trampas. Se apunta que, como parte de dicha campaña, se desarrollaron acciones tales como el establecimiento de una cuarentena en 4,990 hectáreas e implementación de medidas de control en 42 mil hectáreas (zonas productoras de frutales y hortalizas) y en empacadoras de exportación de gran parte de la región.

En el contexto nacional, *C. capitata* figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentra bajo Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en todo el país.

Referencias:

Portal El Rancagüino (18 de enero de 2026). Tras meses de trabajo erradican mosca de la fruta en Malloa. Recuperado de: <https://www.elrancaguino.cl/2026/01/17/tras-meses-de-trabajo-erradican-mosca-de-la-fruta-en-malloa/>