



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

21 de enero de 2026



Monitor Zoosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Costa Rica: Situación epidemiológica de la miasis por Gusano Barrenador del Ganado en humanos, sumando 102 casos registrados en 2025.	2
Bélgica: Confirma nuevo brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5 en la provincia de Flandes Occidental.....	3
Corea del Sur: Confirma brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5N9 en granja de pollos de engorda.	4



Costa Rica: Situación epidemiológica de la miasis por Gusano Barrenador del Ganado en humanos, sumando 102 casos registrados en 2025.



El 16 de enero de 2026, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Vigilancia de la Salud de Costa Rica, publicó su Boletín Epidemiológico N°1 de 2026, que incluye información actualizada correspondiente a la semana epidemiológica (SE) N°52, del 21 al 27 de diciembre de 2025, sobre los casos de miasis por Gusano Barrenador del Ganado (GBG) (*Cochliomyia hominivorax*) en humanos, registrando un total acumulado de 102 casos en el país.

De acuerdo con el informe, se reporta lo siguiente:

Provincias	Casos en humanos 2025
San José	20
Alajuela	23
Cartago	5
Heredia	10
Guanacaste	13
Puntarenas	12
Limón	19

Se mencionó que estos casos se confirmaron con mayor afectación en personas adultas, especialmente en el grupo de 65 años y más, y un predominio en hombres.

Además, en comparación con 2024, cuando se confirmaron 40 casos, el año 2025 mostró un incremento significativo. Ante la persistente circulación de la mosca y la vigencia de la Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica por GBG.

Finalmente, se indicó que las autoridades subrayaron la necesidad de una coordinación interinstitucional bajo el enfoque de Una Sola Salud y fortalecieron las medidas de prevención, vigilancia y atención oportuna tanto en humanos como en animales.

Referencia: Ministerio de Salud (16 de enero de 2026). Boletín Epidemiológico N°1 de 2026, Miasis por Gusano Barrenador en Humanos.

Recuperado de: <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca/material-educativo/material-publicado/boletines/boletines-vigilancia-vs-enfermedades-de-transmision-vectorial/boletines-epidemiologicos-2026/10013-boletin-epidemiologico-n-1-6/file>



Bélgica: Confirma nuevo brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5 en la provincia de Flandes Occidental.



Imagen representativa de la especie susceptible.
Créditos: <https://www.istockphoto.com>

El 19 de enero de 2026, la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (FAVV) de Bélgica confirmó la detección de un brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) subtipo H5 en una granja avícola ubicada en Diksmuide, en la provincia de Flandes Occidental, por lo que se llevó a cabo el sacrificio sanitario de las aves y la ampliación de la zona restringida de Veurne-Alveringem para prevenir la propagación del virus.

Dentro de un radio de 10 km, todos los avicultores, tanto profesionales como particulares, deben mantener a sus aves protegidas, mientras que en la zona de 3 km esta medida se extiende a otras aves.

El brote se registra en un contexto de recrudecimiento de la gripe aviar desde el otoño de 2025, periodo en el que se han confirmado casos en 19 granjas avícolas, dos criadores aficionados y numerosas aves silvestres, lo que llevó al restablecimiento del confinamiento obligatorio de aves de corral.

Las autoridades reiteraron recomendaciones de bioseguridad, evitar el contacto con aves enfermas o muertas y notificar de inmediato cualquier hallazgo sospechoso a los servicios competentes.

Referencia: Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (FAVV) (19 de enero de 2026). Vogelgriep H5: besmetting met de hoogpathogene variant bevestigd bij een pluimveebedrijf in Diksmuide in provincie West-Vlaanderen
Recuperado de: <https://favv-afsca.be/nl/publications/persberichten/vogelgriep-h5-diksmuide>



Corea del Sur: Confirma brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5N9 en granja de pollos de engorda.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 21 de enero de 2026, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) confirmó un nuevo brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) subtipo H5N9 en una granja de pollos de engorda en Boryeong, provincia de Chungcheong del Sur, que albergaba aproximadamente 107,000 aves.

Este evento epidemiológico representa el brote número 38 de la temporada invernal 2025/26 y el quinto en granjas de engorde.

Ante el alto riesgo de propagación, se activaron de inmediato medidas de emergencia que incluyen el sacrificio sanitario, investigaciones epidemiológicas, una orden de suspensión de movimientos por 24 horas en las zonas afectadas y la intensificación de inspecciones y desinfección en granjas dentro de un radio de 10 km.

Las autoridades advirtieron que enero es un periodo crítico por el aumento de aves migratorias y fortalecieron la vigilancia nacional, el control de vehículos y bienes de riesgo, así como la supervisión estricta de granjas afiliadas, con el objetivo de prevenir nuevos brotes y proteger la producción avícola del país.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) (21 de enero de 2026). 충남 보령 육용종계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 확진에 따라 발생 계열사 및 전국 육용종계 대상 방역관리 강화
Recuperado de: <https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/576665/artclView.do>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

21 de enero de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Croacia: Confirma primer brote de Peste Porcina Africana en cerdos domésticos en 2026.	2
Internacional: OMSA publica reporte sobre la situación mundial de la Peste Porcina Africana.....	3
Italia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana, en las regiones de Liguria y Piamonte.....	4

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Croacia: Confirma primer brote de Peste Porcina Africana en cerdos domésticos en 2026.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 20 de enero de 2026, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Croacia informó la confirmación, el 19 de enero, de un caso de peste porcina africana (PPA) en una explotación porcina ubicada en el asentamiento de Nemetin, en la ciudad de Osijek, condado de Osijek-Baranja, lo que constituye el primer brote en cerdos domésticos registrado en 2026.

La explotación afectada se localiza dentro de la Zona de Restricción III y contaba con un total de 21 animales; como respuesta

inmediata al evento epidemiológico, se realizó el retiro de los animales y la desinfección de las instalaciones, además del establecimiento de zonas de protección y vigilancia adicionales.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la PPA es una enfermedad viral que afecta exclusivamente a cerdos domésticos y silvestres, con los jabalís como principal fuente de infección, y enfatizaron la importancia de cumplir estrictamente las medidas de bioseguridad, en particular la desinfección de personas, equipos y vehículos, para prevenir la propagación del virus.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Croacia (20 de enero de 2026). Potvrđen jedan slučaj afričke svinjske kuge

Recuperado de: <https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/potvrđen-jedan-slučaj-africke-svinjske-kuge/8097>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Internacional: OMSA publica reporte sobre la situación mundial de la Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) publicó el Reporte N° 72 sobre la situación mundial de la Peste Porcina Africana (PPA), correspondiente a diciembre de 2025.

En dicho informe se señala que la PPA continúa representando una amenaza sanitaria global, con el reporte de un nuevo evento en Asia y la actualización de eventos en 14 países de Asia y Europa, mientras que no se notificaron nuevos brotes en América u Oceanía.

En el periodo analizado se registraron 25 nuevos brotes en cerdos domésticos y alrededor de 584 en jabalís, principalmente en Europa, con pérdidas de 2,738 animales, y se observó que aproximadamente 26% de los brotes ocurrieron en zonas de alta densidad porcina.

Aunque los datos muestran una tendencia general a la disminución de brotes en cerdos domésticos desde septiembre de 2025, se identificó un aumento reciente en fauna silvestre y la aparición de focos a más de 10 km de áreas previamente afectadas, destacando un “salto” epidemiológico de 30 km en Moldavia.

Desde enero de 2022, 71 países han notificado la presencia de la enfermedad, con más de 1.1 millones de casos en cerdos y 43,506 en jabalís, por lo que la OMSA reiteró la necesidad de fortalecer la bioseguridad, la notificación oportuna y la vigilancia, así como de aplicar cualquier estrategia de vacunación únicamente bajo estándares internacionales y con monitoreo posterior.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (19 de enero de 2026). African swine fever (ASF), Situation Report 72

Recuperado de: <https://www.woah.org/en/document/african-swine-fever-asf-situation-report-72/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Italia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana, en las regiones de Liguria y Piamonte.



El Instituto Zooprofilático Experimental de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta publicó su informe sobre la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana (PPA) en el norte de Italia.

Con datos actualizados al 18 de enero de 2026, las autoridades sanitarias informaron la detección de doce nuevos casos positivos de PPA en jabalís en la región de Liguria, mientras que en Piamonte no se registraron nuevos casos, manteniéndose estable la situación epidemiológica en esa región.

Con estas detecciones, el número total de casos positivos en jabalís asciende a 1,989, de los cuales 1,190 corresponden a Liguria y 799 a Piamonte.

En Liguria, los nuevos casos se localizaron en las provincias de Génova y La Spezia, específicamente en los municipios de Castiglione Chivarese, Rapallo, Calice al Cornoviglio y Sesta Godano.

Finalmente, se mencionó que el número de brotes en explotaciones porcinas se mantiene sin cambios en nueve, al igual que el total de municipios afectados, que continúa en 190.

Referencia: Instituto Zooprofilático Experimental de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta (18 de enero de 2026). I CONTROLLI PER LA PSA – IN LIGURIA DODICI NUOVI POSITIVI TRA I CINGHIALI, NESSUNO IN PIEMONTE

Recuperado de: <https://www.izspltv.it/it/notizie/308-peste-suina-africana/2327-controlli-psa-20-01-26.html>