



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

18 de febrero de 2026



Monitor Zoosanitario


DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

EUA: Situación de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en aves de corral comerciales y de traspatio.....	2
Costa Rica: Situación epidemiológica de Gusano Barrenador del Ganado en animales.	3
Polonia: Situación epidemiológica de Lengua Azul en explotaciones ganaderas durante 2026.....	4



EUA: Situación de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en aves de corral comerciales y de traspatio.



El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó, a través de su tablero de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 (IAAP) en aves de corral comerciales y de traspatio, que con corte al 18 de febrero de 2026 se ha confirmado un total de 46 brotes en los últimos 30 días, de los cuales 18 corresponden a explotaciones comerciales y 28 a producciones de traspatio. En total, 7.23 millones de aves se han visto afectadas por la enfermedad.

De acuerdo con los datos proporcionados por el APHIS, las detecciones confirmadas de IAAP en Estados Unidos entre el 12 y el 18 de febrero, se distribuyen de la siguiente manera:


- El 17 de febrero, se confirmaron casos en Pensilvania (Dauphin) en una explotación comercial de gallinas ponedoras (sin aves afectadas reportadas) y en Lancaster en gallinas ponedoras comerciales (2,641,200 aves) y en pollitas comerciales de postura (393,300 aves), ambas bajo área de control activa.
- El 13 de febrero, se reportó un caso en Indiana (Elkhart) en patos de una explotación comercial, con 10,700 aves afectadas.
- El 12 de febrero, se detectó un evento en Colorado (Weld) en aves no comerciales, con 20 aves afectadas.

Referencia: Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) (18 de febrero de 2026). Confirmations of Highly Pathogenic Avian Influenza in Commercial and Backyard Flocks

Recuperado de: <https://www.aphis.usda.gov/livestock-poultry-disease/avian/avian-influenza/hpai-detections/commercial-backyard-flocks>



Costa Rica: Situación epidemiológica de Gusano Barrenador del Ganado en animales.



El 18 de febrero de 2026, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) de Costa Rica a través de su cuenta oficial de Facebook publicó su informe de actualización correspondiente a la semana epidemiológica (SE) N° 5 del 1 al 7 de febrero de 2026, con 305 nuevos casos de miasis por Gusano Barrenador del Ganado (GBG) (*Cochliomyia hominivorax*) en animales, registrados en el país.

De acuerdo con el informe, durante dicha SE, se reportó un total acumulado de 30,146 casos

en el país.

Los cantones con mayor número de casos nuevos fueron Buenos Aires (48), Aserrí (28), Pococí (26) y San Carlos (24), seguidos por Puriscal (20), Golfito (18), Santa Cruz (16) y Corredores (14), entre otros con menor incidencia.

En cuanto a la distribución por especie afectada, los bovinos concentraron la mayoría de los casos (83.6%), seguidos por caninos (7.4%), ovinos (3.1%) y porcinos (2%), mientras que caprinos, equinos, humanos y otras especies representaron proporciones menores.

La información refleja una alta carga de la enfermedad en ganado bovino y una distribución territorial amplia, con concentración de casos en ciertos cantones prioritarios para la vigilancia y control.

Referencia: SENASA Costa Rica cuenta oficial de Facebook (18 de febrero de 2026). Actualización de los casos nuevos de #gusanobarrenador, semana epidemiológica #5 del 2026 (del 1° al 7 de febrero).

Recuperado de:

<https://www.facebook.com/Senasacr/posts/pfbid0wrnt3hvjSPnp17GacQQpaqUZqSuwvVLt7FAo4VHqZNIJgH4AuodUh48jNHJheQiwI?rdid=gee02TP2aZDluES6#>



Polonia: Situación epidemiológica de Lengua Azul en explotaciones ganaderas durante 2026.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 18 de febrero de 2026, la Oficina del Jefe de Inspección Veterinaria de Polonia informó que, en lo que va del año, se han notificado cinco brotes de la enfermedad de la Lengua Azul (LA).

Desde la última actualización, se ha confirmado un nuevo brote en la provincia de Baja Silesia, en el condado de Oława.

El foco se detectó en una explotación ganadera situada en una zona ya considerada no libre del virus, por lo que no modifica la situación

sanitaria de las áreas previamente delimitadas.

Las autoridades veterinarias continúan monitoreando la evolución epidemiológica para prevenir una mayor propagación de la enfermedad.

Referencia: Oficina del Jefe de Inspección Veterinaria de Polonia (18 de febrero de 2026). Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący aktualnej sytuacji w zakresie choroby niebieskiego języka (BT) w 2026 r
Recuperado de: <https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-dotyczacy-aktualnej-sytuacji-w-zakresie-choroby-niebieskiego-jezyka-BT-w-2026-r.-/idn:3086>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

18 de febrero de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

España: Cataluña confirma nuevos focos de Peste Porcina Africana en jabalís.	2
España: Cataluña refuerza la lucha contra la Peste Porcina Africana con drones de visión térmica.....	3
Alemania: Publica actualización de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana, en Europa.	4

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



España: Cataluña confirma nuevos focos de Peste Porcina Africana en jabalís.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 17 de febrero de 2026, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA) publicó la actualización epidemiológica sobre la Peste Porcina Africana (PPA) en jabalís en Cataluña.

Desde la última actualización del 13 de febrero, las autoridades españolas confirmaron la detección de dos nuevos focos de PPA en jabalís silvestres, elevando a 31 los focos notificados y a 162 los casos positivos en siete municipios, incluido Sant Feliu de Llobregat,

que fue incorporado a la zona de alto riesgo.

El virus permanece confinado dentro de la zona vallada, mientras se intensifican las labores de búsqueda de cadáveres, control poblacional de jabalís y medidas de aislamiento mediante vallados y barreras en puntos de riesgo.

Paralelamente, España trabaja con la Comisión Europea para redefinir la zona infectada en Zonas I y II conforme al Reglamento (UE) 2023/594, lo que permitiría reanudar movimientos de animales y productos bajo estrictas medidas de bioseguridad y vigilancia. En las 57 explotaciones porcinas ubicadas en la zona infectada no se han detectado signos clínicos, aunque se mantiene una vigilancia fortalecida.

Las autoridades reiteraron que la PPA no afecta a las personas y subrayaron la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad y notificar cualquier sospecha tanto en jabalís silvestres como en granjas porcinas en todo el territorio nacional.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA) (17 de febrero de 2026). ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE PESTE PORCINA AFRICANA EN JABALÍES SILVESTRES EN CATALUÑA

Recuperado de: <https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/noticias-sanidad-animal/documentos-de-noticias/nota-actualizacion-situacion-ppa-17-02-2026.pdf>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



España: Cataluña refuerza la lucha contra la Peste Porcina Africana con drones de visión térmica.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 17 de febrero de 2026, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña informó que se ha fortalecido y adaptado la estrategia de contención de la Peste Porcina Africana (PPA) tras confirmar nuevos casos positivos en jabalís, incluido uno en Sant Feliu de Llobregat, lo que ha obligado a ampliar la zona de alto riesgo e incorporar este municipio y parte de Barcelona, alcanzando 16 municipios afectados y un total de 162 casos desde noviembre.

Ante la expansión hacia el sur de Collserola, se ha solicitado apoyo extraordinario al Estado para incrementar recursos y mantener el operativo de control.

Las autoridades intensificarán las medidas de contención mediante nuevos cierres perimetrales, barreras adicionales en infraestructuras clave y refuerzo del control poblacional de jabalís. También se ha pedido apoyo estatal con estaciones de desinfección, drones con cámaras térmicas, participación de la Unidad Militar de Emergencias, SEPRONA y TRAGSA, además de nuevas trampas colectivas y unidades caninas, para mejorar la localización, captura y retirada de animales y cadáveres.

El Gobierno ha destacado la cooperación con ayuntamientos y la necesidad de informar a la población sobre las restricciones en la zona de alto riesgo, donde se limita el acceso al medio natural y se exige control de residuos y alimentación animal para evitar la atracción de jabalís. Asimismo, el operativo de vigilancia se mantiene activo las 24 horas, con cerca de 100 efectivos diarios y medidas de vigilancia, captura y contención perimetral para evitar la propagación del virus a otras zonas y a granjas porcinas.

Finalmente, se informó que las capturas de jabalís continúan como parte del control poblacional, con resultados negativos en la zona de bajo riesgo y más de 13.000 animales capturados en Cataluña desde enero de 2026, con el objetivo principal de contener el virus en el menor radio posible y proteger el sector porcino.

Referencia: Generalitat de Catalunya (17 de febrero de 2026). El Govern reforça i adapta l'estratègia de contenció de la pesta porcina africana per l'ampliació de municipis d'alt risc

Recuperado de: <https://govern.cat/salaprensa/notes-premsa/792276/govern-reforca-adapta-lestrategia-contencio-pesta-porcina-africana-lampliacio-municipis-dalt-risc>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Alemania: Publica actualización de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana, en Europa.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 17 de febrero de 2026, el Instituto Friedrich Loeffler (FLI) publicó la actualización sobre la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana (PPA) en Europa.

Con corte al 10 de febrero de 2026, se han registrado un total de 1,669 casos en lo que va del año, lo que representa un aumento de 3 brotes en cerdos y 183 casos en jabalís en comparación con la actualización anterior, con fecha de corte al 4 de febrero. En lo que va del año, se han identificado 51 brotes en cerdos y 1,618 casos en jabalís, distribuidos de la

siguiente manera:

País	Número de cerdos	Número de jabalís
Bosnia y Herzegovina	1	3
Bulgaria	0	272
Alemania	0	49
Estonia	0	22
Grecia	0	1
Italia	0	167
Croacia	1	43
Letonia	1	175
Lituania	0	186
Moldavia	6	10
Polonia	0	321
Rumania	34	134
Serbia	8	14
Eslovaquia	0	30
España	0	18
Ucrania	0	3
Hungría	0	170

Referencia: Instituto Friedrich Loeffler (FLI) (17 de febrero de 2026). Afrikanische Schweinepest (Genotyp II) in Europa 2026

Recuperado de: <https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/>