



Gobierno de  
**México**

**Agricultura**

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




**SENASICA**

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



# Monitor Zoosanitario

7 de julio de 2026



# Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE

## Contenido

<b>Croacia: Confirma un nuevo brote de Peste de los Pequeños Rumiantes en Virovitica-Podravina. ....</b>	<b>2</b>
<b>España: Confirma dos nuevos focos de enfermedad de Newcastle en Valladolid. ....</b>	<b>3</b>
<b>Corea del Sur: Concluye la vacunación preventiva contra la Fiebre Aftosa serotipo SAT1 en zonas fronterizas. ....</b>	<b>4</b>
<b>Guatemala: MAGA inspecciona más de 247 mil animales para el control del Gusano Barrenador del Ganado. ....</b>	<b>5</b>
<b>Internacional: FAO fortalece la evaluación rápida de riesgos ante la Influenza Aviar. ....</b>	<b>6</b>



### **Croacia: Confirma un nuevo brote de Peste de los Pequeños Rumiantes en Virovitica-Podravina.**



Imagen representativa de las especies involucradas.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 7 de julio de 2026, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Croacia informó la confirmación de un nuevo brote de Peste de los Pequeños Rumiantes (PPR) en una explotación ovina ubicada en la localidad de Čeralije, municipio de Voćin, en el condado de Virovitica-Podravina, elevando a 11 el número total de brotes registrados en el país desde principios de junio.

Como parte de la respuesta sanitaria, las autoridades establecieron una zona de protección, una zona de vigilancia y una zona de restricción adicional que abarcan localidades y municipios de los condados de Zagreb, Bjelovar-Bilogora, Požega-Slavonia, Sisak-Moslavina, Virovitica-Podravina y Koprivnica-Križevci, con el objetivo de contener la propagación de la enfermedad.

Las autoridades precisaron que, del total de brotes confirmados, seis se han registrado en la ciudad de Daruvar, uno en la ciudad de Čazma, ambos en el condado de Bjelovar-Bilogora, y cuatro en el municipio de Voćin, en el condado de Virovitica-Podravina.

Finalmente, el Ministerio exhortó a los propietarios de ovinos y caprinos a cumplir estrictamente las medidas sanitarias establecidas para el control y la prevención de la Peste de los Pequeños Rumiantes, con el fin de limitar la dispersión de la enfermedad.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Croacia. (7 de julio de 2026). Izbijanje kuge malih preživača u naselju Čeralije, općini Voćin u Virovitičko-podravskoj županiji.

Recuperado de: <https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/izbijanje-kuge-malih-prezivaca-u-naselju-ceralije-opcini-vocin-u-viroviticke-podravskoj-zupaniji/8371>



### España: Confirma dos nuevos focos de enfermedad de Newcastle en Valladolid.



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 6 de julio de 2026, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España informó la confirmación de dos nuevos focos de enfermedad de Newcastle en explotaciones avícolas ubicadas en los municipios de Íscar y Megeces, en la provincia de Valladolid, elevando a 13 el número total de focos registrados en la zona.

Las explotaciones afectadas corresponden a una granja de pollos de engorda con aproximadamente 38 mil aves no vacunadas y a una granja de 181 mil pollitas de recría vacunadas

con una dosis.

Las muestras analizadas por el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete confirmaron mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) la presencia de una cepa velogénica del virus de la enfermedad de Newcastle, correspondiente al genotipo VII.2. Asimismo, el análisis de secuenciación descartó un vínculo epidemiológico con los brotes registrados previamente en la provincia de Valencia, asociados al genotipo VII.1.1.

En respuesta, los Servicios Veterinarios Oficiales implementaron la inmovilización inmediata de las explotaciones afectadas, realizaron la investigación epidemiológica y llevaron a cabo el vacío sanitario, incluyendo la destrucción de cadáveres, alimento y otros materiales potencialmente contaminados. Además, mantuvieron las zonas de restricción de 3 y 10 kilómetros alrededor de los focos para reforzar la vigilancia y prevenir la propagación de la enfermedad.

Finalmente, el MAPA exhortó a reforzar la vigilancia epidemiológica, las medidas de bioseguridad y los programas de vacunación en las explotaciones avícolas, destacando que, aunque la vacunación no evita completamente la infección, contribuye a disminuir la excreción viral y el riesgo de diseminación del virus hacia otras granjas.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA). (6 de julio de 2026). ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID.

Recuperado de: [https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/noticias-sanidad-animal/documentos-de-noticias/nota-actualizaci-n-newcastle-06\\_07\\_26.pdf](https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/noticias-sanidad-animal/documentos-de-noticias/nota-actualizaci-n-newcastle-06_07_26.pdf)



### Corea del Sur: Concluye la vacunación preventiva contra la Fiebre Aftosa serotipo SAT1 en zonas fronterizas.



Imagen representativa de las especies involucradas.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 7 de julio de 2026, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) de Corea del Sur informó la conclusión de la campaña de vacunación preventiva contra el serotipo SAT1 de la Fiebre Aftosa (FA) en 170 mil bovinos, caprinos y otros rumiantes ubicados en 11 ciudades y condados de alto riesgo en la zona fronteriza, como parte de las acciones para prevenir la introducción del virus al país.

La campaña se implementó tras la detección de brotes del serotipo SAT1 en China y Mongolia, e incluyó la aplicación de dos dosis de vacuna, debido a que este serotipo no se había presentado previamente en el país. Asimismo, las autoridades informaron que prevén contar con un inventario de 10 millones de dosis de vacuna antes de finalizar 2026 para fortalecer la capacidad de respuesta ante una eventual incursión del virus.

Adicionalmente, el MAFRA vacunó alrededor de 16 mil rumiantes en centros de conservación de recursos genéticos y amplió temporalmente el periodo para solicitar indemnizaciones por posibles reacciones adversas asociadas con la vacunación. También anunció que realizará pruebas de anticuerpos para evaluar la respuesta inmunitaria de los animales vacunados.

Finalmente, las autoridades informaron que en septiembre iniciará una nueva campaña de vacunación contra el serotipo SAT1 dirigida a aproximadamente 770 mil rumiantes de la región de la Costa Oeste, al tiempo que exhortaron a productores y población en general a reforzar las medidas de bioseguridad y cumplir con las disposiciones sanitarias para evitar la introducción de nuevos serotipos de FA al país.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA). (7 de julio de 2026). 구제역 SAT1형 백신, 접경지역 접종 완료.

Recuperado de: <https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/578395/artclView.do>



### Guatemala: MAGA inspecciona más de 247 mil animales para el control del Gusano Barrenador del Ganado.



El 6 de julio de 2026, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala informó que, como parte de las acciones para prevenir la dispersión del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), durante el primer semestre de 2026 fueron inspeccionados 247,741 animales, tratados preventivamente 89,880 y verificadas 10,169 unidades de transporte.

Las acciones de vigilancia se llevaron a cabo en puestos de control, rutas de movilización y establecimientos pecuarios, donde personal técnico realizó inspecciones sanitarias, aplicó tratamientos preventivos cuando fue necesario y supervisó el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Asimismo, las autoridades señalaron que la verificación de las unidades de transporte constituye una medida clave para fortalecer el control de la movilización pecuaria y reducir el riesgo de dispersión del parásito entre las distintas regiones del país.

Estas actividades forman parte de la estrategia permanente del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Gusano Barrenador, mediante la cual el MAGA busca fortalecer la vigilancia zoonosaria, proteger la salud animal y preservar la producción pecuaria nacional frente a esta plaga.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). (6 de julio de 2026). Más de 247 mil animales inspeccionados para prevenir el Gusano Barrenador en el primer semestre de 2026.

Recuperado de: <https://www.maga.gob.gt/mas-de-247-mil-animales-inspeccionados-para-prevenir-el-gusano-barrenador-en-el-primer-semestre-de-2026/>



### Internacional: FAO fortalece la evaluación rápida de riesgos ante la Influenza Aviar.



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 6 de julio de 2026, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, informó la realización de un taller de capacitación para fortalecer la capacidad institucional de evaluación rápida de riesgos (ERR), utilizando como escenario la posible introducción del virus de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) H5N1 desde países vecinos con circulación activa.

Durante el taller, 37 especialistas de distintas áreas técnicas del SAG aplicaron la metodología de evaluación rápida de riesgos de la FAO mediante un ejercicio práctico orientado a fortalecer la preparación, la toma de decisiones y la respuesta ante emergencias zoonositarias en contextos con información limitada e incertidumbre.

La capacitación respondió a necesidades previamente identificadas en la evaluación de las capacidades de alerta temprana del SAG, particularmente en materia de monitoreo de riesgos, comunicación del riesgo y toma de decisiones basada en eventos. Asimismo, permitió integrar conocimientos de epidemiología, sanidad animal, fauna silvestre, control fronterizo, inocuidad alimentaria, comercio exterior y otras áreas relacionadas con la gestión sanitaria.

Finalmente, la FAO y el SAG señalaron que la metodología evaluada podría incorporarse de manera permanente a los procesos institucionales de vigilancia y respuesta, con el propósito de fortalecer la capacidad para anticipar, evaluar y gestionar riesgos zoonositarios antes y durante emergencias sanitarias.

Referencia: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (6 de julio de 2026). FAO and Chile's veterinary services build rapid risk assessment capacity using an avian influenza scenario.

Recuperado de: <https://www.fao.org/animal-health/news-events/news/detail/fao-and-chile-s-veterinary-services-build-rapid-risk-assessment-capacity-using-an-avian-influenza-scenario/en>



Gobierno de  
**México**

**Agricultura**

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




**SENASICA**

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



# Monitor Peste Porcina Africana

7 de julio de 2026



# Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

## Contenido

**Alemania: Estudio destaca el potencial de la vacunación imperfecta para el control de la Peste Porcina Africana en jabalís silvestres. .... 2**

**Filipinas: Fortalece medidas preventivas contra la Peste Porcina Africana en Antique. .... 3**

**Italia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en las regiones de Liguria y Piamonte..... 4**

# Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



## Alemania: Estudio destaca el potencial de la vacunación imperfecta para el control de la Peste Porcina Africana en jabalís silvestres.



El 2 de julio de 2026, investigadores del Centro Helmholtz para la Investigación Ambiental (UFZ), de Alemania, difundieron un estudio prepublicado en el que evaluaron, mediante un modelo de simulación espacial, el impacto de la vacunación imperfecta para el control de la Peste Porcina Africana (PPA) en poblaciones de jabalís silvestres.

Los resultados demostraron que, aunque las vacunas con protección parcial pueden reducir significativamente la propagación de la enfermedad, su eficacia depende de la combinación entre la capacidad para disminuir la susceptibilidad a la infección y la reducción de la transmisibilidad de los animales que desarrollan infecciones posteriores a la vacunación. Asimismo, diferentes perfiles vacunales pueden generar niveles similares de contención de la enfermedad mediante mecanismos biológicos distintos.

El estudio evidenció que la vacunación oral aplicada como barrera espacial limita el avance del virus en poblaciones de jabalís, aunque su desempeño varía según la respuesta inmunitaria individual y la persistencia de la protección. Además, los autores señalaron que la confiabilidad de una vacuna no debe evaluarse únicamente por su eficacia promedio, sino también por la consistencia de sus resultados frente a diferentes escenarios epidemiológicos y a la variabilidad propia de la dinámica de transmisión.

Los investigadores destacaron que la evaluación de futuras vacunas contra la PPA debe considerar por separado su capacidad para prevenir la infección y reducir la transmisión del virus, ya que ambas características influyen de manera diferente en el control de la enfermedad. Asimismo, concluyeron que la vacunación debe implementarse como parte de una estrategia integral que incluya vigilancia epidemiológica, búsqueda y eliminación de cadáveres, medidas de bioseguridad y manejo poblacional para lograr un control más efectivo de la enfermedad.

Referencia: Vianney Sicard, Hans-Hermann Thulke. Mechanistic Insights into Imperfect Vaccination for African Swine Fever Control. 2026. ([hal-05677066](https://hal-05677066))  
Recuperado de: <https://hal.science/hal-05677066v1>

# Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



## Filipinas: Fortalece medidas preventivas contra la Peste Porcina Africana en Antique.



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 3 de julio de 2026, la Agencia de Noticias de Filipinas (PNA) informó que la Corporación Filipina de Seguros Agrícolas (PCIC) exhortó a los productores porcinos de la provincia de Antique a asegurar gratuitamente a sus animales como medida preventiva ante el riesgo de introducción de la Peste Porcina Africana (PPA), enfermedad que ya se ha confirmado en las provincias vecinas de Capiz e Iloilo.

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades señalaron que las solicitudes de aseguramiento únicamente podrán presentarse mientras la provincia permanezca libre de la enfermedad, además de indicar que los productores deberán estar inscritos en el Sistema de Registro de los Sectores Básicos de la Agricultura para acceder al beneficio.

De manera paralela, la Oficina Veterinaria Provincial fortaleció los controles fronterizos en los accesos norte y sur de Antique, estableció requisitos de vigilancia sanitaria para la movilización de cerdos hacia la provincia de Aklan y exhortó a los transportistas procedentes de Iloilo a desinfectar sus vehículos antes de ingresar al territorio.

Las autoridades destacaron que estas medidas buscan fortalecer la preparación de la provincia frente a una posible incursión del virus y reducir el riesgo de propagación de la enfermedad mediante el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y las acciones de bioseguridad.

Referencia: Agencia de Noticias de Filipinas (PNA). (3 de julio de 2026). PCIC urges growers to insure hogs before ASF hits Antique.

Recuperado de: [https://www.pna.gov.ph/articles/1278639?\\_cf\\_chl\\_f\\_tk=gvl.DeDZ6FTK1i85oFUZZ988sbkefuALyqSZ.r86ZpY-1783449842-1.0.1.1-Eiq4OW7G5bl2NJ44qFuXCx\\_BqE8SJ2Vji5fq5PHmnpQ](https://www.pna.gov.ph/articles/1278639?_cf_chl_f_tk=gvl.DeDZ6FTK1i85oFUZZ988sbkefuALyqSZ.r86ZpY-1783449842-1.0.1.1-Eiq4OW7G5bl2NJ44qFuXCx_BqE8SJ2Vji5fq5PHmnpQ)

# Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

## Italia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en las regiones de Liguria y Piamonte.



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 7 de julio de 2026, el Instituto Zooprofiláctico Experimental de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta informó la actualización de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana (PPA) en el norte de Italia.

De acuerdo con el reporte, se confirmaron dos nuevos casos positivos de la enfermedad en jabalís silvestres, ambos detectados en la región de Liguria, elevando el total acumulado a 2,170 casos registrados en fauna silvestre.

Del total, 1,347 corresponden a Liguria y 823 a Piamonte, mientras que los brotes confirmados en explotaciones porcinas permanecen estables en 10.

Los nuevos casos fueron identificados en las provincias de Génova y Savona. Asimismo, el número de municipios italianos con al menos un caso confirmado de PPA en jabalís silvestres se mantiene en 205.

Referencia: Instituto Zooprofiláctico Experimental de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta. (7 de julio de 2026). I CONTROLLI PER LA PSA – IN LIGURIA DUE NUOVI POSITIVI TRA I CINGHIALI, NESSUNO IN PIEMONTE.

Recuperado de: <https://www.izspltv.it/it/notizie/308-peste-suina-africana/2410-controlli-psa-26-06-23.html>