



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

21 de julio de 2026



Monitor Zoonosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

EUA: APHIS confirma nuevos predios con Estomatitis Vesicular en Colorado y Nuevo México.....	2
Grecia: Fortalece la vigilancia del Virus del Oeste del Nilo tras confirmar casos en humanos.....	3
Australia: Fortalece la respuesta sanitaria frente a la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5.....	4
Corea del Sur: mantiene bajo control el brote de Fiebre Aftosa en Yecheon. .	5



EUA: APHIS confirma nuevos predios con Estomatitis Vesicular en Colorado y Nuevo México.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 20 de julio de 2026, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó, a través de su reporte de situación del virus de la Estomatitis Vesicular (EV), que con corte a esa fecha se confirmaron dos nuevos predios equinos positivos en los condados de Archuleta y La Plata, Colorado, así como un nuevo predio equino presuntamente positivo en el condado de Valencia, Nuevo México. Con esta actualización, el evento sanitario acumula 35 instalaciones afectadas en tres estados (Arizona, Colorado y Nuevo México), de las cuales 27 han sido confirmadas por laboratorio y ocho corresponden a casos presuntivos.

De acuerdo con la información proporcionada por el APHIS, la distribución de los brotes y su estatus epidemiológico es la siguiente:

- En Colorado, se confirmaron dos nuevos predios equinos positivos en los condados de Archuleta y La Plata, los cuales permanecen bajo cuarentena. Con ello, el estado registra seis instalaciones afectadas en los condados de Archuleta, La Plata, Montezuma y Montrose; de estas, dos permanecen bajo cuarentena y cuatro ya fueron liberadas de las restricciones sanitarias.
- En Nuevo México, se confirmó un nuevo predio equino presuntamente positivo en el condado de Valencia. En total, el estado acumula 14 instalaciones afectadas en los condados de Rio Arriba, Sandoval, Santa Fe y Valencia; de ellas, dos permanecen bajo cuarentena y 12 han sido liberadas de las restricciones sanitarias.
- En Arizona, se mantienen 15 instalaciones afectadas distribuidas en los condados de Cochise, Gila, Maricopa, Pinal, Santa Cruz y Yavapai. Todas han sido liberadas de cuarentena y no se han registrado nuevos casos desde el 20 de abril de 2026.

Asimismo, el APHIS informó que, desde el reporte anterior, se levantó la cuarentena en un predio del condado de Montrose, Colorado, y en otro del condado de Rio Arriba, Nuevo México. Como resultado, 31 de las 35 instalaciones afectadas han sido liberadas de las restricciones sanitarias, mientras que cuatro permanecen bajo cuarentena.

Referencia: Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS). (20 de julio de 2026). 2026 Vesicular Stomatitis Virus (VSV) Situation Report – July 20, 2026.

Recuperado de: <https://www.aphis.usda.gov/sites/default/files/vsv-sitrep-7-20-26.pdf>



Grecia: Fortalece la vigilancia del Virus del Oeste del Nilo tras confirmar casos en humanos.



Imagen representativa del vector involucrado
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 20 de julio de 2026, el Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación de Grecia informó la confirmación de cinco casos de infección por el Virus del Oeste del Nilo (VON) en humanos, registrados entre el 7 y el 10 de julio en las regiones de Ática y Tesalia. Ante esta situación, las autoridades fortalecieron las acciones de vigilancia epidemiológica contempladas en el Programa Nacional de Vigilancia del VON, con el objetivo de detectar oportunamente la circulación del virus y reducir el riesgo de transmisión.

Como parte de estas acciones, el Ministerio instruyó a las autoridades veterinarias a intensificar la vigilancia pasiva y activa del VON, mediante el fortalecimiento del muestreo en équidos y aves silvestres, consideradas especies centinela para la detección temprana del virus. Asimismo, recordó la obligación de notificar de manera inmediata cualquier caso confirmado en équidos, conforme a los procedimientos establecidos en el programa nacional de vigilancia.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la notificación oportuna de casos en animales constituyen herramientas fundamentales para evaluar la circulación del virus, orientar las medidas de control y proteger la salud animal y pública mediante una respuesta coordinada entre los servicios veterinarios y las autoridades sanitarias.

Referencia: Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación de Grecia. (20 de julio de 2026). Θέμα: «Ενημέρωση για περιστατικά λοίμωξης από τον Ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους».

Recuperado de: https://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/ejkyklios191465_200726.pdf



Australia: Fortalece la respuesta sanitaria frente a la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5.



Imagen representativa de la vigilancia epidemiológica y respuesta sanitaria frente a la IAAP H5 en Australia Meridional.
Créditos: Imagen creada con IA.

El 20 de julio de 2026, el Gobierno de Australia Meridional informó el lanzamiento de un portal oficial de información sobre la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) H5, como parte de las acciones para fortalecer la respuesta sanitaria y mantener informados a productores, veterinarios, cuidadores de fauna silvestre y a la población sobre la situación epidemiológica de la enfermedad.

Asimismo, las autoridades señalaron que continúan ampliando las operaciones de

vigilancia aérea y terrestre para la detección temprana del virus, incluyendo monitoreos en más de 12,000 kilómetros de costa y la incorporación de nuevos recorridos en el río Murray. Además, mantienen la capacitación de personal veterinario y cuidadores de fauna silvestre, así como la coordinación con la industria avícola para fortalecer las medidas de bioseguridad y evaluar acciones preventivas ante posibles nuevas detecciones.

De acuerdo con el Gobierno, la Línea Directa de Emergencia para Enfermedades Animales ha recibido más de 2,200 reportes, de los cuales se han analizado más de 250 aves, manteniéndose cinco casos confirmados de IAAP H5 al 20 de julio, todos en fauna silvestre.

Finalmente, las autoridades reiteraron que no se han detectado casos en aves de corral ni eventos de mortalidad masiva de fauna silvestre en Australia, e hicieron un llamado a la población para reportar oportunamente cualquier ave silvestre enferma o muerta, a fin de fortalecer la vigilancia epidemiológica y la respuesta sanitaria frente a la enfermedad.

Referencia: Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia Meridional (PIRSA). (20 de julio de 2026). New hub for bird flu info as state response continues.

Recuperado de: <https://pir.sa.gov.au/news/emergencies-and-recovery/new-hub-for-bird-flu-info-as-state-response-continues>



Corea del Sur: Mantiene bajo control el brote de Fiebre Aftosa en Yecheon.



El 21 de julio de 2026, el Cuartel General Central de Gestión de Desastres para la Fiebre Aftosa de Corea del Sur informó que las medidas de control implementadas tras la confirmación de un brote de Fiebre Aftosa (FA) en Yecheon, provincia de Gyeongsang del Norte, se desarrollan de manera satisfactoria y, hasta el momento, no se han detectado nuevos casos sospechosos.

Las autoridades indicaron que, tras la confirmación del brote el 3 de julio, se establecieron restricciones de movimiento en las explotaciones afectadas y en las ubicadas dentro de un radio de 3 kilómetros, además de realizar el sacrificio sanitario de 38 animales positivos (24 bovinos y 14 porcinos).

Asimismo, las autoridades elevaron al nivel de "grave" la alerta sanitaria en Yecheon y seis municipios vecinos, fortalecieron las labores de desinfección con 69 unidades especializadas y completaron la vacunación de emergencia y las inspecciones clínicas en 8,122 explotaciones de bovinos y porcinos, que albergan aproximadamente 852,000 animales. Además, mantienen la vigilancia clínica periódica en las granjas de riesgo y el monitoreo semanal de cerca de 97,000 explotaciones de animales susceptibles en todo el país, sin detectar anomalías adicionales.

Finalmente, el Cuartel General informó que continuará con la vigilancia epidemiológica y las medidas de bioseguridad a nivel nacional, y señaló que, a partir del 25 de julio, realizará inspecciones detalladas en las explotaciones ubicadas dentro del radio de restricción. En caso de obtener resultados negativos, se procederá al levantamiento de las restricciones de movimiento. Asimismo, exhortó a los productores a cumplir estrictamente con los programas de vacunación y las medidas de desinfección para prevenir la propagación de la enfermedad.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA). (21 de julio de 2026). 경북 예천 구제역 방역조치 차질 없이 추진 중.

Recuperado de: <https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/578506/artclView.do>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

21 de julio de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Serbia: Fortalece las medidas contra la Peste Porcina Africana tras la eliminación de casi 28,000 cerdos.	2
Croacia: Confirma cinco nuevos brotes de Peste Porcina Africana; suman 99 focos en 2026.	3
Taiwán: Confirma la detección del virus de la Peste Porcina Africana en un cerdo hallado en la costa de Kinmen.	4
Kosovo: Fortalece las medidas de bioseguridad para prevenir la introducción de la Peste Porcina Africana.	5

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Serbia: Fortalece las medidas contra la Peste Porcina Africana tras la eliminación de casi 28,000 cerdos.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

Entre el 18 y 19 de julio de 2026, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Gestión del Agua de Serbia fortaleció las acciones para contener la Peste Porcina Africana (PPA), tras celebrar reuniones de los centros de crisis en Sremska Mitrovica, Obrenovac y Šabac. Las autoridades informaron que el virus permanece activo en siete distritos y 52 localidades, con los principales focos en Srem, Mačva y parte de Belgrado, y señalaron que casi 28,000 cerdos han sido eliminados como resultado de la enfermedad y de las medidas de sacrificio sanitario.

Como parte de las acciones acordadas, el Ministerio ordenó mantener en sesión permanente a los centros de crisis, fortalecer la coordinación entre los servicios veterinarios, el Ministerio del Interior, el Ejército serbio y los gobiernos locales, además de reforzar las medidas de bioseguridad, la eutanasia oportuna de animales infectados, la eliminación segura de cadáveres y la vigilancia sobre el movimiento de jabalís y cerdos para reducir el riesgo de propagación del virus.

Las autoridades advirtieron que no se tolerarán incumplimientos a las medidas sanitarias ni la eliminación inadecuada de animales muertos, por lo que los casos detectados serán canalizados a las autoridades competentes para la aplicación de las sanciones correspondientes. Asimismo, continuarán realizando inspecciones y visitas sin previo aviso para verificar el cumplimiento de las disposiciones.

Finalmente, el Ministerio reiteró que la PPA no representa un riesgo para la salud humana, pero continúa ocasionando importantes pérdidas económicas para la porcicultura. Además, destacó como prioridad proteger la región de Mačva, una de las principales zonas productoras de cerdos de Serbia, para evitar que el virus se propague al resto del país.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Gestión del Agua de Serbia. (18 de julio de 2026). Министар Гламочић: Само заједничким деловањем можемо зауставити ширење афричке куге свиња.

Recuperado de: <https://minpolj.gov.rs/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%9b-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%98%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b4/>

Recuperado de: <https://minpolj.gov.rs/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%9b-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%81%d0%b2/>

Recuperado de: <https://minpolj.gov.rs/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%9b-%d1%83-%d1%88%d0%b0%d0%bf%d1%86%d1%83-%d0%be%d0%b4%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%b2%d0%b5-%d1%98%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%be/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Croacia: Confirma cinco nuevos brotes de Peste Porcina Africana; suman 99 focos en 2026.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 21 de julio de 2026, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Croacia informó la confirmación de cinco nuevos brotes de Peste Porcina Africana (PPA) en explotaciones porcinas de los condados de Osijek-Baranja y Virovitica-Podravina, con lo que el acumulado en 2026 ascendió a 99 brotes. Asimismo, señaló que se han confirmado 184 casos en jabalís, principalmente en el condado de Osijek-Baranja, lo que evidencia la persistencia de la circulación del virus en poblaciones domésticas y silvestres.

Las autoridades informaron que, como parte de las medidas para contener la enfermedad, alrededor de 3,758 cerdos han sido sacrificados en los condados afectados. Además, continúan implementando las acciones de control y erradicación en coordinación con la Inspección Estatal, el Instituto Veterinario Croata, las administraciones locales y regionales, y otros organismos competentes, con el objetivo de limitar la propagación del virus y dar seguimiento a los focos confirmados.

Asimismo, indicaron que los brotes se concentran en diversas localidades de los condados de Osijek-Baranja y Virovitica-Podravina, donde se mantienen las actividades de vigilancia epidemiológica, investigación de los casos y aplicación de las medidas sanitarias establecidas para controlar la enfermedad tanto en explotaciones porcinas como en poblaciones de jabalís.

Finalmente, el Ministerio exhortó a los productores a aplicar de manera estricta las medidas de bioseguridad, notificar de inmediato cualquier sospecha de la enfermedad a los servicios veterinarios autorizados y cumplir las disposiciones oficiales, con el propósito de prevenir nuevos brotes y reducir el riesgo de dispersión de la PPA en el país.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Croacia. (21 de julio de 2026). Afrička svinjska kuga – stanje na dan 21. srpnja 2026. u 15 sati.

Recuperado de: <https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/africka-svinjska-kuga-stanje-na-dan-21-srpnja-2026-u-15-sati/8392>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Taiwán: Confirma la detección del virus de la Peste Porcina Africana en un cerdo hallado en la costa de Kinmen.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 16 de julio de 2026, diversos medios de comunicación informaron que las autoridades de Taiwán confirmaron la detección del virus de la Peste Porcina Africana (PPA) en el cadáver de un cerdo hallado flotando en la costa del condado de Kinmen.

Tras la confirmación, el Gobierno activó el nivel más alto de respuesta sanitaria, reforzó los controles fronterizos y suspendió durante una semana la exportación de carne de cerdo y productos porcinos desde Kinmen hacia Taiwán y

otras islas periféricas. Asimismo, las inspecciones realizadas en 25 granjas porcinas ubicadas en un radio de 10 kilómetros, que albergan 5,033 cerdos, confirmaron que los animales se encontraban clínicamente sanos y no presentaban evidencia de la enfermedad.

Las autoridades informaron que el cadáver fue incinerado en el sitio, se realizaron labores de desinfección y se reforzaron las patrullas costeras para prevenir el ingreso de nuevos animales arrastrados por las corrientes marinas. Además, el Instituto de Investigación Veterinaria determinó, mediante análisis genéticos, que el virus corresponde a una cepa recombinante ampliamente distribuida en China, con alta similitud a variantes detectadas previamente en Hong Kong y en un cerdo hallado en Kinmen en 2025, por lo que el evento fue clasificado como un caso importado.

Finalmente, las autoridades reiteraron que mantienen la vigilancia epidemiológica y las medidas de bioseguridad en coordinación con los organismos competentes, e hicieron un llamado a la población para no introducir productos porcinos al país y reportar de inmediato el hallazgo de cadáveres de cerdos, con el fin de prevenir la introducción y propagación de la PPA en la industria porcina taiwanesa.

Referencia: Agencia Central de Noticias. (16 de julio de 2026). 海漂豬檢出非洲豬瘟 金門縣府：鄰近豬場豬隻健康.

Recuperado de: <https://www.cna.com.tw/news/ahel/202607160327.aspx>

Recuperado de: <https://www.cna.com.tw/news/aip/202607160374.aspx>

Referencia: Taipei Times. (19 de julio de 2026). Kinmen swine fever case prompts agency action.

Recuperado de: <https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2026/07/19/2003861005>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Kosovo: Fortalece las medidas de bioseguridad para prevenir la introducción de la Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 21 de julio de 2026, la Agencia de Alimentos y Veterinaria (AVA) de Kosovo exhortó a los productores porcinos a reforzar las medidas de bioseguridad ante el incremento de brotes de Peste Porcina Africana (PPA) en países de la región.

Aunque hasta el momento no se han confirmado casos en Kosovo, la autoridad sanitaria advirtió que el riesgo de introducción del virus permanece elevado y solicitó la aplicación estricta de las medidas preventivas establecidas en la legislación veterinaria.

Entre las acciones recomendadas se incluyen restringir el ingreso de personas y vehículos a las explotaciones, desinfectar instalaciones, equipos y medios de transporte, evitar el contacto entre cerdos domésticos y jabalís, no utilizar desperdicios de alimentos para la alimentación de los animales, adquirir cerdos únicamente de explotaciones registradas y notificar de inmediato cualquier sospecha clínica a los servicios veterinarios.

Finalmente, la AVA reiteró que la PPA no representa un riesgo para la salud humana, aunque ocasiona importantes pérdidas económicas en la producción porcina, y señaló que mantiene la vigilancia epidemiológica permanente para prevenir la introducción y propagación de la enfermedad en el país.

Referencia: Agencia Alimentaria y Veterinaria de Kosovo. (21 de julio de 2026). Thirrje për fermerët mbajtës të Derrave për shkak të përhapjes së sëmundjes Mortaja Afrikane e Derrave në rajon.

Recuperado de: <https://auvk.rks-gov.net/thirrje-per-fermeret-mbajtes-te-derrave-per-shkak-te-perhapjes-se-semundjes-mortaja-afrikane-e-derrave-ne-rajon/>