



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

23 de junio de 2026



Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

| | |
|---|----------|
| Australia: Detección de casos de Influenza Aviar Tipo H5 en aves silvestres..... | 2 |
| Guatemala: Atienden a perros con miasis como parte del control del Gusano Barrenador del Ganado..... | 3 |
| Estados Unidos: Expansión de la Rabia en fauna silvestre y riesgo de transmisión a ganado..... | 4 |
| Mongolia: Fortalece control sanitario tras brote de Fiebre Aftosa con apoyo de China..... | 5 |

Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE



Australia: Detección de casos de Influenza Aviar Tipo H5 en aves silvestres.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 20 de junio de 2026 el Departamento de Agricultura, pesca y silvicultura publicó a través de su portal de noticias las primeras detecciones en su territorio de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IIAAP) tipo H5 (clado H5N1). El agente patógeno fue identificado por el Centro Australiano de Preparación para Enfermedades en un *skua pardo*, un ave marina migratoria que fue encontrada enferma el 14 de junio en una zona aislada del sur de Australia Occidental.

Las autoridades también analizaron muestras de un petrel gigante enfermo de la misma región que resultó positivo.

Hasta el momento no se han detectado casos en aves de corral ni se ha observado mortalidad en otras especies, por lo que Australia mantiene su estatus internacional de país libre de influenza aviar altamente patógena en la producción avícola.

Las autoridades sanitarias señalaron que la carne de pollo y los huevos siguen siendo seguros para el consumo cuando se manipulan y cocinan adecuadamente.

La respuesta es liderada por el Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional de Australia Occidental, con apoyo del gobierno federal, mientras se intensifican las labores de vigilancia para determinar el alcance de la infección en la fauna silvestre.

Asimismo, se invita a la población a reportar aves o animales enfermos o muertos y evitar cualquier contacto directo con ellos.

Referencia: Departamento de agricultura, pesca y silvicultura. (20 de junio de 2026). Detection of H5 bird flu in Australia. Recuperado de: https://www.agriculture.gov.au/campaigns/birdflu#h5_detection

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal. WAHIS. (20 de junio de 2026). Australia - Influenza de tipo A de alta patogenicidad (Inf. por los virus de la) (aves que no sean de corral, incluyendo las silvestres) (2017-) - Notificación inmediata Recuperado de: <https://wahis.woah.org/#/in-review/7649?fromPage=event-dashboard-url>



Guatemala: Atienden a perros con miasis como parte del control del Gusano Barrenador del Ganado.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 18 de junio de 2026 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) comunicó a través de su sitio web que se atendieron diversos casos de miasis asociadas al Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en perros de los departamentos de Jutiapa, San Marcos, Suchitepéquez, Sacatepéquez y Guatemala, como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica y respuesta a reportes ciudadanos.

Los médicos veterinarios realizaron la extracción de larvas, toma de muestras para análisis, curaciones y aplicación de tratamientos en los animales afectados, además de brindar recomendaciones a los propietarios sobre el manejo de heridas y medidas preventivas.

Entre los casos atendidos destacan perros con lesiones en cuello, patas, cola, orejas y otras partes del cuerpo, incluyendo una perra con múltiples miasis en Jutiapa y un caso crónico en Sacatepéquez.

Las intervenciones fueron ejecutadas por personal del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Gusano Barrenador del VISAR, en coordinación con autoridades de salud cuando fue necesario. Asimismo, se verificaron reportes en los que se confirmó la ausencia de infestación al momento de la inspección.

El MAGA reiteró el llamado a la población para reportar oportunamente cualquier sospecha de GBG, con el fin de fortalecer la detección temprana, evitar la propagación de la plaga y proteger la salud animal.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) (18 de junio de 2026). Atienden a perros con miasis como parte del control del Gusano Barrenador.

Recuperado de: <https://guatemala.gob.gt/atienden-a-perros-con-miasis-como-parte-del-control-del-gusano-barrenador/>



Estados Unidos: Expansión de la Rabia en fauna silvestre y riesgo de transmisión a ganado.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 23 de junio de 2026 la Junta de Salud Animal de Minnesota emitió una notificación multiestatal debido a la detección continua de rabia asociada a la variante encontrada en zorrillos en el centro-norte en Iowa, Minnesota, Dakota del Sur y Nebraska, con casos recientes confirmados tanto en fauna silvestre como en ganado bovino.

Desde 2024 se han registrado 10 casos de rabia en bovinos en tres de estos estados, así como 25 casos positivos en zorrillos, lo que evidencia la circulación activa del virus y su transmisión entre

fauna silvestre y ganado en zonas agrícolas del Medio Oeste Superior. En Nebraska también se identificaron variantes adicionales del virus en mapaches, lo que refuerza la necesidad de vigilancia continua.

El informe señala que la interacción entre zorrillos y ganado, facilitada por el acceso a alimentos y refugio en granjas, incrementa el riesgo de contagio. Aunque los casos en ganado son poco frecuentes, se consideran indicadores importantes de actividad viral en la región.

Las autoridades recomiendan fortalecer la bioseguridad, promover la vacunación antirrábica en ganado y mantener la vigilancia epidemiológica. También se advierte que los animales infectados pueden presentar cambios de comportamiento y síntomas neurológicos.

Finalmente, se enfatiza que la rabia puede generar pérdidas económicas significativas y que cualquier sospecha de exposición debe ser evaluada de inmediato por autoridades sanitarias y veterinarias para prevenir riesgos a animales y personas.

Referencia: Minnesota Board of Animal Health (23 de junio de 2026). Multi-State Notification on Terrestrial Rabies Activity in the Upper Midwest.

Recuperado de: <https://content.govdelivery.com/accounts/MNBAH/bulletins/41ca7be>



Mongolia: Fortalece control sanitario tras brote de Fiebre Aftosa con apoyo de China.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 23 de junio la Autoridad General de Servicios Veterinarios publicó a través de diversos medios de comunicación que Mongolia recibió 1.65 millones de dosis de vacuna contra la fiebre aftosa del serotipo SAT-1, procedentes de China, con el objetivo de fortalecer las acciones de control ante los recientes brotes registrados en el país.

De acuerdo con la información oficial, las vacunas fueron adquiridas y entregadas en el contexto de los esfuerzos para contener la enfermedad, considerada altamente contagiosa en el ganado, particularmente en las provincias occidentales de Bayan-Ulgii y Khovd, donde los primeros casos del serotipo SAT-1 fueron confirmados a finales de mayo.

Las autoridades veterinarias señalaron que además del serotipo SAT-1, se han detectado casos del serotipo O en distintas provincias del país, lo que ha llevado a la implementación de medidas de bioseguridad y vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas.



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

23 de junio de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

| | |
|---|----------|
| España: Actualización de protocolo oficial ante sospechas de Peste Porcina Africana..... | 2 |
| Filipinas: Fortalecen medidas de bioseguridad en Negros Occidental ante muertes de cerdos en la región sur. | 3 |
| España: Revisan avances y desafíos en el desarrollo de vacunas contra la Peste Porcina Africana..... | 4 |

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



España: Actualización de protocolo oficial ante sospechas de Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 22 de junio de 2026, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó la actualización del “Protocolo oficial de actuación ante sospechas y confirmaciones de Peste Porcina Africana (PPA) en mataderos y establecimientos de manipulación de caza”.

El protocolo establece los criterios para identificar posibles casos mediante inspecciones *ante mortem* y *post mortem*, basándose en signos clínicos, lesiones

observadas y factores de riesgo epidemiológicos, entre ellos, el origen de los animales.

El documento también menciona el fortalecimiento de la comunicación y la coordinación entre los servicios de salud pública y sanidad animal, exige la toma de muestras para su análisis en el laboratorio nacional de referencia y detalla las medidas de bioseguridad obligatorias que deben seguirse tanto en situaciones de sospecha como de confirmación de la enfermedad.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA) (junio de 2026). MANUAL PRÁCTICO DE OPERACIONES EN LA LUCHA CONTRA LA PESTE PORCINA AFRICANA (APA).

Recuperado de: https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/porcino/ppa/manualpracticoppa_122024.pdf

Diario Veterinario (22 de junio de 2026). ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO OFICIAL DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHAS DE PESTE PORCINA AFRICANA EN MATADEROS.

Recuperado de: <https://www.diarioveterinario.com/t/5928227/actualizan-protocolo-oficial-actuacion-ante-sospechas-peste-porcina-africana-mataderos>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Filipinas: Fortalecen medidas de bioseguridad en Negros Occidental ante muertes de cerdos en la región sur.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 22 de junio de 2026 diversos medios de comunicación anunciaron, a través de la Oficina Veterinaria Provincial, que distintas unidades de gobierno local (LGUs) en Negros Occidental han fortalecido las medidas de bioseguridad ante reportes de muertes de cerdos en la zona sur de la provincia.

Mientras continúan las investigaciones para determinar la causa, los primeros análisis de la

Oficina Veterinaria Provincial sugieren que las condiciones meteorológicas podrían estar relacionadas con la mortalidad.

Como medida preventiva, municipios como La Castellana han restringido temporalmente la entrada de cerdos vivos y productos porcinos, mientras que San Enrique espera los resultados de pruebas de laboratorio tras reportar unas 500 muertes porcinas. Asimismo, se han fortalecido los controles sobre la comercialización de productos cárnicos para proteger su estatus sanitario.

Cabe mencionar que Negros Occidental cuenta con una de las provincias con mayor producción de cerdos en el país y registró casi 18,000 muertes porcinas en unas 20 unidades de gobierno local en 2023, principalmente debido a Peste Porcina Africana

Referencia: Philippine News Agency (PNA). (22 de junio de 2026). Negros Occidental LGUs boost biosecurity measures amid hog deaths.

Recuperado de: <https://www.pna.gov.ph/articles/1277816>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



España: Revisan avances y desafíos en el desarrollo de vacunas contra la Peste Porcina Africana.



El 22 de junio de 2026, a través de diversos medios de comunicación, se difundió un estudio relacionado con la revisión de avances y desafíos en el desarrollo de vacunas vivas atenuadas contra la Peste Porcina Africana (PPA). Estas vacunas representan actualmente la estrategia más prometedora para controlar la enfermedad, persisten importantes desafíos relacionados con su seguridad, eficacia y capacidad de protección frente a distintas variantes del virus.

Los estudios recientes muestran resultados alentadores en candidatos vacunales basados en virus atenuados mediante modificaciones genéticas. Algunos prototipos han demostrado proteger eficazmente a los cerdos frente a cepas virulentas e incluso generar protección cruzada contra determinados genotipos del virus. Además, nuevas investigaciones buscan aumentar la seguridad de estas vacunas mediante cambios en la vía de administración y la reducción de la persistencia viral en los animales vacunados.

Los especialistas mencionan que las vacunas vivas atenuadas presentan riesgos de bioseguridad inherentes a su naturaleza biológica, lo que exige una evaluación rigurosa antes de su uso masivo. La aparición de nuevas variantes y cepas recombinantes del virus puede limitar la eficacia de algunos candidatos vacunales actualmente en desarrollo.

Ante la ausencia de una vacuna comercial ampliamente disponible y eficaz a nivel mundial, el control de la enfermedad continúa dependiendo principalmente de estrictas medidas de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y control de movimientos animales.

Referencia: Diario Veterinario (22 de junio de 2026). Revisan los avances y desafíos en el desarrollo de vacunas vivas atenuadas contra la Peste Porcina Africana.

Recuperado de: <https://www.diarioveterinario.com/t/5927750/revisan-avances-desafios-desarrollo-vacunas-vivas-atenuadas-contra-pesto-porcina-africana>