



Gobierno de  
**México**

**Agricultura**

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




**SENASICA**

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



# Monitor Zoosanitario

23 de marzo de 2026



# Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE

## Contenido

<b>EUA: Confirma nuevos brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en patos de explotaciones comerciales ubicadas en Indiana.....</b>	<b>2</b>
<b>Costa Rica: Situación epidemiológica de la miasis por Gusano Barrenador del Ganado en humanos, con un total de 19 casos registrados en 2026. ....</b>	<b>3</b>
<b>Corea del Sur: Confirma nuevo brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en explotación de patos en la provincia de Jeonbuk.....</b>	<b>4</b>
<b>Colombia: Realiza simulacro subregional para el diagnóstico de Fiebre Aftosa en la Región Andina. ....</b>	<b>5</b>

# Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE



## **EUA: Confirma nuevos brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en patos de explotaciones comerciales ubicadas en Indiana.**



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 22 de marzo de 2026, la Junta Estatal de Salud Animal de Indiana (BOAH) confirmó dos nuevos brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en explotaciones comerciales de patos para carne en los condados de LaGrange y Elkhart, ambas en cuarentena y con áreas de control de 10 km y de vigilancia de 20 km activas para contener la propagación del virus.

Estos eventos epidemiológicos forman parte de un brote nacional en curso desde 2022, que ha afectado a más de 2,100 explotaciones en

los 50 estados de Estados Unidos y se considera la mayor emergencia de sanidad animal en el país, con presencia del virus en aves silvestres, aves domésticas y algunas especies de mamíferos.

Como respuesta, autoridades estatales y federales mantienen una vigilancia intensiva mediante pruebas en parvadas comerciales y no comerciales, monitoreo de aves silvestres y control sanitario en granjas lecheras, incluyendo requisitos de pruebas negativas para el movimiento de ganado, con el objetivo de detectar oportunamente nuevos casos y evitar la diseminación del virus.


Referencia: Junta Estatal de Salud Animal de Indiana (BOAH) (22 de marzo de 2026). HPAI Situation Update #113  
Recuperado de: <https://view.subscription.in.gov/?vawpToken=NHWKBNMVOKNE3OZXI6EQCIYNZA.130018>

# Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE

## Costa Rica: Situación epidemiológica de la miasis por Gusano Barrenador del Ganado en humanos, con un total de 19 casos registrados en 2026.

Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, según SE, de la SE 01 a la 10 del 2025 y del 2026



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025 y 2026

Gráfica comparativa de casos de miasis de GBG en humanos en 2025 y 2026

Créditos: Ministerio de Salud

El 20 de marzo de 2026, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Vigilancia de la Salud de Costa Rica, publicó su Boletín Epidemiológico N° 10 de 2026, que incluye información actualizada correspondiente a la semana epidemiológica (SE) N° 10 de 2026, sobre los casos de miasis por Gusano Barrenador del Ganado (GBG) (*Cochliomyia hominivorax*) en humanos, registrando un total acumulado de 19 casos en el país.

De acuerdo con el informe, la distribución de casos es la siguiente:

Provincias	Casos en humanos 2026
San José	2
Alajuela	3
Heredia	4
Guanacaste	1
Puntarenas	7
Limón	2

El informe señaló que la mayoría de los casos se concentra en personas adultas, principalmente en el grupo de 65 años y más, que registra 12 casos, seguido del grupo de 20 a 64 años, con 7 casos.

Asimismo, se indicó que durante las semanas epidemiológicas 01 a 10 de 2026 se confirmaron 19 casos de miasis por GBG en humanos, cifra menor a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando se notificaron 24 casos en el país.

Finalmente, las autoridades subrayaron la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional bajo el enfoque de Una Sola Salud, así como las medidas de prevención, vigilancia y atención oportuna tanto en humanos como en animales.

Referencia: Ministerio de Salud (13 de marzo de 2026). Boletín Epidemiológico N° 10 de 2026, Miasis por Gusano Barrenador en Humanos.

Recuperado de: <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca/material-educativo/material-publicado/boletines/boletines-vigilancia-vs-enfermedades-de-transmision-vectorial/boletines-epidemiologicos-2026/10175-boletin-epidemiologico-n-10-7/file>



### Corea del Sur: Confirma nuevo brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en explotación de patos en la provincia de Jeonbuk.



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 21 de marzo de 2026, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) informó que el Cuartel General Central de Gestión de Desastres de Corea del Sur confirmó un nuevo brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) subtipo H5N1 en una explotación de patos de engorde con aproximadamente 12,500 aves en el condado de Jangsu, provincia de Jeonbuk, elevando a 60 los casos registrados en granjas avícolas durante la temporada invernal 2025/2026.

Tras la detección, se implementaron medidas inmediatas de control, incluyendo el sacrificio sanitario, restricciones de movimiento durante 24 horas en la región afectada y zonas aledañas, así como inspecciones en 31 granjas dentro de un radio de 10 km y el despliegue de acciones intensivas de desinfección.

Adicionalmente, se reforzaron las estrategias de prevención mediante inspecciones ampliadas en más de 250 granjas de patos, control sanitario en explotaciones vulnerables, campañas de desinfección masiva y el fortalecimiento de los niveles de inspección para evitar la propagación del virus.

Las autoridades exhortaron a mantener estrictas medidas de bioseguridad en todo el país, destacando el riesgo continuo de nuevos brotes y la necesidad de vigilancia, control de accesos y desinfección para contener la enfermedad.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) (21 de marzo de 2026). 전북 장수 육용오리 농장 고병원성 조류인플루엔자 확진, 발생 시·군 집중관리를 통해 확산방지에 총력 대응  
Recuperado de: <https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/577384/artclView.do>

# Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE



## Colombia: Realiza simulacro subregional para el diagnóstico de Fiebre Aftosa en la Región Andina.



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 20 de marzo de 2026, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), informó que se llevó a cabo en Bogotá un simulacro subregional para el diagnóstico de Fiebre Aftosa (FA), con la participación de expertos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias en la Región Andina.

El ejercicio, organizado junto con la Comunidad Andina y el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (PANAFTOSA/OPS-OMS), evaluó procesos clave como la recepción de muestras, la aplicación de protocolos de bioseguridad y la comunicación de resultados, bajo estándares técnicos y de transparencia, permitiendo verificar la implementación armonizada de procedimientos entre los países participantes.

Asimismo, esta actividad contribuye al fortalecimiento institucional, la capacitación del personal y la mejora de los sistemas de diagnóstico, en línea con el estatus sanitario de Colombia reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) como país libre de fiebre aftosa, reforzando la preparación regional ante posibles brotes.

Referencia: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) (20 de marzo de 2026). En el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del ICA se realiza simulacro subregional de respuesta oportuna para el diagnóstico de la Fiebre Aftosa  
Recuperado de: <https://www.ica.gov.co/noticias/simulacro-subregional-diagnostico-fiebre-aftosa>



Gobierno de  
**México**

**Agricultura**

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



**SENASICA**

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



# Monitor Peste Porcina Africana

23 de marzo de 2026



# Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

## Contenido

<b>Internacional: OMSA publica reporte sobre la situación mundial de la Peste Porcina Africana.....</b>	<b>2</b>
<b>Letonia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en jabalís.....</b>	<b>3</b>

# Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



## Internacional: OMSA publica reporte sobre la situación mundial de la Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 20 de marzo de 2026, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) publicó el Reporte N° 74 sobre la situación mundial de la Peste Porcina Africana (PPA), correspondiente a febrero de 2026.

En dicho informe se reportaron actualizaciones de brotes en curso en Asia y Europa, con 44 nuevos brotes en cerdos domésticos y 1,279 en jabalís, que ocasionaron pérdidas de 42,659 porcinos domésticos.

Desde enero de 2022, la enfermedad ha sido notificada en 72 países, acumulando más de 1.18 millones de casos en cerdos domésticos y 47,510 en jabalís, con pérdidas superiores a 2.49 millones de animales.

Aunque se observa una disminución reciente de brotes en cerdos domésticos, se ha registrado un aumento en fauna silvestre, alcanzando en enero de 2026 el mayor número de brotes en jabalís desde 2022; además, durante febrero se identificaron 50 focos a más de 10 km de zonas previamente afectadas, incluyendo un “salto” de 106 km en Nepal.

El reporte señaló que no se ha notificado el uso oficial de vacunación contra la PPA y enfatiza la importancia de fortalecer la bioseguridad, la vigilancia epidemiológica y la notificación oportuna para contener la propagación global de la enfermedad.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (20 de marzo de 2026). African swine fever (ASF), Situation Report 74

Recuperado de: <https://www.woah.org/en/document/african-swine-fever-asf-situation-report-74/>

# Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

## Letonia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en jabalís.



Imagen representativa de la especie involucrada.  
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 23 de marzo de 2026, el Servicio Alimentario y Veterinario (PVD) de Letonia publicó la actualización del reporte de casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalís.

Durante el periodo comprendido del 16 al 22 de marzo de 2026, se confirmaron 22 jabalís positivos al virus, en distintas localidades del país.

Los casos reportados durante esta semana se distribuyen de la siguiente

manera:

- En el municipio de Augšdaugavas (localidad de Skrudalienas), se registró 1 caso de la enfermedad.
- En el municipio de Dienvidkurzemes, se reportó 1 caso positivo en la localidad de Embūtes.
- En el distrito de Dobeles se confirmó 1 caso de la enfermedad en la localidad de Īles.
- En la ciudad de Mārupes se registró 1 caso de la PPA, en la localidad de Mārupes.
- En la ciudad de Talsu se registraron 12 casos de la enfermedad distribuidos en las localidades de Abavas (3), Balgales (1), Dundagas (4), Ķūļciema (2), Mērsraga (1) y Strazdes (1).
- En cuatro localidades de la ciudad de Tukuma, se confirmó un total de 6 casos de PPA distribuidos en las localidades de Pūres (1), Sēmes (1) y Smārdes (4).

En 2026, Letonia ha reportado un total de 270 jabalís infectados por PPA, distribuidos en 70 localidades de 18 condados.

Referencia: Servicio Alimentario y Veterinario de Letonia (PVD) (23 de marzo de 2026). Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma hronoloģija meža cūkām Latvijā 2026. Gadā

Recuperado de: <https://www.pvd.gov.lv/lv/afrikas-cuku-mera-uzliesmojumi-latvija>