



Gobierno de  
**México**

**Agricultura**

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



**SENASICA**

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



# Monitor Fitosanitario

26 de mayo de 2026



# Monitor Fitosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE

## Monitor Fitosanitario

### Contenido

|   |   |
|---|---|
| Chile: Refuerzan medidas fitosanitarias por campañas activas de <i>Ceratitis capitata</i> en Coquimbo.....                  | 2 |
| Rusia: Detección e intercepción de <i>Ceratitis capitata</i> y <i>Tuta absoluta</i> en naranjas y jitomates importados..... | 3 |
| Australia: Situación actual de la mosca de la fruta de Queensland ( <i>Bactrocera tryoni</i> ) en Riverland y Adelaide..... | 4 |
| Argentina: Situación actual de las poblaciones de la chicharrita del maíz ( <i>Dalbulus maidis</i> ).....                   | 5 |



### Chile: Refuerzan medidas fitosanitarias por campañas activas de *Ceratitis capitata* en Coquimbo.



El 26 de mayo de 2026, a través del portal *Madero*, se informó que autoridades regionales de Coquimbo y representantes del sector privado reforzaron medidas fitosanitarias para enfrentar la presencia de la mosca del Mediterráneo (*Ceratitis capitata*), ante la existencia de ocho campañas activas en la región.

Se señala que la Región de Coquimbo mantiene campañas activas por mosca de la fruta en Monte Patria, La Serena y Coquimbo, lo que ha obligado a reforzar los protocolos sanitarios y adaptar el Sitio de Inspección del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG), del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS-USDA) y de Frutas de Chile. Estas adecuaciones permiten procesar de forma diferenciada y simultánea fruta proveniente de zonas libres y de áreas reglamentadas, con el fin de evitar retrasos logísticos y mantener la competitividad de los envíos agrícolas, principalmente hacia Estados Unidos.

Asimismo, se indicó que la plaga representa un riesgo para la producción regional de cítricos y uva de mesa, debido a las restricciones sanitarias, posibles tratamientos cuarentenarios y efectos económicos para productores y exportadores. Ante ello, el SAG reforzó la fiscalización con tres agrónomos adicionales y Frutas de Chile financió modificaciones estructurales para separar los flujos de fruta, con el objetivo de mantener operativo el esquema *Systems Approach*, evitar el uso de bromuro de metilo, prevenir la dispersión de la plaga y conservar la confianza de los mercados internacionales.

En el contexto nacional, *C. capitata* figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentra bajo Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en todo el país.

#### Referencias:

Madero (26 de mayo de 2026). Activan plan contrarreloj para frenar invasión de la mosca de la fruta en Coquimbo con ocho campañas activas en la región. Recuperado de: <https://madero.cl/activan-plan-contrarreloj-para-frenar-invasion-de-la-mosca-de-la-fruta-en-coquimbo-con-ocho-campanas-activas-en-la-region/>

# Monitor Fitosanitario

## DIRECCIÓN EN JEFE



### Rusia: Detección e intercepción de *Ceratitis capitata* y *Tuta absoluta* en naranjas y jitomates importados.



El 26 de mayo de 2026, a través del portal oficial del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia, se informó que especialistas de la Institución Presupuestaria Estatal Federal “VNIKR” detectaron la presencia de la mosca del Mediterráneo (*Ceratitis capitata*) y de la palomilla del tomate (*Tuta absoluta*) en naranjas y jitomates importados, respectivamente.

En la sucursal de Novorossiysk, el 25 de mayo de 2026, mediante análisis de laboratorio realizados a muestras de productos importados sujetos a cuarentena, se identificaron cinco casos de plagas cuarentenarias para la Unión Económica Euroasiática. Entre ellos, se detectaron dos casos de la palomilla del tomate (*Tuta absoluta*) en muestras de jitomate y tres casos de la mosca del Mediterráneo (*Ceratitis capitata*) en muestras de naranja.

La información sobre estas detecciones fue remitida a la Oficina Interregional del Sur de Rosselkhoznadzor para la aplicación de las medidas fitosanitarias correspondientes, con el fin de prevenir la introducción y dispersión de productos contaminados y plagas cuarentenarias en Rusia.

En el contexto nacional, *C. capitata* y *T. absoluta* están incluidas en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y se encuentran sujetas a vigilancia epidemiológica fitosanitaria en todo el territorio nacional.

#### Referencia:

Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (26 de mayo de 2026). La sucursal de Novorossiysk de la Institución Presupuestaria Estatal Federal “VNIKR”, subordinada a Rosselkhoznadzor, ha identificado cinco casos de contaminación de tomates y naranjas importados con organismos cuarentenarios. Recuperado de: <https://fsvps.gov.ru/news/novorossijskim-filialom-podvedomstvennogo-rosselkhoznadzoru-fgbu-vniikr-vyyavleno-5-sluchaev-zarazheniya-karantinnyimi-obektami-importnyh-tomatov-i-apelsinov/>

# Monitor Fitosanitario

## DIRECCIÓN EN JEFE



### Australia: Situación actual de la mosca de la fruta de Queensland (*Bactrocera tryoni*) en Riverland y Adelaide.



*B. tryoni*. Fuente: Niland, 2011.

El 22 de mayo de 2026, a través del portal *Vinehealth Australia* y con base en información del Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia del Sur (PIRSA), se dio a conocer la situación actual de la mosca de la fruta de Queensland (*Bactrocera tryoni*) en las regiones de Riverland y Adelaide, Australia Meridional.

Se señala que:

1. En la región de Riverland, PIRSA mantiene acciones de manejo fitosanitario para el control de 58 brotes de *B. tryoni*, declarados entre el 22 de diciembre de 2020 y el 23 de enero de 2026, en localidades como Renmark West, Pike River, Loxton, Paringa, Waikerie, Murtho, Renmark, Barmera, Monash, Glossop, Cooltong, Cadell, Taylorville, Lindsay Point, Murtho G, Murtho H y Holder, entre otras. La fecha más temprana prevista para la erradicación de todos los brotes es el 22 de diciembre de 2026.
2. En la región de Adelaide, se precisa que la información de los brotes correspondientes a Glynde, declarado el 22 de enero de 2025, y Elizabeth East, declarado el 16 de enero de 2026. El brote de Glynde se erradicó el 31 de marzo de 2026, por lo que ya no está sujeto a restricciones de movimiento. En el caso de Elizabeth East, la fecha más temprana posible de erradicación se estima para el 12 de diciembre de 2026.

Para ambos casos, se delimitaron la Zona Infestada (radio de 1.5 km) y la Zona de Amortiguamiento (radio de 15 km). En dichas zonas se aplican restricciones al movimiento de uvas para vino, incluyendo racimos, bayas y muestras de madurez de la uva, por estar clasificadas como productos hospedantes de la plaga.

En el contexto nacional, *B. tryoni* figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

Referencia:

Portal Vinehealth Australia (22 de mayo de 2026). Riverland Fruit Fly Outbreaks y Metro Adelaide Fruit Fly Outbreaks. Recuperado de:

<https://vinehealth.com.au/2026/05/riverland-q-fly-outbreaks/>

<https://vinehealth.com.au/2026/05/metro-adelaide-fruit-fly-outbreaks/>



### Argentina: Situación actual de las poblaciones de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).



*D. maidis*. Créditos: SENASA.

El 22 de mayo de 2026, fue emitido el Informe No. 42 de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), en el que se dio a conocer la situación actual de dicho insecto (vector de los fitopatógenos asociados con el achaparramiento del maíz), en Argentina.

El informe señala que, aunque la mayor parte de la cosecha de maíz ya está fuera de riesgo, del 2 al 16 de mayo de 2026 se observaron comportamientos heterogéneos de la plaga y disminuciones poblacionales asociadas al descenso de temperaturas. Los agentes causales del achaparramiento del maíz incluyen: *Spiroplasma kunkelii*, *Maize bushy stunt phytoplasma* (sin. *Aster yellows phytoplasma*), *Maize rayado fino virus* y *Maize striate mosaic virus*. A nivel regional, se observaron incrementos poblacionales con la siguiente dinámica:

- En la región Noroeste (NOA): la población de *D. maidis* se mantuvo estable, aunque con alta presencia del vector, ya que el 94% de las localidades registró más de 100 adultos por trampa. Además, en algunos híbridos se observaron daños en espiga asociados a enfermedades transmitidas por la chicharrita.
- En la región Noreste (NEA): se observó una disminución poblacional de *D. maidis*, aunque la presión del vector sigue siendo alta, ya que el 61% de las localidades registró más de 100 adultos por trampa. Además, se evalúan alteraciones en espiga en algunos híbridos.
- En la región del Litoral: el 97% de las trampas registró presencia de *D. maidis*, aunque solo el 22% superó los 100 adultos por trampa. También se observaron síntomas foliares de achaparramiento, con menor incidencia que en las zonas endémicas.
- En la región Centro Norte: el 74% de las localidades registró más de 100 adultos por trampa, evidenciando un incremento respecto del informe anterior; sin embargo, la incidencia del achaparramiento continúa siendo baja y localizada.
- En la región Centro Sur: se registraron incrementos puntuales de *D. maidis*, aunque predominaron las localidades sin detecciones. Además, no se reportaron síntomas foliares asociados al complejo de patógenos responsables del achaparramiento del maíz.

En el contexto nacional, el grupo *Aster yellows phytoplasma* figura en la Lista de Plagas Reglamentadas de México, notificada ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

Referencia: Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis* (22 de mayo de 2026). Informe N.º 42 sobre Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis*. Recuperado de: <https://www.maizar.org.ar/vertext.php?id=992>