



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

19 de mayo de 2026



Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

EUA: Texas confirma primer caso de Virus del Oeste del Nilo en 2026.....	2
Perú: Reporta primer caso de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad subtipo H9N2 en ñandúes andinos menores.	3
Corea del Sur: Descarta casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en mamíferos domésticos durante 2025.	4
Grecia: Fortalece medidas contra Fiebre Aftosa en la isla de Lesbos.	5

Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE



EUA: Texas confirma primer caso de Virus del Oeste del Nilo en 2026.



Imagen representativa del vector involucrado
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 19 de mayo de 2026, el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas confirmó el primer caso de enfermedad neuroinvasiva por Virus del Oeste del Nilo (VON) en 2026, detectado en un residente del condado de Harris, e instó a la población a reforzar las medidas de prevención contra mosquitos ante el riesgo de enfermedades como Dengue, Chikungunya y Zika.

Las autoridades señalaron que, aunque la mayoría de las infecciones por VON son asintomáticas, una pequeña proporción puede desarrollar cuadros neurológicos graves e incluso mortales.

En los últimos cinco años, Texas ha registrado 976 casos y 106 muertes asociadas al VON, por lo que las autoridades recomendaron eliminar agua estancada, usar repelentes y mantener protegidas las viviendas para reducir la proliferación de mosquitos. Asimismo, enfatizaron la importancia de utilizar ropa protectora y repelentes con DEET o picaridina durante las horas de mayor actividad de estos insectos.

El comunicado también alertó sobre el incremento mundial de casos de Dengue y Chikungunya, enfermedades que han presentado algunos casos de transmisión local en el sur de Texas, aunque la mayoría continúa vinculada a viajes internacionales.

Finalmente, las autoridades sanitarias recomendaron mantener medidas preventivas antes, durante y después de viajar a regiones tropicales y subtropicales, con el fin de evitar la introducción y propagación local de estos virus.

Referencia: Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (19 de mayo de 2026). News Release Hero Banner El Departamento Estatal de Servicios de Salud confirma el primer caso del virus del Nilo Occidental en Texas del 2026 Recuperado de: <https://www.dshs.texas.gov/es/news-alerts/el-departamento-estatal-de-servicios-de-salud-confirma-el-primer-caso-del-virus-del>



Perú: Reporta primer caso de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad subtipo H9N2 en ñandúes andinos menores.



Imagen representativa de la especie involucrada
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 13 de mayo de 2026, científicos publicaron en el portal bioRxiv un estudio realizado en Perú en 2025 que confirmó un brote de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (IABP) del subtipo H9N2 en ñandúes andinos menores (*Rhea pennata*), asociado con elevada mortalidad y signos clínicos severos, lo que representa el primer caso documentado de este subtipo en esta especie en Sudamérica.

De los 92 animales evaluados en un centro de conservación de Puno, 46 presentaron síntomas y 45 murieron, mientras que los análisis genómicos revelaron mutaciones relacionadas con una mayor adaptación viral y virulencia.

El análisis filogenético indicó que el virus pertenece a un linaje H9N2 de origen norteamericano y constituye una introducción independiente a Sudamérica, posiblemente circulando de manera no detectada en la región durante un periodo prolongado. Los investigadores señalaron que aves silvestres migratorias y residentes probablemente participaron en la introducción y diseminación del virus en zonas altoandinas del Perú.

Asimismo, el estudio advirtió sobre el riesgo de que este subtipo viral genere recombinaciones con otras cepas circulantes, favoreciendo la adaptación a mamíferos y aumentando el potencial zoonótico. Ante ello, los autores recomendaron fortalecer la vigilancia epidemiológica de influenza aviar tanto en aves domésticas como silvestres para detectar oportunamente nuevas variantes y evaluar riesgos sanitarios y económicos para la industria avícola regional.

Referencia: Leguía, M., García-Glaessner, A., Muñoz-Saavedra, B., Juárez, D., Barrera, P., Calvo-Mac, C., et al. (2026). First reported outbreak of low pathogenic avian influenza H9N2 in lesser rheas (*Rhea pennata*) in Peru. bioRxiv. <https://doi.org/10.64898/2026.05.08.723762>

Recuperado de: <https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.05.08.723762v1#page>



Corea del Sur: Descarta casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en mamíferos domésticos durante 2025.



Imagen representativa de las especies involucradas.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 18 de mayo de 2026, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) informó que la Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal de Corea del Sur no detectó casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en animales de compañía ni en ganado mamífero durante 2025, tras realizar pruebas de vigilancia sanitaria en perros, gatos, vacas, cerdos y cabras.

El monitoreo incluyó más de 7,500 animales y cerca de 3,800 muestras de leche cruda, todas con resultados negativos, lo que confirmó la ausencia de circulación del virus en mamíferos domésticos del país.

Las autoridades señalaron que el programa de vigilancia se ha fortalecido debido al incremento mundial de infecciones por influenza aviar en mamíferos desde 2020, especialmente tras los brotes registrados en vacas lecheras y casos humanos en Estados Unidos desde 2024. Además, mencionaron que en 2026 se detectaron anticuerpos contra IAAP en vacas lecheras de los Países Bajos, lo que mantiene la preocupación internacional por el potencial zoonótico del virus.

Aunque no se identificaron infecciones en animales domésticos, la agencia recordó que en 2025 se confirmó la presencia del virus en un gato leopardo silvestre, por lo que continuará reforzando el monitoreo epidemiológico y el análisis de variantes virales en mamíferos. Las autoridades subrayaron que las mutaciones del virus en estas especies podrían incrementar el riesgo de transmisión a las personas, por lo que consideran esencial mantener una vigilancia estricta para proteger la salud pública y la sanidad animal.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) (18 de mayo de 2026). 년 국내 반려동물과 포유류 가축에서 고병원성 조류인플루엔자 발생 없어
Recuperado de: <https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/577932/artclView.do>



Grecia: Fortalece medidas contra Fiebre Aftosa en la isla de Lesbos.



Imagen representativa de las especies involucradas
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 15 de mayo de 2026, el Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación de Grecia informó que intensificaron las acciones de control y bioseguridad frente a la Fiebre Aftosa (FA) en la isla de Lesbos, mediante una operación coordinada en coordinación con ELGO-DIMITRA, con el objetivo de contener la epizootia y proteger la producción ganadera local.

Durante una reunión interinstitucional participaron autoridades regionales, fuerzas de seguridad, veterinarios civiles y militares, así como representantes sanitarios y técnicos, quienes evaluaron la situación epidemiológica y las medidas implementadas hasta el momento.

Las autoridades informaron que la vigilancia sanitaria se ha reforzado significativamente con la incorporación de equipos adicionales de veterinarios y personal de apoyo, alcanzando más de 30 veterinarios y 60 personas involucradas en las labores operativas. Asimismo, continúan las actividades de rastreo epidemiológico en distintas zonas ganaderas para aplicar protocolos de bioseguridad y mejorar el control sanitario en áreas de riesgo.

ELGO-DIMITRA también presentó el sistema digital iGeovet para registrar información epidemiológica y facilitar el monitoreo de la enfermedad, además de anunciar programas de capacitación en bioseguridad dirigidos a productores.

Finalmente, las autoridades destacaron la importancia de mantener informados a ganaderos, comunidades locales y visitantes sobre las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación de la fiebre aftosa y garantizar la continuidad de la actividad pecuaria en la isla.

Referencia: Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación de Grecia (15 de mayo de 2026). Στη Λέσβο ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Σπ. Μάμαλης και κλιμάκιο του Οργανισμού για συντονισμό της επιχείρησης αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού

Recuperado de: <https://www.minagric.gr/2013-04-05-10-13-09/ministry-example/ypaat-grafeio-typou/deltiatypou/19377-dt150526b>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

19 de mayo de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Polonia: Confirma el primer brote de Peste Porcina Africana en cerdos domésticos en 2026.....	2
Internacional: OMSA establece criterios para monitoreo y eficacia de vacunas contra Peste Porcina Africana.	3
Corea del Sur: Fortalece medidas contra la Peste Porcina Africana tras 24 brotes en 2026.	4
Filipinas: Impulsa recuperación porcina con granja biosegura tras brotes de Peste Porcina Africana.	5

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Polonia: Confirma el primer brote de Peste Porcina Africana en cerdos domésticos en 2026.



Imagen representativa de las especies involucrados.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 19 de mayo de 2026, la Oficina del Jefe de Inspección Veterinaria de Polonia confirmó el primer brote de Peste Porcina Africana (PPA) en cerdos domésticos registrado en el país durante 2026.

El foco fue detectado en una granja con 21,390 animales ubicada en Jarosławsko, en la provincia de Pomerania Occidental, según informó el Jefe Veterinario del país tras recibir los resultados positivos del laboratorio nacional de referencia el 18 de mayo.

Asimismo, se indicó que el brote se localiza dentro de una zona previamente restringida por la Unión Europea debido al riesgo sanitario asociado a la enfermedad.

Ante la detección del caso, la Inspección Veterinaria activó las medidas de control y erradicación establecidas en la normativa sanitaria europea, incluyendo el sacrificio y eliminación de los cerdos afectados, labores de limpieza y desinfección, así como una investigación epidemiológica para determinar el origen y posible propagación del virus.

Las autoridades también establecieron zonas restringidas de protección y vigilancia en un radio de 10 kilómetros alrededor de la granja afectada, con el objetivo de contener la propagación de la enfermedad y reforzar la vigilancia sanitaria en la región. El caso representa el primer foco confirmado de PPA en cerdos domésticos en Polonia este año.

Referencia: Oficina del Jefe de Inspección Veterinaria de Polonia (19 de mayo de 2026). Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 1 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2026 r.

Recuperado de: <https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-dotyczacy-1-ogniska-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-u-swin-w-2026-r-/idn:3171>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Internacional: OMSA establece criterios para monitoreo y eficacia de vacunas contra Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 15 de mayo de 2026, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) publicó nuevas directrices para la evaluación en campo y el monitoreo posterior a la vacunación contra la Peste Porcina Africana (PPA), con el objetivo de establecer criterios internacionales para medir la eficacia, seguridad y desempeño de las vacunas en condiciones reales de producción porcina.

El documento destaca que la vacunación debe integrarse como parte de programas integrales de prevención y control, junto con medidas de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y restricciones de movimiento.

Las directrices señalan que la evaluación de vacunas debe considerar definiciones claras de casos, análisis epidemiológicos, estudios controlados aleatorizados y monitoreo constante de signos clínicos, mortalidad, transmisión viral y respuesta inmunitaria. Además, recomiendan el uso de pruebas diagnósticas avanzadas, análisis genómicos y protocolos de muestreo periódicos para diferenciar infecciones naturales de respuestas asociadas a la vacunación.

El documento también advierte sobre riesgos potenciales relacionados con la vacunación, como la posible diseminación temporal del virus vacunal, efectos adversos o diferencias en la eficacia frente a distintas variantes del virus. Por ello, la OMSA recomienda realizar evaluaciones de riesgo-beneficio antes de implementar programas nacionales o regionales de vacunación, así como mantener sistemas de vigilancia posvacunación para medir la efectividad de las vacunas en condiciones reales.

Asimismo, la organización enfatiza la importancia de la transparencia, la cooperación entre gobiernos, laboratorios y productores, y el intercambio de datos científicos para fortalecer la toma de decisiones y mejorar las estrategias globales de control de la PPA.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (15 de mayo de 2026). Guidelines for African swine fever (ASF) vaccines: field evaluation and post-vaccination monitoring
Recuperado de: <https://www.woah.org/en/document/guidelines-for-african-swine-fever-vaccines-2026/>

Feedstuffs (19 de mayo de 2026). Global guidelines for African swine fever vaccine published
Recuperado de: <https://www.feedstuffs.com/swine/global-guidelines-for-african-swine-fever-vaccine-published>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Corea del Sur: Fortalece medidas contra la Peste Porcina Africana tras 24 brotes en 2026.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 19 de mayo de 2026, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) informó que, entre enero y marzo, Corea del Sur registró 24 brotes de Peste Porcina Africana (PPA) en siete provincias, la cifra anual más alta desde 2019, lo que llevó al gobierno a reforzar las medidas de control y mantener el nivel de alerta máxima en 32 municipios de alto riesgo.

Las investigaciones epidemiológicas identificaron como principales fuentes de introducción y diseminación del virus el uso de ingredientes contaminados en piensos derivados de sangre porcina, la importación ilegal de productos ganaderos y la transmisión desde jabalíes silvestres hacia granjas porcinas.

El análisis genético reveló que 21 de los 24 casos correspondieron a una variante extranjera del virus (IGR-I) con alta similitud genética a un brote detectado en 2025 en Chungnam, mientras que tres casos estuvieron asociados al genotipo doméstico vinculado con jabalíes. Asimismo, se detectó material genético del virus en proteínas plasmáticas porcinas utilizadas para elaborar alimento animal, lo que fortaleció la hipótesis de contagio a través de piensos contaminados.

Ante esta situación, las autoridades implementaron inspecciones masivas en granjas y mataderos, reforzaron los controles fronterizos en aeropuertos mediante rayos X y perros detectores, además de establecer sistemas de monitoreo para sangre de cerdo y medidas intensivas de control de jabalíes silvestres. El gobierno anunció que próximamente presentará un plan integral para fortalecer la bioseguridad y el control sanitario en toda la cadena de producción porcina, mientras exhortó a los productores a reforzar la vigilancia, restringir el ingreso de personas y vehículos, y reportar de inmediato cualquier signo sospechoso de la enfermedad.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) (19 de mayo de 2026). 아프리카돼지열병 발생원인이 다양해져, 발생원인별 선제적 방역 관리 강화

Recuperado de: <https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/577952/artclView.do>

Yonhap News Agency (19 de mayo de 2026). S. Korea reports 24 African swine fever cases this year: data

Recuperado de: <https://en.yna.co.kr/view/AEN20260519010400320?input=tw>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Filipinas: Impulsa recuperación porcina con granja biosegura tras brotes de Peste Porcina Africana.



El 19 de mayo de 2026, la Agencia de Noticias de Filipinas (PNA) informó que el Departamento de Agricultura entregó una granja porcina con medidas de bioseguridad, valorada en 5 millones de pesos filipinos, a la Cooperativa Agrícola La Gracia en Tubay, Agusan del Norte, como parte de las acciones para apoyar la recuperación del sector afectado por la Peste Porcina Africana (PPA).

El proyecto beneficiará a 150 miembros de la cooperativa y busca fortalecer la producción porcina y estabilizar el suministro y precio de la carne de cerdo en la provincia.

La cooperativa había sufrido pérdidas cercanas a 300 mil pesos filipinos hace tres años, cuando un brote de PPA obligó al sacrificio de seis cerdas reproductoras y más de 20 lechones. Ante ello, las autoridades implementaron apoyo técnico y de infraestructura para reactivar la actividad productiva bajo condiciones sanitarias más seguras.

La instalación entregada incluye una nave moderna para cerdos, 100 jaulas de engorda y diversos equipos, como comederos y sistemas de agua, incorporando tecnología orientada a reforzar la bioseguridad y prevenir nuevos brotes de PPA y otras enfermedades. La iniciativa fue financiada mediante el programa INSPIRE del Departamento de Agricultura, enfocado en la recuperación y expansión de la producción porcina nacional.

Referencia: Agencia de Noticias de Filipinas (PNA) (19 de mayo de 2026). DA gives P5-M bio-secure piggery to ASF-hit coop in Agusan
Recuperado de: <https://www.pna.gov.ph/articles/1275314>