



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

2 de octubre de 2026



Contenido

EUA: Confirman Enfermedad Hemorrágica Epizootica en ganado bovino de Wisconsin.....	2
Internacional: EFSA publica actualización epidemiológica sobre la Influenza Aviar de alta patogenicidad.....	3
España: Confirman tres focos de Enfermedad de Newcastle en aves de corral de Valencia.	4
Polonia: Confirman brote de Enfermedad de Newcastle en explotación avícola de Małopolska.	5
Australia: Confirma dos nuevos eventos de Influenza Aviar H5 en fauna silvestre.....	6



EUA: Confirman Enfermedad Hemorrágica Epizootica en ganado bovino de Wisconsin.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 29 de septiembre de 2026, el Departamento de Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor de Wisconsin (DATCP) confirmó la detección del virus de la Enfermedad Hemorrágica Epizootica (EHD) en muestras de ganado lechero no lactante del condado de Waukesha, Estados Unidos. Asimismo, informó la presencia del virus en tejido de ciervos silvestres y en cautiverio de la región, por lo que los casos de EHD deben ser notificados al DATCP dentro de un plazo de 10 días.

Como parte de las medidas de vigilancia, las autoridades recomendaron que los propietarios de ganado y ciervos de granja que observen signos compatibles con la enfermedad trabajen con su médico veterinario para obtener un diagnóstico definitivo. Entre los principales signos clínicos en bovinos se encuentran cojera, lesiones en las extremidades, boca, ubres o pezuñas, salivación excesiva, fiebre y pérdida de peso, los cuales pueden confundirse con otras enfermedades animales.

Asimismo, señalaron que la EHD es una enfermedad viral transmitida por jejenes y que su presentación suele incrementarse durante finales del verano y principios del otoño, debido a la mayor actividad de estos insectos. Ante la sospecha de la enfermedad, se pueden enviar muestras de sangre, bazo, pulmón o ganglios linfáticos para su análisis de laboratorio y diferenciación de otras enfermedades con signos similares.

Finalmente, el DATCP indicó que no existe un tratamiento específico contra la EHD y recomendó fortalecer las medidas de prevención mediante el control de insectos, el mantenimiento de una adecuada nutrición y la prevención del hacinamiento en los rebaños. Asimismo, señaló que la enfermedad no representa un riesgo para la salud humana y que no existe evidencia de transmisión a las personas mediante picaduras de insectos, contacto directo, consumo de carne o leche de animales infectados.

Referencia: Departamento de Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor de Wisconsin (DATCP). (29 de septiembre de 2026). Epizootic Hemorrhagic Disease (EHD) Confirmed in Wisconsin Cattle.

Recuperado de: <https://datcp.wi.gov/Pages/EpizooticHemorrhagicDiseaseConfirmedinWisconsinCattle.aspx>

Referencia: AGDAILY. (30 de septiembre de 2026). Disease affecting thousands of Wisconsin deer spreads to dairy cattle.

Recuperado de: <https://www.agdaily.com/livestock/disease-affecting-thousands-wisconsin-deer-spreads-dairy-cattle/>



Internacional: EFSA publica actualización epidemiológica sobre la Influenza Aviar de alta patogenicidad.



Imagen representativa de una de las especies involucradas
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 30 de septiembre de 2026, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y el Laboratorio de Referencia de la Unión Europea para Influenza Aviar (EURL) publicaron un informe sobre la situación epidemiológica de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) correspondiente al periodo de junio a agosto de 2026. Entre el 5 de junio y el 28 de agosto, se notificaron 110

detecciones del virus A(H5N1) en 12 países europeos, de las cuales siete correspondieron a aves domésticas y 103 a aves silvestres.

Durante el periodo evaluado, la actividad del virus se mantuvo en niveles estacionalmente bajos y continuó la tendencia descendente observada desde la primavera. En comparación con años anteriores, se registró una menor afectación de aves marinas reproductoras en colonias y una distribución geográfica más limitada de las detecciones. Asimismo, se identificaron casos esporádicos de virus A(H5) en mamíferos silvestres, incluidos carnívoros terrestres y pinnípedos.

En el ámbito internacional, las instituciones señalaron que la circulación de Influenza Aviar continuó activa en América, donde también se detectó el subtipo A(H7N3) en México. En Estados Unidos aumentó el número de explotaciones de ganado lechero afectadas por A(H5N1) y se confirmó, por primera vez en Norteamérica, la detección del virus en visones americanos cautivos. Asimismo, tras su introducción en Australia continental, el A(H5N1) se propagó entre aves silvestres y se registraron eventos de transmisión hacia carnívoros terrestres y mamíferos marinos.

Finalmente, entre el 5 de junio y el 31 de agosto de 2026 se notificaron 15 infecciones humanas por virus de Influenza Aviar, sin defunciones: un caso de A(H5N1) en Bangladesh, uno en Camboya y 13 de A(H9N2) en China. Todos los casos estuvieron relacionados con exposición a aves de corral o ambientes asociados; no obstante, las instituciones señalaron que no existe evidencia de transmisión sostenida entre personas.

Referencia: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). (30 de septiembre de 2026). Avian influenza overview June–August 2026

Recuperado de: <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2026.10369>



España: Confirman tres focos de Enfermedad de Newcastle en aves de corral de Valencia.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 1 de octubre de 2026, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Comunitat Valenciana informó la confirmación de tres focos de Enfermedad de Newcastle en explotaciones avícolas de los municipios de Fuenferrerobles, Utiel y Sinarcas, en la provincia de Valencia, España. La confirmación fue realizada por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

Ante las detecciones, las autoridades establecieron medidas sanitarias de contención, vigilancia, control y seguimiento en las explotaciones ubicadas dentro de radios de 3 y 10 kilómetros alrededor de los focos. Asimismo, se mantiene un seguimiento veterinario continuo con el objetivo de controlar la enfermedad y prevenir su propagación.

La autoridad competente señaló que la prioridad es mantener los focos bajo control, proteger al sector avícola y garantizar la seguridad del consumidor, indicando que la enfermedad afecta principalmente a las aves y no representa un riesgo para el consumo de carne ni de huevos. Las medidas permanecerán vigentes hasta alcanzar la normalización de la situación sanitaria.

Referencia: Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. (1 de octubre de 2026). Confirmada la existencia de tres focos de enfermedad de Newcastle.

Recuperado de: <https://portalagrari.gva.es/es/-/confirmada-la-existencia-de-tres-focos-de-enfermedad-de-newcastle?redirect=%2Fes%2Finicio>



Polonia: Confirman brote de Enfermedad de Newcastle en explotación avícola de Małopolska.



Imagen representativa de las especies involucrados.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 2 de octubre de 2026, la Oficina del Jefe de Inspección Veterinaria de Polonia informó que el 30 de septiembre se confirmó un brote de Enfermedad de Newcastle (EN) en una explotación avícola ubicada en el condado de Tatra, en la región de Małopolska, Polonia.

De acuerdo con las autoridades veterinarias, la explotación realizaba ventas directas y mantenía diferentes especies de aves, entre ellas gallinas ponedoras, patos, pavos, gallinas de Guinea y gansos, por lo que el evento involucra una unidad de producción con múltiples especies avícolas.

Las autoridades mantienen las acciones de vigilancia y control correspondientes para contener la propagación de la enfermedad y dar seguimiento a la situación sanitaria en la zona afectada.

La Enfermedad de Newcastle es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a aves domésticas y silvestres, por lo que se mantiene la importancia de fortalecer las medidas de bioseguridad y la vigilancia epidemiológica en las explotaciones avícolas.

Referencia: Oficina del Jefe de Inspección Veterinaria de Polonia (2 de octubre de 2026). Komunikat dotyczący stwierdzenia ogniska rzekomego pomoru drobiu (ND) w woj. małopolskim.

Recuperado de: <https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-dotyczacy-stwierdzenia-ogniska-rzekomego-pomoru-drobiu-ND-w-woj.-malopolskim/idn:3247>



Australia: Confirma dos nuevos eventos de Influenza Aviar H5 en fauna silvestre.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 2 de octubre de 2026, el Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia Meridional (PIRSA) confirmó dos nuevos eventos de Influenza Aviar H5 en fauna silvestre, elevando a 325 el total de eventos confirmados en el estado durante 2026.

Las nuevas detecciones correspondieron a una gaviota plateada (*Chroicocephalus novaehollandiae*), localizada en la Bahía de Nepean, y a un cormorán de cara negra (*Phalacrocorax fuscescens*), encontrado en Penneshaw, ambos sitios ubicados en la Isla Canguro. De acuerdo con

los protocolos nacionales, las autoridades reportan las detecciones como eventos y no como animales individuales, por lo que cada evento puede involucrar a uno o más animales.

Hasta el momento, no se han detectado casos de Influenza Aviar H5 en aves de corral ni en otros animales de producción, mientras que el riesgo para la salud humana continúa considerándose bajo. Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y la coordinación con los sectores productivos, de fauna silvestre y la comunidad para fortalecer las acciones de preparación y respuesta.

Asimismo, se exhorta a la población a evitar el contacto con aves enfermas o muertas y otros animales silvestres, así como reportar oportunamente estos hallazgos a las autoridades. Desde el 1 de enero de 2026, se han realizado 2,408 pruebas para Influenza Aviar H5 y se han recibido 13,294 reportes a través de la línea de atención para enfermedades animales.

Referencia: Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia Meridional (PIRSA). (2 de octubre de 2026). H5 bird flu testing update 2 October.

Recuperado de: <https://pir.sa.gov.au/news/biosecurity/h5-bird-flu-testing-update-2-october>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

2 de octubre de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Filipinas: Palawan refuerza medidas de contención ante brote de Peste Porcina Africana.....	2
Nigeria: Fortalecen medidas de bioseguridad para el control de la Peste Porcina Africana en Oke-Aro.	3
China: Estudio identifica cambios en el material genético de las células porcinas durante la infección por el virus de la Peste Porcina Africana.	4

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Filipinas: Palawan refuerza medidas de contención ante brote de Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 1 de octubre de 2026, la Agencia de Información de Filipinas (PIA) informó que el Gobierno Provincial de Palawan intensificó las medidas de contención ante la confirmación de un caso de Peste Porcina Africana (PPA) en la localidad de Concepcion, municipio de Agutaya. La detección fue confirmada el 22 de septiembre mediante pruebas de laboratorio realizadas por el Departamento de Agricultura (DA)-Oficina de Industria Animal (BAI), en las que 40 muestras recolectadas en la zona resultaron positivas al virus.

En respuesta, las autoridades establecieron medidas de cuarentena y puestos de control en Agutaya para regular el movimiento de personas, cerdos y materiales que pudieran contribuir a la propagación del virus. Asimismo, entre el 28 y el 30 de septiembre se llevó a cabo una operación de despoblación dirigida a los cerdos que permanecían en la zona afectada, con la participación de las oficinas veterinarias y agrícolas provinciales y municipales.

Además, las autoridades mantienen actividades de vigilancia activa para determinar la distribución de la enfermedad e identificar posibles casos en otras áreas de Agutaya. Las acciones incluyen investigación de enfermedades, toma de muestras y monitoreo de sitios donde se registren enfermedades o muertes inusuales en cerdos, mientras que el Departamento de Agricultura de MIMAROPA proporciona desinfectantes, kits de diagnóstico y asistencia técnica para fortalecer las medidas de control.

Por otra parte, las autoridades reforzaron las medidas de bioseguridad y exhortaron a los criadores a limitar el movimiento de cerdos, desinfectar equipos, vehículos y calzado, así como notificar de inmediato cualquier enfermedad o muerte repentina. Asimismo, señalaron que la PPA no representa un riesgo para la salud humana, pero las personas pueden contribuir a la propagación del virus mediante productos porcinos contaminados, equipos, vehículos, calzado y otros materiales.

Referencia: Agencia de Información de Filipinas (PIA). (1 de octubre de 2026). Palawan strengthens measures to contain ASF spread.

Recuperado de: <https://pia.gov.ph/news/luzon/mimaropa/palawan-strengthens-measures-to-contain-asf-spread/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Nigeria: Fortalecen medidas de bioseguridad para el control de la Peste Porcina Africana en Oke-Aro.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 2 de octubre de 2026, el Proyecto de Apoyo a la Productividad y la Resiliencia Ganadera (L-PRES) implementó una campaña para fortalecer el control de la Peste Porcina Africana (PPA) en la granja porcina de Oke-Aro, ubicada entre los estados de Lagos y Ogun, Nigeria. La intervención contempla la distribución de equipos de protección y materiales para el control de enfermedades, con el objetivo de reforzar la bioseguridad y reducir el riesgo de nuevos brotes.

La campaña incluye la entrega de equipos de protección personal, botas, mochilas y pulverizadores motorizados, guantes, mascarillas, gafas protectoras y desinfectantes, además de capacitación dirigida a los productores sobre medidas de bioseguridad y buenas prácticas en las explotaciones.

De acuerdo con L-PRES, Oke-Aro constituye uno de los principales centros de producción porcina de Nigeria y ha registrado brotes graves de PPA anteriormente, ocasionando pérdidas de cerdos e inversiones. Como parte de las acciones de prevención y control, se busca fortalecer la desinfección de las instalaciones, el uso adecuado de equipos de protección y el control del movimiento de personas, cerdos, vehículos y equipos entre las explotaciones.

Finalmente, representantes de los productores destacaron la importancia de mantener una concienciación permanente sobre la enfermedad y exhortaron a los poricultores a realizar la desinfección periódica de sus explotaciones y reforzar las medidas de bioseguridad. La PPA es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a los cerdos, no infecta a las personas y puede ocasionar importantes pérdidas económicas cuando no se aplican medidas adecuadas de prevención y control.

Referencia: News Agency of Nigeria. (2 de octubre de 2026). L-PRES unveils African swine fever control at Oke-Aro. Recuperado de: <https://nannews.ng/fever-2/>

Peoples Gazette. (2 de octubre de 2026). L-PRES unveils African swine fever control at Oke Aro pig farm. Recuperado de: <https://gazettengr.com/l-pres-unveils-african-swine-fever-control-at-oke-aro-pig-farm/>

Radio Nigeria. (2 de octubre de 2026). L-PRES intensifies its biosecurity campaign against African swine fever. Recuperado de: <https://radionigeria.gov.ng/2026/10/02/l-pres-steps-up-biosecurity-campaign-against-african-swine-fever/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



China: Estudio identifica cambios en el material genético de las células porcinas durante la infección por el virus de la Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 29 de septiembre de 2026, la revista científica *Cellular and Molecular Life Sciences* publicó un estudio que identificó cambios importantes en la forma en que se organiza y funciona el material genético de las células porcinas durante las primeras horas de infección por el virus de la Peste Porcina Africana (PPA). Los investigadores señalaron que estas modificaciones podrían favorecer la capacidad del virus para evadir la respuesta inmunitaria del hospedador.

El análisis de células del sistema inmunitario de los cerdos infectados con una cepa virulenta y una atenuada mostró una respuesta antiviral similar, con mayor actividad alrededor de las cuatro horas posteriores a la infección. Durante este periodo, aumentó la actividad de genes relacionados con la respuesta inmunitaria, mientras que disminuyó la de genes relacionados con el crecimiento y funcionamiento celular. También se observaron cambios en la actividad de la ARN polimerasa II, una proteína encargada de participar en la producción de ARN a partir de la información contenida en el ADN.

Asimismo, los investigadores encontraron modificaciones en la organización del material genético de las células porcinas: aproximadamente 36.8 % de las regiones analizadas presentaron cambios en su estructura. Además, identificaron 17,787 interacciones entre el ADN del virus y el material genético de las células porcinas, distribuidas en 686 regiones de los cromosomas del hospedador.

Finalmente, los autores concluyeron que la infección temprana por el virus de la PPA provoca cambios coordinados en el funcionamiento y la organización del material genético de las células porcinas, junto con la activación de mecanismos de defensa. Sin embargo, señalaron que aún se requiere determinar qué parte de estos cambios es causada directamente por el virus y cuál corresponde a la respuesta de las propias células frente a la infección.

Referencia: Xu, Y., Yang, B., Zhu, J., Sunkang, Y., Xing, L., Wang, C., Yang, J., Xu, W., Dai, J., Zhang, J., Cao, G., & Xiao, K. (2026). ASFV early infection dynamically remodels host chromatin architecture to evade immune responses. *Cellular and Molecular Life Sciences*.

Recuperado de: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00018-026-06467-9>