



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

5 de octubre de 2026



Contenido

Países Bajos: Identifican virus Shamonda europeo en sangre de un caballo con signos neurológicos. 2

Bélgica: Detecta primer caso de Influenza Aviar H5N1 de la temporada en aves de traspatio. 3

España: Confirma tres focos de Enfermedad de Newcastle en explotaciones avícolas ubicadas en Valencia. 4

Reino Unido: Confirma primer foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N5 de la temporada 2026-2027 en Escocia. 5

Países Bajos: Identifican virus Shamonda europeo en sangre de un caballo con signos neurológicos.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 5 de octubre de 2026, Royal GD, organización neerlandesa especializada en salud animal, informó la detección del virus Shamonda europeo (SHAV-EU) en una muestra de sangre de un caballo que presentaba signos neurológicos en los Países Bajos. La identificación fue realizada mediante una prueba PCR específica, constituyendo el primer reporte de SHAV-EU en sangre de un equino en este país.

El hallazgo se produjo después de que Royal GD detectara un virus perteneciente al serogrupo Simbu en la muestra sanguínea del animal. Posteriormente, las pruebas diagnósticas permitieron identificarlo como SHAV-EU, virus perteneciente al género *Orthobunyavirus* y a la familia *Peribunyaviridae*.

De acuerdo con la información disponible, SHAV-EU también ha sido detectado en caballos de Alemania y Suiza con signos neurológicos, mediante el análisis de tejido cerebral, mientras que Francia reportó recientemente la detección de ARN del virus en sangre de un caballo con manifestaciones similares. En contraste, en bovinos la infección se ha asociado principalmente con fiebre, diarrea, disminución de la producción de leche, abortos y mortinatos.

Ante estos hallazgos, Royal GD recomendó a los médicos veterinarios considerar la infección por SHAV-EU como diagnóstico diferencial en caballos que presenten signos neurológicos inusuales. Asimismo, señaló que las opciones diagnósticas son actualmente limitadas, por lo que resulta necesario mantener una vigilancia estrecha de los animales afectados y realizar el reporte oportuno de casos sospechosos.

Finalmente, la organización destacó que la recopilación continua de información epidemiológica y el desarrollo de investigaciones diagnósticas serán fundamentales para determinar la distribución del virus, su relevancia clínica y su posible impacto en la población equina de Europa.

Referencia: Royal GD. (5 de octubre de 2026). European Shamonda virus detected in a horse with neurological signs. Recuperado de: <https://www.gdanimalhealth.com/en/News/2026/10/European-Shamonda-virus-detected-in-a-horse-with-neurological-signs>

Bélgica: Detecta primer caso de Influenza Aviar H5N1 de la temporada en aves de traspatio.



Imagen representativa de la especie susceptible.
Créditos: <https://www.istockphoto.com>

El 30 de septiembre de 2026, la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (FAVV) de Bélgica informó la detección de un caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) H5N1 en una explotación de traspatio de Balen, provincia de Amberes.

Ante la detección, se establecieron zonas de medidas adicionales de 3 y 10 kilómetros alrededor del foco, donde se reforzarán las medidas de protección de las aves para

prevenir la propagación del virus.

Dentro de la zona de 10 kilómetros, los avicultores, tanto profesionales como particulares, deberán mantener sus aves protegidas, mientras que en la zona de 3 kilómetros esta obligación se extenderá a otras aves. Debido a que el caso corresponde a una explotación de traspatio, Bélgica mantendrá por el momento su estatus de país libre de Influenza Aviar.

La FASFC recomendó proteger los gallineros y aviarios del contacto con aves silvestres, además de mantener a las aves de corral alimentadas en interiores o en áreas protegidas. Asimismo, exhortó a evitar el contacto con aves enfermas o muertas y a notificar cualquier sospecha a un médico veterinario o a las autoridades correspondientes.

La Influenza Aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a las aves y puede transmitirse mediante el contacto directo con animales infectados o materiales contaminados. Aunque la infección en humanos es poco frecuente, hasta el momento no se ha observado transmisión sostenida del virus de persona a persona.

Referencia: Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (FAVV). (5 de octubre de 2026). Vogelgriep H5: besmetting met de hoogpathogene variant bij een hobbyhouder in Balen in provincie Antwerpen.

Recuperado de: <https://favv-afsca.be/nl/vogelgriep-h5-besmetting-met-de-hoogpathogene-variant-bij-een-hobbyhouder-balen-provincie-antwerpen>



España: Confirma tres focos de Enfermedad de Newcastle en explotaciones avícolas ubicadas en Valencia.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 2 de octubre de 2026, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España informó la confirmación de tres focos de enfermedad de Newcastle en la comarca de Utiel, provincia de Valencia, correspondientes a una explotación de 30,776 gallinas reproductoras pesadas y dos granjas de pollos de engorda con 50,790 y 35,517 aves, respectivamente. Estos representan nuevas detecciones en la provincia, donde no se registraban focos desde el 8 de mayo de 2026.

Las pruebas diagnósticas realizadas mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete confirmaron la presencia de una cepa velogénica del virus. En la explotación de reproductoras se reportó disminución generalizada de la postura, así como signos respiratorios, digestivos y neurológicos en aproximadamente 2% de las aves; mientras que en las dos granjas de pollos de engorda se registró una mortalidad de entre 1 y 1.5%. Las aves de las tres explotaciones se encontraban vacunadas contra la enfermedad.

Ante la detección, los Servicios Veterinarios Oficiales implementaron medidas de control que incluyen la inmovilización de las explotaciones afectadas, investigación epidemiológica, vacío sanitario, sacrificio de las aves y eliminación de cadáveres, alimento y otros materiales potencialmente contaminados. Asimismo, se dispuso la destrucción de los huevos embrionados asociados con la granja de reproductoras y la investigación de las explotaciones que recibieron pollitos de un día procedentes de la incubadora relacionada. Adicionalmente, se estableció una zona de restricción alrededor de los focos, con radios de 3 y 10 kilómetros, en los que se localizan 27 y 40 granjas comerciales, respectivamente.

Finalmente, el MAPA recomendó reforzar la vigilancia pasiva en explotaciones avícolas y aves silvestres, fortalecer las medidas de bioseguridad y mantener la profilaxis mediante vacunación, particularmente para reducir el riesgo de infección y la cantidad de virus excretado por las aves infectadas, limitando con ello su posible diseminación hacia nuevas explotaciones.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA). (2 de octubre de 2026). Actualización de enfermedad de Newcastle en Valencia.

Recuperado de: https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/noticias-sanidad-animal/documentos-de-noticias/nota-actualizacion-newcastle-02_10_26.pdf



Reino Unido: Confirma primer foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N5 de la temporada 2026-2027 en Escocia.



El 3 de octubre de 2026, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) del Reino Unido confirmó un foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) subtipo H5N5 en aves de corral de traspatio en Ness, Isla de Lewis, Escocia, correspondiente al primer brote de la temporada 2026-2027. Ante la detección, se establecieron una zona de protección de 3 kilómetros y una zona de vigilancia de 10 kilómetros alrededor de la explotación afectada.

Con la confirmación del foco, Gran Bretaña perdió su estatus de libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad. Para la temporada 2026-2027, este es el primer caso de IAAP registrado en el Reino Unido, mientras que Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte no han reportado detecciones hasta el momento.

Asimismo, las autoridades actualizaron la evaluación de riesgo, estableciendo un nivel medio para la exposición de aves silvestres al virus H5 en Gran Bretaña. Para las aves de corral, el riesgo se considera bajo cuando existen medidas de bioseguridad deficientes o inadecuadas y muy bajo cuando se aplican medidas estrictas de bioseguridad de manera constante.

Finalmente, DEFRA y la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHA) exhortaron a los propietarios de aves a mantener una vigilancia permanente, reforzar las medidas de bioseguridad y reportar oportunamente cualquier sospecha de enfermedad, además de cumplir con las disposiciones establecidas en las zonas de control sanitario.

Referencia: Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, de Reino Unido. (3 de octubre de 2026). Bird flu (avian influenza): latest situation in England.

Recuperado de: <https://www.gov.uk/guidance/bird-flu-avian-influenza-latest-situation-in-england>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

5 de octubre de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Vietnam: Analizan avances y desafíos en la aplicación de vacunas contra la Peste Porcina Africana.	2
Filipinas: Restringe el ingreso de cerdos vivos en Naujan ante riesgo de Peste Porcina Africana.....	3
Letonia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en jabalís.....	4

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Vietnam: Analizan avances y desafíos en la aplicación de vacunas contra la Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 30 de septiembre de 2026, la revista científica *Vietnam Journal of Agricultural Sciences* publicó una revisión sobre los avances, desafíos y perspectivas en el desarrollo y aplicación de vacunas contra la Peste Porcina Africana (PPA), con énfasis en la experiencia de Vietnam con vacunas vivas atenuadas.

El país ha autorizado y aplicado cerca de cuatro millones de dosis de NAVET-ASFVAC y AVAC ASF LIVE en más de 140 granjas de 22 provincias, con eficacias reportadas de 90 a 100 % y eventos adversos inferiores al 1 %. Además, el programa incorporó sistemas de trazabilidad mediante códigos QR, farmacovigilancia y vigilancia genómica para evaluar el desempeño y seguridad de las vacunas.

La revisión identificó como principales desafíos la protección variable frente a diferentes cepas del virus, la falta de correlatos inmunitarios claramente definidos, la posible reversión de la virulencia y recombinación con virus de campo, así como las dificultades para diferenciar animales infectados de vacunados mediante sistemas DIVA. También se señalaron limitaciones relacionadas con la producción a gran escala, los requerimientos de bioseguridad, las diferencias regulatorias entre países y las capacidades de vigilancia posteriores a la vacunación. Los autores concluyeron que la experiencia de Vietnam demuestra que la vacunación puede incorporarse a los programas nacionales de control cuando se acompaña de gestión de riesgos, vigilancia continua y regulación estricta.

Como perspectiva futura, la revisión planteó el desarrollo de estrategias que combinen vacunas vivas atenuadas modificadas genéticamente con plataformas de nueva generación, como ARNm o nanopartículas, para mejorar la seguridad y ampliar la protección frente a distintas variantes del virus. Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la vigilancia genómica, estandarizar las evaluaciones de eficacia y seguridad, armonizar los marcos regulatorios y mantener la cooperación internacional para favorecer una aplicación segura y sostenible de las vacunas contra la PPA.

Referencia: Long, T. (2026). African Swine Fever Vaccine Research and Deployment: A Review of Challenges and Future Directions in Vietnam's Supervised Rollout. *Vietnam Journal of Agricultural Sciences*, 9(3), 3161–3176.
Recuperado de: <https://eng.vjas.vn/index.php/vjas/article/view/641>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Filipinas: Restringe el ingreso de cerdos vivos en Naujan ante riesgo de Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 5 de octubre de 2026, la Agencia de Información de Filipinas (PIA) informó que el Gobierno Municipal de Naujan, provincia de Oriental Mindoro, estableció temporalmente la prohibición del ingreso de cerdos vivos al municipio, como medida preventiva ante el riesgo de introducción y propagación de la Peste Porcina Africana (PPA).

La disposición fue establecida mediante la Orden Ejecutiva Municipal No. 26-040, firmada el 29 de septiembre, y contempla la restricción de cerdos

destinados a venta, entrega, reproducción, sacrificio, alojamiento y otras actividades relacionadas.

En respuesta, las autoridades establecerán puntos de control para la PPA destinados a inspeccionar los vehículos que transporten cerdos y verificar los permisos y documentos correspondientes. Las restricciones también incluyen a comerciantes, criadores y vendedores de carne de cerdo congelada y otros productos derivados, con el objetivo de reducir las posibilidades de introducción del virus al municipio.

Asimismo, el Gobierno Municipal exhortó a los productores porcinos a reforzar las medidas de bioseguridad en sus explotaciones, mediante el mantenimiento de corrales limpios y seguros, uso de pediluvios, establecimiento de cercas adecuadas, desinfección periódica y control de plagas. Además, se solicitó a la población notificar de inmediato cualquier muerte inusual, signos compatibles con PPA o traslado y comercialización ilegal de cerdos y productos porcinos.

Finalmente, las autoridades señalaron que Naujan y la provincia de Oriental Mindoro permanecen libres de PPA, por lo que las medidas implementadas tienen carácter preventivo. Asimismo, exhortaron a la población a mantenerse alerta y consultar únicamente información oficial sobre las acciones de prevención y control de la enfermedad.

Referencia: Agencia de Información de Filipinas (PIA). (5 de octubre de 2026). Naujan town bans entry of live hogs to prevent ASF spread.

Recuperado de: <https://pia.gov.ph/news/luzon/mimaropa/naujan-town-bans-entry-of-live-hogs-to-prevent-asf-spread/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Letonia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en jabalís.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 5 de octubre de 2026, se publicó la actualización de los casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalís silvestres de Letonia, correspondiente al periodo del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026.

Durante este periodo, se reportaron 15 jabalís afectados por PPA en distintas localidades del país.

Los casos se distribuyeron de la siguiente manera:

- En el municipio de Dienvidkurzeme se registraron 4 casos, distribuidos en las localidades de Kalvene (1 caso), Priekule (2 casos) y Vainode (1 caso).
- En el municipio de Dobeles se registró 1 caso, en la localidad de Auri.
- En el municipio de Kuldīga se registró 1 caso, en la localidad de Skrunda.
- En el municipio de Saldus se registraron 3 casos, distribuidos en las localidades de Jaunauce (1 caso), Remte (1 caso) y Ruba (1 caso).
- En el municipio de Talsi se registraron 5 casos, distribuidos en las localidades de Lauciene (3 casos), Lībagi (1 caso) y Roja (1 caso).
- En el municipio de Tukums se registró 1 caso, en la localidad de Smārde.

En lo que va de 2026, Letonia ha reportado un total de 609 jabalís afectados por PPA, con presencia de la enfermedad en 21 municipios y 99 localidades, lo que evidencia la circulación del virus en poblaciones de jabalís silvestres del país.

Referencia: Servicio Alimentario y Veterinario de Letonia (PVD). (5 de octubre de 2026). Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma hronoloģija meža cūkām Latvijā 2026. Gadā.

Recuperado de: <https://www.pvd.gov.lv/lv/afrikas-cuku-mera-uzliesmojumi-latvija>

Recuperado de: <https://www.pvd.gov.lv/lv/media/10680/download?attachment>