



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

7 de octubre de 2026



Contenido

EUA: Confirman Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en una granja avícola de Wisconsin.....	2
Internacional: OPS y México acuerdan fortalecer acciones contra zoonosis y resistencia antimicrobiana.	3
Australia: Confirma nuevo caso de Influenza Aviar subtipo H5 en un charrán crestado mayor en Puerto Lincoln.	4
Internacional: IICA y OIEA impulsan cooperación regional frente al Gusano Barrenador del Ganado.	5
Nueva Zelanda: Llevará a cabo un ejercicio de simulacro sobre Fiebre Aftosa.	6



EUA: Confirman Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en una granja avícola de Wisconsin.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 6 de octubre de 2026, el Departamento de Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor de Wisconsin (DATCP) confirmó la detección de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en una granja avícola doméstica del condado de Racine, Estados Unidos. Las aves presentes en la propiedad fueron sacrificadas y no serán destinadas al consumo humano.

Como parte de las medidas de control, las autoridades recomendaron a los propietarios de aves fortalecer las prácticas de bioseguridad, incluyendo el lavado de manos, la desinfección del equipo, la restricción del acceso a las aves y el aislamiento de nuevos ejemplares durante al menos 30 días. Asimismo, se recomendó mantener a las aves en espacios cerrados para reducir el contacto con aves silvestres y sus excrementos.

Asimismo, el DATCP señaló que el virus puede transmitirse mediante el contacto con aves infectadas o a través de equipos, ropa y otros materiales contaminados. Ante la detección de IAAP en una parvada doméstica, las autoridades evalúan los factores de riesgo para determinar la implementación de una zona de vigilancia de 10 kilómetros, sin establecer necesariamente restricciones de movimiento para las instalaciones avícolas cercanas.

Finalmente, el DATCP indicó que la IAAP continúa circulando en aves silvestres y domésticas de Norteamérica desde diciembre de 2021 y que también ha afectado a otras especies, incluidos mamíferos. Por ello, mantiene la coordinación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para fortalecer la vigilancia, promover medidas de bioseguridad y apoyar a los productores, incluido el sector de ganado lechero.

Referencia: Departamento de Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor de Wisconsin (DATCP). (6 de octubre de 2026). Highly Pathogenic Avian Influenza Confirmed in Racine County.

Recuperado de: <https://datcp.wi.gov/Pages/HighlyPathogenicAvianInfluenzaConfirmedinRacineCounty2026.aspx>



Internacional: OPS y México acuerdan fortalecer acciones contra zoonosis y resistencia antimicrobiana.



Imagen representativa de las especies involucradas.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 7 de octubre de 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que autoridades de la Secretaría de Salud, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la OPS/OMS en México acordaron fortalecer la cooperación técnica bajo el enfoque de “Una Salud”, con énfasis en la prevención y control de zoonosis, la inocuidad de los alimentos y la resistencia antimicrobiana.

Durante la reunión, las autoridades mexicanas compartieron los avances del país en materia de vigilancia epidemiológica, entomoviológica y agroalimentaria, así como las principales áreas en las que se busca ampliar la colaboración con la OPS. Entre los temas prioritarios se incluyeron el mecanismo del Fondo Rotatorio de la OPS, el Gusano Barrenador del Ganado y la resistencia a los antimicrobianos.

Asimismo, se abordaron desafíos relacionados con enfermedades zoonóticas y ambientales presentes en el país, como la rickettsiosis y la biodiversidad de garrapatas. El director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (PANAFTOSA) destacó además el trabajo de México en materia de Influenza Aviar y planteó fortalecer la cooperación técnica regional.

Finalmente, la OPS/OMS y las autoridades mexicanas acordaron dar seguimiento a los compromisos establecidos mediante la representación de la organización en México, con el objetivo de fortalecer las acciones intersectoriales de vigilancia, prevención y control de enfermedades bajo el enfoque de “Una Salud”.

Referencia: Organización Panamericana de la Salud (OPS). (7 de octubre de 2026). México y la OPS fortalecen alianza estratégica bajo el enfoque de “Una Salud” para combatir zoonosis y resistencia antimicrobiana. Recuperado de: <https://www.paho.org/es/noticias/7-10-2026-mexico-ops-fortalecen-alianza-estrategica-bajo-enfoque-salud-para-combatir>



Australia: Confirma nuevo caso de Influenza Aviar subtipo H5 en un charrán crestado mayor en Puerto Lincoln.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 7 de octubre de 2026, el Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia Meridional (PIRSA) confirmó un nuevo evento de Influenza Aviar subtipo H5 en fauna silvestre, elevando a 328 el total de eventos registrados en el estado durante 2026.

La nueva detección correspondió a un charrán crestado mayor (*Thalasseus bergii*), localizado en aguas de Puerto Lincoln, en la Península de Eyre. De acuerdo con los protocolos nacionales, las autoridades

reportan las detecciones como eventos y no como animales individuales, por lo que cada evento puede involucrar a uno o más animales.

Hasta el momento, no se han detectado casos de Influenza Aviar H5 en aves de corral ni en otros animales de producción, mientras que el riesgo para la salud humana continúa considerándose bajo. Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y la coordinación con los sectores productivos, de fauna silvestre y la comunidad para fortalecer las acciones de preparación y respuesta.

Asimismo, se exhorta a la población a evitar el contacto con aves enfermas o muertas y otros animales silvestres, así como reportar oportunamente estos hallazgos a las autoridades. Desde el 1 de enero de 2026, se han realizado 2,476 pruebas para Influenza Aviar H5 y se han recibido 13,760 reportes a través de la línea de atención para enfermedades animales.

Referencia: Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia Meridional (PIRSA). (7 de octubre de 2026). H5 bird flu testing update 7 October.

Recuperado de: <https://pir.sa.gov.au/news/biosecurity/h5-bird-flu-testing-update-7-october>



Internacional: IICA y OIEA impulsan cooperación regional frente al Gusano Barrenador del Ganado.



Imagen representativa de *Cochliomyia hominivorax*.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 6 de octubre de 2026, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reunieron en Costa Rica a especialistas de las Américas para fortalecer las estrategias regionales de vigilancia, prevención y control del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), ante la expansión de esta plaga y sus efectos sobre la producción pecuaria, el bienestar animal y los medios de vida rurales.

Durante el taller regional se intercambiaron experiencias sobre detección temprana, diagnóstico, vigilancia epidemiológica, control de la movilización animal y trazabilidad, además de identificar oportunidades de cooperación para fortalecer las capacidades de los servicios veterinarios. Asimismo, se destacó la participación de productores, organizaciones pecuarias y sector privado como un componente fundamental para la prevención, notificación oportuna y respuesta ante casos sospechosos.

Como parte de las estrategias de control, los especialistas resaltaron la Técnica del Insecto Estéril (TIE), que consiste en la liberación de moscas esterilizadas mediante irradiación para reducir progresivamente la reproducción de las poblaciones silvestres. Los participantes señalaron que esta herramienta debe integrarse con sistemas de vigilancia, diagnóstico, notificación, control de movilización animal y participación activa de los productores.

Asimismo, durante el encuentro se realizó una visita técnica al Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (LANASEVE) del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) de Costa Rica, donde se conocieron los procedimientos para la detección, diagnóstico y toma de muestras ante casos sospechosos. Finalmente, los países participantes establecieron como prioridades fortalecer el intercambio de información, la trazabilidad, el control de la movilización, la capacitación y comunicación de riesgos, así como desarrollar protocolos armonizados de prevención y respuesta para avanzar hacia el control y erradicación regional del GBG.

Referencia: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). (6 de octubre de 2026). Expertos de las Américas fortalecen estrategias para proteger a productores y sistemas pecuarios frente al gusano barrenador del ganado. Recuperado de: <https://iica.int/es/prensa/noticias/expertos-de-las-americas-fortalecen-estrategias-para-proteger-a-productores-y-sistemas-pecuarios-frente-al-gusano-barrenador-del-ganado/>



Nueva Zelanda: Llevará a cabo un ejercicio de simulacro sobre Fiebre Aftosa.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com>

El 6 de octubre de 2026, la Delegada de Nueva Zelanda ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y Jefa de los Servicios Veterinarios informó que los días 15 de octubre y 20 de noviembre de 2026 se llevará a cabo en Wellington, Nueva Zelanda, el ejercicio de simulacro de Fiebre Aftosa (FA) denominado “FMD Council Response Governance Exercise”, con el objetivo de fortalecer la capacidad de liderazgo y la toma de decisiones ante una eventual emergencia zoonosaria.

El simulacro, organizado por el Ministerio de Industrias Primarias (MPI) en colaboración con organismos del sector ganadero de Nueva Zelanda, está diseñado para poner a prueba la gobernanza y coordinación de la respuesta ante la FA. Durante el ejercicio, los participantes practicarán la toma de decisiones urgentes y de alto impacto en escenarios de incertidumbre, así como los mecanismos de comunicación y escalamiento durante una emergencia de bioseguridad.

Entre los principales objetivos del ejercicio se encuentran reforzar la toma de decisiones estratégicas, clarificar las funciones y responsabilidades de los dirigentes de las organizaciones participantes, evaluar los protocolos de comunicación y profundizar en la comprensión de las repercusiones sociales, económicas y operativas que podrían derivarse de las decisiones adoptadas durante una respuesta sanitaria. Asimismo, se busca generar confianza, fortalecer la coordinación interinstitucional y promover una visión compartida de preparación frente a la FA.

El ejercicio se desarrollará en dos etapas. La primera simulará las actividades de gestión durante las primeras 72 horas posteriores a la notificación de un caso sospechoso de FA, mientras que la segunda pondrá a prueba los mecanismos de gobernanza después de un mes de respuesta continuada. Además, permitirá recopilar lecciones prácticas y áreas de mejora para fortalecer la planificación, el desarrollo de políticas y las capacidades de respuesta. Participarán dirigentes y personal de bioseguridad y comercio del MPI, así como representantes y responsables de bioseguridad de asociaciones del sector ganadero de Nueva Zelanda.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (6 de octubre de 2026). Ejercicio de simulacro: Fiebre aftosa en Nueva Zelanda.

Recuperado de: <https://www.woah.org/app/uploads/2026/10/20261015-nzl.pdf>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

7 de octubre de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Finlandia: Confirman Peste Porcina Africana en un jabalí hallado en Virolahti.	2
Isla Nieves: fortalece acciones de vigilancia y respuesta ante Peste Porcina Africana.....	3
Filipinas: Autoridades interceptan 150 cerdos sin documentación como medida preventiva ante la Peste Porcina Africana en Bohol.	4
Italia: Actualización de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en el país.	5

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Finlandia: Confirman Peste Porcina Africana en un jabalí hallado en Virolahti.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 7 de octubre de 2026, la Autoridad Alimentaria de Finlandia informó la detección de Peste Porcina Africana (PPA) en los restos óseos de un jabalí hallados en Virolahti, aproximadamente a 15 kilómetros al oeste de la actual zona central de infección, en dirección a Hamina. Los restos, correspondientes a un animal de varios meses de edad, fueron considerados de varios meses de antigüedad, por lo que el hallazgo no indica una propagación reciente o activa de la enfermedad.

La detección se registró fuera de la zona central de infección, en un área donde las autoridades prevén encontrar restos aislados de jabalís que hayan muerto a causa de PPA. Por ello, las labores de búsqueda se mantienen en el sector comprendido entre Pyhtää y Vaalimaa, con el propósito de identificar posibles casos y determinar la distribución de la enfermedad.

Como parte de las acciones de vigilancia, la Autoridad Alimentaria de Finlandia reevaluará la extensión de la zona de infección en caso de confirmarse jabalís infectados fuera del área central actualmente establecida. Esta evaluación permitirá determinar si es necesario modificar la delimitación de las zonas sujetas a medidas de control de acuerdo con la situación epidemiológica.

Finalmente, durante la misma semana se confirmaron resultados positivos de PPA en el cadáver de un jabalí de entre una y dos semanas de edad, localizado en la zona central de Miehkälä, así como en otro jabalí retirado de dicha zona. Las autoridades mantienen las labores de vigilancia y búsqueda de animales muertos para favorecer la detección oportuna de nuevos casos.

Referencia: Autoridad Alimentaria de Finlandia. (7 de octubre de 2026). Afrikkalaista sikaruttoa löytyi Virolahdelta ydinalueen ulkopuolelta.

Recuperado de: <https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/afrikkalaista-sikaruttoa-loytyi-virolahdelta-ydinalueen-ulkopuolelta/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Isla Nieves: fortalece acciones de vigilancia y respuesta ante Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 7 de octubre de 2026, a través de diversos medios de comunicación se informó que la División Veterinaria y Ganadera de la Administración de la Isla de Nieves, San Cristóbal y Nieves, fortaleció las acciones de vigilancia y preparación para la respuesta ante la Peste Porcina Africana (PPA), con apoyo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y coordinación técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Como parte de estas acciones, personal técnico y administrativo participa en una capacitación que incluye ejercicios prácticos de vigilancia en explotaciones porcinas locales, así como procedimientos para la toma, empaque y envío de muestras. Asimismo, se realizan prácticas sobre la colocación y retiro adecuado del equipo de protección personal y la aplicación de protocolos de manejo ante una eventual emergencia sanitaria.

Las autoridades señalaron que, debido al riesgo que representa la PPA para la región del Caribe, resulta necesario fortalecer las capacidades de detección temprana y respuesta. En este sentido, se implementará un programa de vigilancia epidemiológica rutinaria mediante visitas a explotaciones porcinas y la toma preventiva de muestras para identificar oportunamente la presencia de la enfermedad y de otros padecimientos que afectan al sector.

Finalmente, estas actividades forman parte del Proyecto de Vigilancia y Respuesta para la Prevención de la Peste Porcina Africana en las Américas, iniciativa de cooperación entre el IICA y el USDA orientada a fortalecer las capacidades de los servicios veterinarios del Caribe. Las autoridades de Nieves destacaron que la preparación previa permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante una eventual introducción de la enfermedad en la isla.

Referencia: SKN News. (7 de octubre de 2026). Nevis Strengthens African Swine Fever Surveillance and Response Preparedness.
Recuperado de: <https://sknnews.com/featured/nevis-strengthens-african-swine-fever-surveillance-and-response-preparedness-210029668>

Referencia: WinnFM 98.9. (7 de octubre de 2026). NIA Veterinary & Livestock Division receive training to strengthen response to African Swine Fever.
Recuperado de: <https://www.winnmediaskn.com/nia-veterinary-livestock-division-receive-training-to-strengthen-response-to-african-swine-fever/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Filipinas: Autoridades interceptan 150 cerdos sin documentación como medida preventiva ante la Peste Porcina Africana en Bohol.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

Entre el 5 y 7 de octubre de 2026, a través de diversos medios de comunicación se informó que autoridades de la provincia de Bohol, Filipinas, interceptaron 150 cerdos vivos sin la documentación sanitaria y de movilización requerida, en el municipio de Getafe, con un valor estimado de 1.3 millones de pesos filipinos. La acción se realizó como parte de las medidas implementadas para prevenir la propagación de la Peste Porcina Africana (PPA) y apoyar la recuperación del sector porcino de la provincia.

Como parte de la intervención, las autoridades determinaron que el cargamento, localizado el 2 de octubre en el Barangay San José, carecía del Certificado de Salud Veterinaria, resultado de la prueba de PPA, permiso de envío y autorización de desinfección. El origen declarado de los animales correspondía a Dumanjug, en la provincia de Cebú, mientras que las autoridades verifican información sobre una posible procedencia de Negros, donde también se han registrado casos de PPA.

Los animales fueron puestos en cuarentena y se otorgó al propietario un plazo de 24 horas para presentar la documentación requerida; sin embargo, ante el incumplimiento de la disposición, los cerdos fueron sacrificados humanitariamente el 3 de octubre, de acuerdo con los protocolos veterinarios y de cuarentena. Posteriormente, los cadáveres fueron enterrados en un área designada para su disposición en el Barangay Taytay, también en Getafe.

Finalmente, las autoridades señalaron que la medida se tomó debido al incumplimiento de los requisitos de movilización y que no se reportó ningún resultado de laboratorio que confirmara la infección por PPA en los animales. El Gobierno Provincial de Bohol exhortó a propietarios, comerciantes y transportistas a cumplir con las disposiciones sanitarias para la entrada y movilización de ganado, con el propósito de prevenir la introducción de enfermedades y contribuir a la recuperación y repoblación de la industria porcina de la provincia.

Referencia: Cebu Daily News (CDN). (7 de octubre de 2026). Bohol authorities intercept 150 undocumented live hogs from Cebu

Recuperado de: <https://cebudailynews.inquirer.net/772920/bohol-authorities-intercept-150-undocumented-live-hogs-from-cebu/amp>

Gobierno Provincial de Bohol, cuenta de Facebook. (5 de octubre de 2026).

Recuperado de: <https://www.facebook.com/BoholGovPH/posts/the-provincial-government-of-bohol-pgbh-under-the-leadership-of-gov-aris-aumenta/1558056516365870/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Italia: Actualización de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en el país.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 7 de octubre de 2026, el Instituto Zooprofilático Experimental de Abruzzo y Molise "Giuseppe Caporale" (IZSAM) informó la actualización de los casos de Peste Porcina Africana (PPA) registrados en Italia, correspondientes al periodo del 1 de enero de 2022 al 7 de octubre de 2026.

Durante este periodo, se contabilizaron 4,339 jabalís positivos y 55 brotes en porcinos domésticos, distribuidos en diversas regiones del país.

En fauna silvestre, la mayor concentración de casos se mantiene en el norte y centro-norte de Italia, principalmente en las regiones de Liguria, Piamonte, Emilia-Romaña y Toscana.

Las provincias con mayor número de jabalís positivos fueron Génova, en Liguria, con 1,026 casos; Alessandria, en Piamonte, con 728; Lucca, en Toscana, con 434; Parma, en Emilia-Romaña, con 422; y Massa, también en Toscana, con 371. Asimismo, destacan Pavía, en Lombardía, con 311 casos; Savona, en Liguria, con 275; y Piacenza, en Emilia-Romaña, con 237.

En porcinos domésticos, los 55 brotes se concentraron principalmente en las provincias de Pavía, en Lombardía, con 22 brotes; Novara, en Piamonte, con 7; Reggio Calabria, en Calabria, con 6; Lodi, en Lombardía, con 6; y Nuoro, en Cerdeña, con 5. También se registraron brotes en Milán, Piacenza, Roma, Alessandria, Massa, Pistoia y Vercelli.

La distribución de los casos muestra que el virus continúa circulando principalmente en poblaciones de jabalís del norte y centro-norte de Italia, mientras que los brotes en porcinos domésticos permanecen más focalizados. Ante esta situación, se mantiene la importancia de la vigilancia epidemiológica para identificar oportunamente nuevos casos y fortalecer las medidas de prevención y control, principalmente en las zonas con presencia de la enfermedad.

Referencia: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", COVEPI. (Consultado el 7 de octubre de 2026). African Swine Fever National epidemiological bulletin.

Recuperado de: <https://storymaps.arcgis.com/stories/9fe6aa3980ca438cb9c7e8d656358f35>