



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

12 de octubre de 2026



Contenido

Japón: Confirma Fiebre Porcina Clásica en cerdos domésticos y detecta el virus por primera vez en jabalís silvestres de la prefectura de Chiba.	2
Alemania: Analiza el origen del brote de Fiebre Aftosa registrado en búfalos en 2025.	3
Internacional: OMSA alerta sobre el aumento de enfermedades transmitidas por vectores y pide reforzar la vigilancia epidemiológica.	4
Internacional: OPS destaca la vacunación de perros y gatos como estrategia para prevenir la Rabia en República Dominicana.....	5

Japón: Confirma Fiebre Porcina Clásica en cerdos domésticos y detecta el virus por primera vez en jabalís silvestres de la prefectura de Chiba.



Imagen representativa de una de las especies afectadas.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 10 y 11 de octubre de 2026, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) informó la detección de Fiebre Porcina Clásica (FPC) en una explotación porcina de la prefectura de Gunma y en un jabalí silvestre de la prefectura de Chiba. El caso en cerdos domésticos corresponde al número 107 registrado en el país, mientras que el hallazgo en Chiba representa la primera detección de la enfermedad en jabalís silvestres de dicha prefectura.

El 10 de octubre, las autoridades confirmaron la enfermedad en una explotación ubicada en la ciudad de Shibukawa, Gunma, tras realizar pruebas de laboratorio a muestras de animales que presentaban signos anormales. La granja alberga aproximadamente 1,900 cerdos y está vinculada con otra explotación de la misma ciudad que cuenta con alrededor de 900 animales.

Por otra parte, el 11 de octubre, el MAFF confirmó la presencia del virus de campo de la FPC en los restos de un jabalí silvestre encontrado en la ciudad de Kamogawa, prefectura de Chiba. El ejemplar fue localizado el 9 de octubre y las pruebas de laboratorio confirmaron la infección, lo que motivó el refuerzo de las medidas de vigilancia y prevención en la zona.

Ante estas detecciones, las autoridades implementarán el sacrificio sanitario de los cerdos de la explotación afectada, la eliminación de los animales y una investigación epidemiológica para determinar la posible vía de infección. Asimismo, en Chiba se intensificarán la vigilancia y captura de jabalís silvestres, la distribución de vacunas orales y las medidas de bioseguridad en las explotaciones porcinas, incluida la aplicación oportuna de vacunas a los cerdos domésticos.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF). (10 de octubre de 2026). 群馬県における豚熱の患畜の確認（国内107例目）及び「農林水産省豚熱・アフリカ豚熱防疫対策本部」の持ち回り開催について.

Recuperado: <https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/261010.html>

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF). (11 de octubre de 2026). 千葉県における野生イノシシの豚熱感染事例について.

Recuperado: <https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/261011.html>



Alemania: Analiza el origen del brote de Fiebre Aftosa registrado en búfalos en 2025.




Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 10 de octubre de 2026, el Instituto Friedrich Loeffler (FLI) de Alemania informó sobre los resultados de una investigación del brote de Fiebre Aftosa (FA) registrado en enero de 2025 en una explotación de búfalos de agua (*Bubalus bubalis*) en Brandeburgo, el primero en el país en casi cuatro décadas. Los análisis genómicos identificaron al virus como perteneciente al serotipo O, topotipo ME-SA, linaje SA-2018, estrechamente relacionado con variantes detectadas en Türkiye a finales de noviembre de 2024.

La investigación epidemiológica estimó que la introducción del virus ocurrió durante la segunda mitad de diciembre de 2024. Aunque no se determinó la vía exacta de ingreso, los investigadores señalaron que probablemente estuvo relacionada con actividades humanas, como la introducción de productos alimenticios contaminados procedentes de países afectados. Asimismo, los análisis de las redes de movilización y las simulaciones epidemiológicas indicaron un bajo potencial de propagación, debido a la limitada conexión entre las explotaciones ganaderas de la zona.

Tras la detección, las autoridades implementaron medidas sanitarias inmediatas, que incluyeron el sacrificio de los animales afectados, restricciones a la movilización y el establecimiento de zonas de protección y vigilancia. El brote se limitó a un solo rebaño y no se identificaron infecciones adicionales, lo que permitió que Alemania recuperara su estatus de país libre de Fiebre Aftosa sin vacunación el 14 de abril de 2025. Aunque se evaluó la posible protección cruzada de determinadas cepas vacunales, no fue necesario implementar la vacunación durante este evento.

Ante el riesgo de introducción del virus desde otras regiones, el FLI destacó la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica, fortalecer la detección temprana y realizar diagnósticos diferenciales oportunos en animales susceptibles. Asimismo, especialistas de la Comisión Permanente de Vacunación Veterinaria de Alemania (StIKo Vet) plantearon revisar la legislación europea para permitir que los animales sanos vacunados durante las medidas de control puedan conservarse y destinarse a la producción, en lugar de ser sacrificados de manera obligatoria.

Referencia: Instituto Friedrich Loeffler (FLI). (10 de octubre de 2026). From buffalo in Brandenburg to modern vaccination strategies: Foot-and-mouth disease is always a possibility!.

Recuperado de: <https://www.fli.de/en/news/short-messages/short-message/from-buffalo-in-brandenburg-to-modern-vaccination-strategies-foot-and-mouth-disease-is-always-a-possibility/>
<https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.aeh6459>



Internacional: OMSA alerta sobre el aumento de enfermedades transmitidas por vectores y pide reforzar la vigilancia epidemiológica.



Imagen representativa de uno de los vectores involucrados.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 9 de octubre de 2026, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) informó un incremento en los eventos epidemiológicos excepcionales de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) notificados a través del Sistema Mundial de Información Zoonosaria (WAHIS), particularmente desde 2023.

La Lengua Azul concentró el mayor aumento, al pasar de un promedio de 9.1 eventos anuales entre 2015 y 2022 a 38 por año entre 2023 y 2025, mientras que los eventos de Fiebre del Nilo Occidental aumentaron de 8 a 55 por año.

La Lengua Azul representó la mayoría de los brotes de ETV notificados desde 2005, con Europa como la principal región afectada desde 2022. Por su parte, África concentró la mayor proporción de eventos de Fiebre del Valle del Rift, mientras que las Américas registraron la mayoría de los casos de Anemia Infecciosa Equina y Encefalitis Equina Occidental. Asimismo, la Dermatitis Nodular Contagiosa amplió su distribución geográfica desde África hacia Oriente Medio, Europa y Asia.

La OMSA señaló que el cambio climático, las modificaciones en los patrones de lluvia y el uso de la tierra están alterando la distribución, supervivencia y actividad de los vectores, lo que favorece la transmisión de enfermedades en regiones previamente no afectadas. También destacó la influencia de la movilidad de animales y personas, el comercio y los cambios en las interacciones entre fauna silvestre, ganado y humanos. No obstante, advirtió que las tendencias de notificación también pueden estar relacionadas con cambios en la vigilancia, la capacidad diagnóstica y las prácticas de reporte.

Ante esta situación, la organización instó a sus Miembros a fortalecer la vigilancia integrada, la alerta temprana y la notificación oportuna de casos mediante WAHIS, así como a invertir en capacidades de laboratorio y diagnóstico. Asimismo, recomendó aplicar medidas de control basadas en el riesgo, incluida la vacunación cuando esté disponible, el control de vectores y la gestión de movimientos de animales, además de reforzar la colaboración entre los Servicios Veterinarios, las autoridades de salud pública y las instituciones ambientales bajo el enfoque de Una Salud.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (9 de octubre de 2026). WOA calls for stronger surveillance and preparedness as reported vector-borne disease events are on the rise.

Recuperado de: <https://www.woah.org/en/woah-calls-for-stronger-surveillance-and-preparedness-as-reported-vector-borne-disease-events-are-on-the-rise/>



Internacional: OPS destaca la vacunación de perros y gatos como estrategia para prevenir la Rabia en República Dominicana.



El 9 de octubre de 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó el inicio de la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2026 en República Dominicana, con el objetivo de vacunar gratuitamente a un millón de perros y gatos en todo el país. La campaña se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre, mediante aproximadamente 5,000 brigadas que realizarán visitas casa por casa y establecerán puestos fijos en comunidades y centros de salud.

La jornada es coordinada por el Ministerio de Salud Pública, a través del Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis (CECOVEZ), con el acompañamiento de la OPS/OMS. Las autoridades destacaron que la vacunación de perros y gatos constituye una medida fundamental para prevenir la transmisión de la Rabia a las personas y avanzar hacia su eliminación como problema de salud pública.

Asimismo, el ministro de Salud Pública informó que, hasta la fecha del lanzamiento, no se habían registrado casos de Rabia humana en el país durante 2026. Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la población para facilitar el acceso de las brigadas a los hogares y acudir a los puestos de vacunación, a fin de ampliar la cobertura y mantener las medidas de prevención.

Finalmente, la OPS/OMS destacó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos regionales para eliminar la Rabia humana transmitida por perros, bajo el enfoque de “Una Salud”, que promueve la coordinación entre los sectores de salud humana, animal y ambiental para fortalecer la prevención y el control de enfermedades zoonóticas.

Referencia: Organización Panamericana de la Salud (OPS). (9 de octubre de 2026). República Dominicana impulsa la vacunación de perros y gatos para avanzar hacia la eliminación de la rabia. Recuperado de: <https://www.paho.org/es/noticias/9-10-2026-republica-dominicana-impulsa-vacunacion-perros-gatos-para-avanzar-hacia>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

12 de octubre de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Vietnam: Completa la exportación de 300,000 dosis de vacuna contra la Peste Porcina Africana a Filipinas.	2
Alemania: Implementa sistema digital para reportar hallazgos de jabalís muertos y reforzar la vigilancia de Peste Porcina Africana.....	3
Filipinas: Fortalece las inspecciones sanitarias ante casos de Peste Porcina Africana en Pangasinan.	4

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Vietnam: Completa la exportación de 300,000 dosis de vacuna contra la Peste Porcina Africana a Filipinas.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

Entre el 10 y el 11 de octubre de 2026, a través de medios de comunicación de Vietnam, se informó que la empresa AVAC Vietnam Joint Stock Company completó la exportación de un pedido de 300,000 dosis de la vacuna viva AVAC ASF LIVE contra la Peste Porcina Africana (PPA) a Filipinas, tras enviar un último lote de 100,000 dosis. La distribución se realizó después de que las autoridades filipinas autorizaran su comercialización en el país.

Hasta mayo de 2026, se habían administrado 500,000 dosis de esta vacuna en cerdos de Filipinas, con evaluaciones que reportaron un perfil de seguridad favorable. Actualmente, su uso está autorizado únicamente en cerdos de engorde, mientras continúan los estudios para evaluar su aplicación en cerdas reproductoras.

Ante esta situación, representantes del sector veterinario destacaron la importancia de fortalecer la orientación técnica a los productores sobre el uso adecuado de la vacuna, respetando las indicaciones correspondientes a la edad de los animales, la dosis, la vía de administración y el momento de aplicación. Asimismo, señalaron la necesidad de mantener la cadena de frío y cumplir con las recomendaciones de manejo para preservar su eficacia y seguridad.

Finalmente, se advirtió que la vacuna tiene una función preventiva y no constituye un tratamiento para animales enfermos. Por ello, se recomendó evitar su aplicación en cerdos con signos clínicos o sospechosos de infección, salvo que exista una indicación veterinaria específica conforme a las disposiciones de la autoridad competente, con el propósito de contribuir al control de la PPA y reducir los riesgos asociados con su propagación.

Referencia: Vietnam.VN. (10 de octubre de 2026). Hoàn tất đơn hàng 300.000 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi sang Philippines. Recuperado de: <https://www.vietnam.vn/es/hoan-tat-don-hang-300-000-lieu-vaccine-dich-ta-lon-chau-phi-sang-philippines>

Vietnam Plus. (11 de octubre de 2026). Vietnam exporta a Filipinas primer lote comercial de su vacuna contra peste porcina africana.

Recuperado de: <https://es.vietnamplus.vn/vietnam-exporta-a-filipinas-primer-lote-comercial-de-su-vacuna-contra-pesto-porcina-africana-post243489.vnp>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Alemania: Implementa sistema digital para reportar hallazgos de jabalís muertos y reforzar la vigilancia de Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 12 de octubre de 2026, la Asociación de Criadores de Cerdos de Alemania (ISN) informó que el Ministerio de Agricultura de Hesse, Alemania, informó la implementación de un sistema digital para notificar el hallazgo de jabalís silvestres muertos, como parte de las medidas de vigilancia y prevención de la Peste Porcina Africana (PPA). La herramienta busca agilizar la detección de posibles nuevas introducciones de la enfermedad, especialmente en zonas donde aún no se ha confirmado su presencia.

El sistema permite realizar reportes mediante un formulario en línea, sin necesidad de registro previo, e indicar la ubicación del animal mediante GPS o un mapa. La información se envía directamente a la autoridad veterinaria competente del distrito o ciudad correspondiente, para facilitar la localización y el análisis de los ejemplares.

Desde junio de 2024, la PPA está presente en el estado de Hesse. En las zonas restringidas por la enfermedad, la notificación de jabalís muertos es obligatoria; sin embargo, las autoridades también exhortaron a reportar estos hallazgos en áreas sin casos confirmados, a fin de identificar oportunamente una posible propagación del virus.

Finalmente, el Ministerio destacó que esta herramienta fortalecerá la vigilancia epidemiológica y facilitará la respuesta de las autoridades veterinarias ante posibles detecciones, contribuyendo a mejorar la prevención y el control de la PPA en la región.

Referencia: Asociación de Criadores de Cerdos de Alemania (ISN). (12 de octubre de 2026). ASP-Monitoring: Hessen schafft digitale Meldemöglichkeit für Wildschweinfunde.

Recuperado de: <https://www.schweine.net/news/asp-monitoring-hessen-schafft-digitale-meldemoegli.html>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Filipinas: Fortalece las inspecciones sanitarias ante casos de Peste Porcina Africana en Pangasinan.



El 12 de octubre de 2026, la Agencia de Noticias de Filipinas (PNA) informó, a través de su cuenta oficial en la plataforma X, que la Oficina Veterinaria Municipal de Malasiqui, en la provincia de Pangasinan, intensificó las inspecciones sanitarias y las campañas informativas contra la Peste Porcina Africana (PPA), tras la detección del virus en el matadero local durante un muestreo aleatorio realizado por el Servicio Nacional de Inspección de Carne. Al 12 de octubre, 27 criadores de cerdos habían reportado casos de la enfermedad, lo que había

derivado en el sacrificio de 194 animales.

En Malasiqui, las autoridades reforzaron las inspecciones de carne en el matadero, el mercado público y las comunidades, además de capacitar a los productores sobre el manejo adecuado de los cerdos y las medidas de desinfección. Asimismo, exhortaron a los criadores a notificar oportunamente los casos sospechosos y recordaron la disponibilidad de un programa de indemnización para los productores cuyos animales sean sacrificados por las autoridades como medida de control sanitario.

Por su parte, la veterinaria provincial de Pangasinan informó que Malasiqui aún no había sido clasificada como Zona Roja de PPA, mientras que Alaminos e Infanta mantenían dicha clasificación, aunque no registraban casos activos al 12 de octubre. Asimismo, diversas administraciones locales implementaron restricciones al movimiento de cerdos vivos y productos porcinos para prevenir la propagación de la enfermedad.

Entre las medidas adoptadas, San Quintín prohibió el ingreso de productos cárnicos, aunque permitió la entrada de cerdos vivos, mientras que Aguilar, Bautista y Bayambang prohibieron temporalmente el ingreso y la salida de cerdos vivos, carne y productos cárnicos. Por su parte, Pozorrubio estableció una prohibición de 30 días para el ingreso y la salida de cerdos vivos. Estas acciones buscan reducir el riesgo de propagación del virus y fortalecer las medidas de prevención y control de la PPA en la provincia.

Referencia: Agencia de Noticias de Filipinas (PNA), cuenta oficial de X. (12 de octubre de 2026). Pangasinan town steps up inspections, info drive vs ASF By Hilda Austria.

Recuperado de: <https://x.com/pnagovph/status/2109583083523452985?s=20>