



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

13 de octubre de 2026



Monitor Zoonosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Namibia: Confirma nuevos casos de Fiebre Aftosa en bovinos ubicados en la región de Zambezi.	2
Reino Unido: Registra 3,370 casos de Lengua Azul durante la temporada 2026-2027.	3
EUA: Confirma 53 casos de Gusano Barrenador del Ganado en animales domésticos.....	4
Polonia: Fortalece las medidas de bioseguridad ante el riesgo de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad por migraciones de aves silvestres.....	5
Internacional: PANAFTOSA capacita a médicos veterinarios oficiales de Uruguay en vigilancia y respuesta ante la Fiebre Aftosa.	6

Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE



Namibia: Confirma nuevos casos de Fiebre Aftosa en bovinos ubicados en la región de Zambezi.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 13 de octubre de 2026, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Agua y Reforma Agraria de Namibia, realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de “Reurrencia de una enfermedad erradicada”, debido a un caso de Fiebre Aftosa (FA), en bovinos de ubicados en la región de Zambezi.

De acuerdo con la información, el evento está resuelto y se especificó lo siguiente:

Región	Localidad	Animales susceptibles	Casos
Zambezi	Isla Kalala	3,500	20

El agente patógeno fue identificado en el Laboratorio Veterinario Central de Windhoek mediante pruebas diagnósticas de reacción en cadena de la polimerasa polimerasa en tiempo real (RT-PCR) y un ensayo inmunoenzimático (NSP ELISA) para la detección de anticuerpos contra proteínas no estructurales del virus de la Fiebre Aftosa.

Las medidas sanitarias aplicadas fueron: vigilancia sin zona de restricción, restricción de la movilización, trazabilidad, vacunación en respuesta al brote y vigilancia dentro de la zona de restricción.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (13 de octubre de 2026). Fiebre aftosa, Namibia.

Recuperado de: <https://wahis.woah.org/#/in-review/7897?fromPage=event-dashboard-url>



Reino Unido: Registra 3,370 casos de Lengua Azul durante la temporada 2026-2027.



Imagen representativa de una de las especies involucradas.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 13 de octubre de 2026, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) y la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHA) del Reino Unido informaron un total de 3,370 casos de Lengua Azul, principalmente por el serotipo 3 (BTV-3) y serotipos no determinados, durante la temporada 2026-2027, distribuidos en Inglaterra (2,840), Gales (481) y Escocia (49), sin casos de BTV-8. El 12 de octubre se confirmaron 28 nuevos casos en Inglaterra, tres en Gales y uno en Escocia, principalmente

en ovinos y bovinos.

En Inglaterra, Devon concentra el mayor número de establecimientos afectados, con 1,277 casos, seguido de Cornwall, con 363, y Somerset, con 346. En Gales destacan Carmarthenshire y Powys, con 80 casos cada uno, mientras que en Escocia, Dumfries y Galloway registra 42 casos. Desde el 1 de julio de 2026, la enfermedad se ha identificado en ovinos, bovinos, caprinos, alpacas, llamas, ciervos y bisontes; además, 478 posibles casos permanecen bajo investigación en Gran Bretaña.

El riesgo de introducción del virus se mantiene en nivel medio por todas las vías y bajo por vía aérea. Las condiciones de temperatura continúan favoreciendo la actividad de los mosquitos vectores y la transmisión del virus, por lo que persiste el riesgo de dispersión desde Europa continental mediante insectos infectados transportados por el viento, así como por productos germinales contaminados, incluidos semen, óvulos y embriones.

En materia de control, Inglaterra, Gales y Escocia mantienen zonas de restricción sanitaria en todo su territorio; en Escocia, esta medida entró en vigor el 3 de octubre de 2026. Las autoridades mantienen medidas para regular la movilización de animales y productos germinales, incluidos requisitos de autorización y pruebas en determinados casos, y recomiendan vigilar los signos clínicos y notificar oportunamente las sospechas de la enfermedad.

Referencia: Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra). (Consultado el 13 de octubre de 2026).
Bluetongue: latest situation.

Recuperado de: <https://www.gov.uk/guidance/bluetongue-latest-situation>



EUA: Confirma 53 casos de Gusano Barrenador del Ganado en animales domésticos.



Imagen representativa de *Cochliomyia hominivorax*.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó, a través de su tablero de detecciones confirmadas de Gusano Barrenador del Ganado (GBG), que al 12 de octubre de 2026 se han confirmado 53 casos en animales domésticos desde el inicio del evento sanitario en junio de 2026, de los cuales tres permanecen activos y 50 se encuentran inactivos. Asimismo, no se han registrado casos en fauna silvestre o feral; sin embargo, el tablero reporta una detección en

trampas para moscas.

De acuerdo con la información publicada por el APHIS, las detecciones registradas durante 2026 corresponden a 14 casos en julio, cuatro en agosto, tres en septiembre y dos en octubre. La primera detección animal de GBG en Estados Unidos se registró el 3 de junio de 2026, y desde entonces se han confirmado casos en dos estados.

En cuanto a las detecciones más recientes, el tablero registra casos confirmados los días 2 y 10 de octubre de 2026 en los condados de Brewster y Pecos, Texas, respectivamente. Ambos corresponden a animales domésticos y se encuentran clasificados como activos.

Asimismo, el tablero de vigilancia presenta información sobre la fecha de confirmación, estado, condado, tipo de caso, especie afectada y estatus sanitario de las detecciones registradas, además de la distribución geográfica de los casos y los resultados de la vigilancia mediante trampas para moscas.

Finalmente, el APHIS mantiene actualizado el tablero de detecciones confirmadas de Gusano Barrenador del Ganado para dar seguimiento a la situación epidemiológica en Estados Unidos y apoyar las actividades de vigilancia, prevención, control y respuesta sanitaria.

Referencia: Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS). (Consultado el 13 de octubre de 2026). Confirmed Detections of New World Screwworm.

Recuperado de: <https://www.aphis.usda.gov/animals/animal-health/livestock-and-poultry-disease/current-status/us-confirmed-cases-new-world>

Polonia: Fortalece las medidas de bioseguridad ante el riesgo de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad por migraciones de aves silvestres.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 12 de octubre de 2026, el Jefe Veterinario de Polonia advirtió sobre el incremento del riesgo de transmisión de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) asociado con las migraciones otoñales de aves silvestres, por lo que exhortó a los avicultores a reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones comerciales y no comerciales.

Aunque el país se mantiene libre de IAAP, las migraciones de aves acuáticas silvestres, como patos, gansos y cisnes, representan un riesgo de introducción del virus durante las temporadas de otoño e invierno.

De acuerdo con las autoridades veterinarias, la enfermedad puede ocasionar elevada mortalidad en aves de corral, silvestres y en cautiverio. Asimismo, la confirmación de la infección implica el sacrificio de las aves afectadas y la aplicación de restricciones sanitarias que pueden provocar pérdidas temporales de mercados y dificultades para mantener la continuidad de la producción avícola.

Ante el incremento del riesgo, las autoridades recomendaron limitar el contacto de las aves domésticas con las silvestres, evitar el acceso a fuentes de agua compartidas y proteger el alimento y la cama contra la contaminación por aves silvestres, roedores y otros animales. También señalaron la importancia de mantener medidas de higiene del personal, utilizar ropa y calzado de protección, y limpiar y desinfectar las herramientas y equipos empleados en las instalaciones.

Asimismo, se recomendó reforzar la desinfección de los accesos a las granjas mediante alfombras, cubetas u otros sistemas adecuados, así como evitar el ingreso de cadáveres de aves silvestres o de caza a las áreas de crianza. Estas medidas buscan reducir el riesgo de introducción y propagación del virus, especialmente durante el periodo de migración estacional de aves silvestres.

Referencia: Oficina del Jefe de Inspección Veterinaria de Polonia. (12 de octubre de 2026). Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący zagrożenia grypą ptaków w związku z jesiennymi migracjami dzikiego ptactwa.

Recuperado de: <https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-dotyczacy-zagrozenia-grypa-ptakow-w-zwiazku-z-jesiennymi-migracjami-dzikiego-ptactwa-/idn:3250>



Internacional: PANAFTOSA capacita a médicos veterinarios oficiales de Uruguay en vigilancia y respuesta ante la Fiebre Aftosa.



El 13 de octubre de 2026, el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (PANAFTOSA/SPV), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), informó el inicio de una capacitación dirigida a médicos veterinarios oficiales de Uruguay, en cooperación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), con el objetivo de fortalecer las capacidades de prevención, vigilancia, detección temprana y respuesta ante la Fiebre Aftosa. La iniciativa busca mejorar la preparación de los servicios

veterinarios oficiales ante una posible reintroducción del virus.

La capacitación contempla la actualización de conocimientos técnicos, el fortalecimiento de las capacidades operativas y el intercambio de experiencias entre los participantes. Durante la primera sesión, el equipo técnico de PANAFTOSA presentó la estructura, los contenidos y la metodología del curso, como parte de las acciones de cooperación técnica con las autoridades veterinarias uruguayas.

Asimismo, PANAFTOSA destacó que la capacitación continua de los profesionales veterinarios es fundamental para preservar los avances regionales en la prevención y erradicación de la Fiebre Aftosa. En concordancia con los objetivos del Programa Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA), las autoridades señalaron la importancia de mantener sistemas de vigilancia sólidos y capacidades de respuesta oportunas ante posibles emergencias sanitarias.

Finalmente, el curso continuará con actividades virtuales e intercambios técnicos y concluirá con una etapa presencial y práctica del 8 al 10 de diciembre de 2026 en Uruguay, destinada a consolidar los conocimientos adquiridos y reforzar la preparación del servicio veterinario oficial ante una eventual introducción de la enfermedad.

Referencia: Organización Panamericana de la Salud (OPS). (13 de octubre de 2026). PANAFTOSA inicia capacitación en fiebre aftosa para profesionales veterinarios de Uruguay.

Recuperado de: <https://www.paho.org/es/noticias/13-10-2026-panaftosa-inicia-capacitacion-fiebre-aftosa-para-profesionales-veterinarios>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

13 de octubre de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Finlandia: Confirman 15 nuevos casos de Peste Porcina Africana en jabalís. ...	2
Reino Unido: Evalúa el impacto económico de un posible brote de Peste Porcina Africana en Gran Bretaña.	3
Italia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en las regiones de Liguria y Piamonte.....	4

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Finlandia: Confirman 15 nuevos casos de Peste Porcina Africana en jabalís.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 13 de octubre de 2026, la Autoridad Alimentaria de Finlandia informó la detección de 15 nuevos casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalís, algunos de ellos fuera del área central de infección, en las localidades de Lappeenranta, Pyhtää y Virolahti. En Lappeenranta, se confirmó la infección en un jabalí enfermo abatido aproximadamente a cinco kilómetros al noreste del área central vigente, en dirección a dicha localidad, por lo que las autoridades prevén ampliar la zona en los próximos días.

Asimismo, en Pyhtää se encontraron los restos de dos jabalís muertos por PPA, aproximadamente a diez kilómetros al suroeste del sitio donde se localizaron restos de otro ejemplar infectado a finales de agosto. En Virolahti, se confirmó la presencia del virus en los restos de un jabalí hallados fuera del área central, en el mismo sector donde previamente se habían encontrado restos de otro animal infectado.

Los hallazgos fuera del área central evidencian la presencia del virus en sectores adicionales a los delimitados actualmente, por lo que las autoridades mantienen las labores de búsqueda de cadáveres de jabalís para identificar posibles casos y evaluar la distribución de la enfermedad. Estas actividades permiten dar seguimiento a la situación epidemiológica y determinar la extensión de las áreas afectadas.

Finalmente, la Autoridad Alimentaria de Finlandia informó que evalúa la necesidad de ampliar la zona de infección y establecer zonas de restricción adicionales, en función de los resultados de vigilancia y de los nuevos hallazgos. Se prevé que las autoridades proporcionen información complementaria durante la misma semana para definir las medidas territoriales correspondientes.

Referencia: Autoridad Alimentaria de Finlandia. (13 de octubre de 2026). Afrikkalaista sikaruttoa löytyi ydinalueen ulkopuolelta Lappeenrannasta, Pyhtäältä ja Virolahdelta.

Recuperado de: <https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/afrikkalaista-sikaruttoa-loytyi-ydinalueen-ulkopuolelta-lappeenrannasta-pyhtaalta-ja-virolahdelta/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Reino Unido: Evalúa el impacto económico de un posible brote de Peste Porcina Africana en Gran Bretaña.



El 13 de octubre de 2026, el Consejo de Desarrollo de Agricultura y Horticultura (NPA) del Reino Unido informó que encargó a la consultora London Economics una evaluación actualizada del impacto económico que tendría un posible brote de Peste Porcina Africana (PPA) en Gran Bretaña.

La iniciativa busca fortalecer la preparación de la industria porcina británica ante una eventual introducción de la enfermedad y generar evidencia para la colaboración con el Gobierno, las partes interesadas y los socios comerciales.

El estudio tiene como objetivo cuantificar las repercusiones económicas de distintos escenarios de brote, desde casos limitados a jabalís silvestres hasta afectaciones generalizadas en cerdos domésticos de varias regiones. Asimismo, analizará los efectos de los acuerdos de regionalización y la compartimentación en el comercio, el acceso a mercados, los costos de las medidas de control sanitario y los ingresos de los productores.

Como parte de este proceso, el NPA actualizará las evaluaciones de impacto económico realizadas en 2018 y 2020, incorporando los cambios en la situación epidemiológica y comercial, así como las lecciones derivadas de la experiencia reciente de España con la PPA. Además, se elaborará un mapa de la cadena de suministro porcina británica para identificar las posibles repercusiones en productores, procesadores, exportadores y otras empresas vinculadas al sector.

Finalmente, el NPA señaló que el proyecto contempla una visita de estudio a España a principios de 2027 para analizar la gestión del brote, la aplicación de medidas de regionalización, las afectaciones comerciales y las acciones de recuperación. El trabajo inició en septiembre de 2026 y se prevé que el informe final se entregue durante el primer trimestre de 2027, con el propósito de fortalecer la planificación y la capacidad de respuesta de la industria porcina británica ante un posible brote de PPA.

Referencia: Asociación Nacional de Cerdos (NPA). (13 de octubre de 2026). ASF impact assessment commissioned to strengthen preparedness for outbreak.

Recuperado de: <https://nationalpigassociation.co.uk/asf-impact-assessment-commissioned-to-strengthen-preparedness-for-outbreak/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Italia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en las regiones de Liguria y Piamonte.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 11 de octubre de 2026, el Instituto Zooprofiláctico Experimental de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta publicó la actualización de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana (PPA) en las regiones de Piamonte y Liguria, al norte de Italia.

De acuerdo con el reporte, se confirmó un nuevo caso positivo de la enfermedad en jabalís silvestres, localizado en Spigno Monferrato, provincia de Alessandria, en la región de

Piamonte. Con esta detección, el acumulado ascendió a 2,231 casos en jabalís en Italia, de los cuales 836 corresponden a Piamonte y 1,385 a Liguria.

En Liguria no se registraron nuevos casos, por lo que el total regional se mantiene sin cambios. Asimismo, el número de municipios con al menos un caso positivo permanece en 206.

Finalmente, la situación epidemiológica en las explotaciones porcinas permanece estable, al mantenerse en 10 el número de brotes confirmados. Las autoridades continúan con las actividades de vigilancia y seguimiento epidemiológico para monitorear la circulación del virus entre las poblaciones de jabalís silvestres y las explotaciones porcinas.

Referencia: Instituto Zooprofiláctico Experimental de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta. (11 de octubre de 2026). I CONTROLLI PER LA PSA – IN PIEMONTE UN NUOVO POSITIVO TRA I CINGHIALI, DUE IN LIGURIA.

Recuperado de: <https://www.izspltv.it/it/notizie/308-pestes-suina-africana/2452-controlli-psa-26-10-11.html>