



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

14 de octubre de 2026



Monitor Zoosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Serbia: Confirma un caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en un ave silvestre ubicada en el distrito de Južno-Banatski.....	2
Internacional: OMSA destaca la importancia de fortalecer los sistemas de vacunación animal.....	3
Internacional: México y Centroamérica fortalecen la vigilancia regional ante el Gusano Barrenador del Ganado.	4



Serbia: Confirma un caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad subtipo H5N1 en un ave silvestre ubicada en el distrito de Južno-Banatski.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 14 de octubre de 2026, el Ministerio de Agricultura, Forestal y Gestión del Agua de Serbia, realizó una notificación inmediata ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de “Recurrencia de una enfermedad erradicada”, debido a un caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) subtipo H5N1, en un busardo ratonero (*Buteo buteo*) silvestre ubicado en el distrito de Južno-Banatski.

De acuerdo con la información, el evento se encuentra en curso y se especificó lo siguiente:

Distrito	Localidad	Casos	Animales muertos
Južno-Banatski	Mali Rit	1	1

El agente patógeno fue identificado en el laboratorio del Instituto de Especialistas Veterinarios Kraljevo, mediante la prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa de retrotranscripción en tiempo real (rRT-PCR).

Las medidas sanitarias aplicadas fueron: restricción de la movilización, zonificación y vigilancia dentro del área de restricción.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (14 de octubre de 2026). Influenza de tipo A de alta patogenicidad, Serbia.
Recuperado de: <https://wahis.woah.org/#/in-review/7899?fromPage=event-dashboard-url>



Internacional: OMSA destaca la importancia de fortalecer los sistemas de vacunación animal.



En octubre de 2026, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) destacó la importancia de fortalecer los sistemas de vacunación animal mediante la innovación científica, la cooperación internacional y el acceso equitativo a vacunas seguras y eficaces, ante desafíos como el cambio climático, la aparición de enfermedades emergentes y las interrupciones en las cadenas de suministro. En el prólogo de su Revista científica y técnica de 2026, la organización señaló que la vacunación contribuye a la seguridad alimentaria, la salud

pública, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

La publicación aborda seis temas relacionados con la vacunación animal: avances científicos y tecnológicos, acceso equitativo a vacunas, calidad y eficacia de los biológicos, cooperación institucional, toma de decisiones basada en evidencia y contribución al enfoque de Una Salud. Entre las innovaciones destacan las vacunas de ARN mensajero y las vacunas termotolerantes, diseñadas para mantener su eficacia en condiciones donde no es posible garantizar la cadena de frío.

Asimismo, la OMSA advirtió que la desinformación y la pérdida de confianza en las instituciones pueden dificultar la aceptación de la vacunación entre productores y propietarios de animales. También señaló que la eficacia de los programas depende de sistemas de vigilancia epidemiológica, evaluación de riesgos, controles de calidad y cadenas de suministro capaces de garantizar la disponibilidad de los biológicos.

Finalmente, la organización resaltó la necesidad de fortalecer la inversión en los Servicios Veterinarios, la colaboración entre sectores y países, y el acceso oportuno a vacunas y herramientas de diagnóstico. Asimismo, subrayó que la vacunación debe acompañarse de una implementación efectiva, sustentada en la evidencia científica, la confianza y la cooperación, para contribuir al control de enfermedades animales, la prevención de zoonosis y la protección de la salud pública y los ecosistemas.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (1 de octubre de 2026). Foreword – Vaccines in action: building more resilient animal health systems through innovation and cooperation.

Recuperado de: <https://www.woah.org/en/document/foreword-vaccines-in-action-building-more-resilient-animal-health-systems-through-innovation-and-cooperation/>



Internacional: México y Centroamérica fortalecen la vigilancia regional ante el Gusano Barrenador del Ganado.



Imagen representativa de *Cochliomyia hominivorax*.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 14 de octubre de 2026, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de México instalaron el Grupo Técnico Regional del Centro Regional de Inteligencia Sanitaria para el Gusano Barrenador del Ganado (CRIS-GBG), con la participación de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá, para fortalecer la vigilancia y la respuesta coordinada ante la expansión de esta plaga en la región.

Durante la reunión, los representantes de los servicios veterinarios destacaron la importancia de fortalecer los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica, compartir información sanitaria y mejorar el análisis de riesgos para anticipar amenazas y orientar medidas de prevención y control. Asimismo, señalaron que la reintroducción del GBG en Panamá en 2023 y su posterior expansión hacia Centroamérica y Norteamérica evidenciaron la necesidad de mejorar la cooperación regional ante emergencias zoonositarias.

Como parte de las acciones iniciales, se presentó una herramienta de autoevaluación para identificar las capacidades existentes, las principales brechas y las oportunidades de cooperación entre los países. Los resultados permitirán establecer una línea de base regional y definir prioridades de acuerdo con las necesidades y capacidades nacionales, sin sustituir los sistemas sanitarios de cada país.

Finalmente, los participantes acordaron compartir la herramienta de autoevaluación, realizar reuniones técnicas de orientación y organizar un taller regional de planificación para establecer las primeras acciones de implementación del CRIS-GBG. La iniciativa busca fortalecer el intercambio de información, la inteligencia sanitaria y la coordinación entre los países para reducir el impacto del GBG sobre la producción pecuaria y las familias que dependen de esta actividad.

Referencia: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). (14 de octubre de 2026). México y Centroamérica fortalecen respuesta regional frente al Gusano Barrenador del Ganado para proteger la ganadería y a las familias que dependen de ella.

Recuperado de: <https://iica.int/es/prensa/noticias/mexico-y-centroamerica-fortalecen-respuesta-regional-frente-al-gusano-barrenador-del-ganado-para-proteger-la-ganaderia-y-a-las-familias-que-dependen-de-ella/>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

14 de octubre de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Internacional: OMSA publica reporte sobre la situación mundial de la Peste Porcina Africana.....	2
Letonia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en jabalís.....	3
Filipinas: Restringe la movilización de cerdos y productos porcinos en dos localidades de Cagayan por Peste Porcina Africana.	4

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Internacional: OMSA publica reporte sobre la situación mundial de la Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 14 de octubre de 2026, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) publicó el Reporte N° 81 sobre la situación mundial de la Peste Porcina Africana (PPA), correspondiente a septiembre de 2026.

En dicho informe se reportaron 65 nuevos brotes en cerdos domésticos y 170 en jabalís silvestres, que ocasionaron pérdidas de 13,889 animales. Europa concentró la mayor actividad epidemiológica, con 61 brotes en cerdos domésticos y 170 en jabalís, que provocaron 12,958 pérdidas animales. Por su parte, en África se notificó un brote con tres pérdidas, mientras que en Asia y el Pacífico se registraron tres brotes que ocasionaron 928 pérdidas.

Desde enero de 2022, la enfermedad ha sido notificada en 77 países y territorios, acumulando 1,335,598 casos en cerdos domésticos y 55,755 en jabalís silvestres, con pérdidas de 2,899,993 animales en porcinos domésticos. Durante septiembre, Polonia notificó la reaparición de la enfermedad en las regiones de Podlaskie y Lubelskie, mientras que Ucrania reportó un nuevo evento en Jersón. Asimismo, Sudán del Sur notificó por primera vez la presencia de la enfermedad, aunque este evento no se incluyó en las estadísticas del periodo debido a que comenzó en julio de 2026.

En cuanto a la distribución geográfica, aproximadamente el 59 % de los brotes se registró en zonas con una densidad superior a 10 cerdos por kilómetro cuadrado. Además, se notificaron 25 brotes a más de 10 km de áreas previamente afectadas; en Sudáfrica, el brote más distante se localizó aproximadamente a 60 km del área afectada más cercana. Aunque los brotes en cerdos domésticos y fauna silvestre mostraron una tendencia general a la disminución durante 2026, persiste el riesgo de propagación hacia nuevas zonas.

Finalmente, la OMSA destacó la importancia de fortalecer las medidas de bioseguridad, la vigilancia epidemiológica, la detección temprana y la notificación oportuna. Asimismo, señaló que cualquier estrategia de vacunación debe integrarse en un programa que considere la situación epidemiológica local y garantice el uso de vacunas seguras y eficaces conforme a los estándares internacionales.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (14 de octubre de 2026). African swine fever (ASF), Situation Report 81.

Recuperado de: <https://www.woah.org/en/document/african-swine-fever-asf-situation-reports-81/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Letonia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en jabalís.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 12 de octubre de 2026, se publicó la actualización de los casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalís silvestres de Letonia, correspondiente al periodo del 5 al 11 de octubre de 2026.

Durante este periodo, se reportaron 22 jabalís afectados por PPA en distintas localidades del país.

Los casos se distribuyeron de la siguiente manera:

- En el municipio de Dienvidkurzeme se registraron 5 casos, distribuidos en las localidades de Bunka (1 caso), Embūte (1 caso), Priekule (2 casos) y Virga (1 caso).
- En el municipio de Dobele se registraron 5 casos, distribuidos en las localidades de Auri (1 caso), Naudīte (1 caso) y Zebrene (3 casos).
- En el municipio de Kuldīga se registró 1 caso, en la localidad de Skrunda.
- En el municipio de Saldus se registró 1 caso, en la localidad de Zvārde.
- En el municipio de Talsi se registraron 7 casos, distribuidos en las localidades de Balgale (1 caso), Lauciene (3 casos), Lībagi (1 caso), Lube (1 caso) y Mērsrags (1 caso).
- En el municipio de Tukums se registraron 3 casos, distribuidos en las localidades de Pūre (1 caso) y Zentene (2 casos).

En lo que va de 2026, Letonia ha reportado un total de 631 jabalís afectados por PPA, con presencia de la enfermedad en 21 municipios y 99 localidades, lo que evidencia la circulación del virus en poblaciones de jabalís silvestres del país.

Referencia: Servicio Alimentario y Veterinario de Letonia (PVD). (12 de octubre de 2026). Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma hronoloģija meža cūkām Latvijā 2026. Gadā.

Recuperado de: <https://www.pvd.gov.lv/lv/afrikas-cuku-mera-uzliesmojumi-latvija>

Recuperado de: <https://www.pvd.gov.lv/lv/media/10716/download?attachment>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Filipinas: Restringe la movilización de cerdos y productos porcinos en dos localidades de Cagayan por Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 14 de octubre de 2026, la Agencia de Noticias de Filipinas (PNA) informó, a través de su cuenta oficial en la plataforma X, informó que las autoridades del municipio de Lal-lo, en la provincia de Cagayan, establecieron el confinamiento total de las localidades de Cabayabasan y Bacud, tras la detección de un caso de Peste Porcina Africana (PPA) en la primera comunidad.

La medida busca contener la propagación de la enfermedad y proteger la producción porcina local, particularmente la crianza de traspatio, que representa una fuente de sustento para diversas familias.

Como parte de las acciones de control, las autoridades instalaron puntos de vigilancia las 24 horas para reforzar las restricciones al movimiento de cerdos vivos y productos porcinos en las zonas afectadas. Asimismo, el gobierno municipal convocó una sesión especial para reasignar recursos destinados a cubrir las necesidades logísticas y fortalecer las medidas de prevención y control de la enfermedad.

Por su parte, las autoridades exhortaron a los productores a reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones, desinfectar equipos e instalaciones y notificar oportunamente los casos sospechosos a los servicios veterinarios. También solicitaron a la población respetar las disposiciones de cuarentena y evitar el traslado de cerdos y productos porcinos sin la autorización correspondiente, a fin de reducir el riesgo de propagación del virus.

Referencia: Agencia de Noticias de Filipinas (PNA), cuenta oficial de X. (14 de octubre de 2026). 2 villages in Cagayan town placed under total lockdown due to ASF.

Recuperado de: <https://x.com/pnagovph/status/2110324813239628289?s=20>