



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

17 de septiembre de 2026



Contenido

EUA: Michigan confirma primer caso de Virus del Oeste del Nilo en un caballo durante 2026.....	2
España: Nuevo foco de enfermedad de Newcastle en una explotación avícola ubicada en la provincia de Segovia.	3
Internacional: IICA destaca avances de Costa Rica en la prevención y control del Gusano Barrenador del Ganado.	4
Australia: Nuevo evento de Influenza Aviar H5 eleva a 302 los casos en fauna silvestre.....	5
Uruguay: Fortalece medidas de bioseguridad ante casos de Influenza Aviar. 6	



EUA: Michigan confirma primer caso de Virus del Oeste del Nilo en un caballo durante 2026.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 15 de septiembre de 2026, el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan (MDARD) confirmó el primer caso de Virus del Oeste del Nilo (VON) registrado en un animal doméstico durante 2026, correspondiente a una yegua frisona de tres años de edad, procedente del condado de Missaukee. El ejemplar, que se presume no estaba vacunado, responde favorablemente al tratamiento médico.

El VON es una enfermedad viral zoonótica transmitida por la picadura de mosquitos infectados, que puede afectar principalmente a caballos, personas y aves. En Michigan, los casos suelen presentarse entre finales del verano y principios del otoño. Las autoridades señalaron que los mosquitos permanecerán activos hasta que se presente una helada intensa, por lo que recomendaron mantener las medidas de prevención.

Como parte de las acciones de prevención, el MDARD recomendó consultar con un médico veterinario sobre la vacunación de los caballos contra el VON, así como mantener a los animales bajo techo y con ventiladores durante las horas de mayor actividad de los mosquitos. Asimismo, se recomendó eliminar fuentes de agua estancada y utilizar repelentes de insectos aprobados para cada especie.

Finalmente, las autoridades recomendaron consultar con un médico veterinario si los caballos presentan signos como fiebre leve, dificultad para caminar, caídas o problemas para levantarse. El MDARD señaló que el VON no se transmite mediante el contacto directo entre caballos ni de caballos a personas, por lo que la principal medida de prevención consiste en reducir la exposición a mosquitos infectados.

Referencia: Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan (MDARD). (15 de septiembre de 2026). First West Nile Virus-Positive Horse Identified in Missaukee County.

Recuperado de: <https://www.michigan.gov/mdard/about/media/pressreleases/2026/09/15/first-west-nile-virus-positive-horse-identified-in-missaukee-county>



España: Nuevo foco de enfermedad de Newcastle en una explotación avícola ubicada en la provincia de Segovia.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 16 de septiembre de 2026, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España informó la confirmación de un nuevo foco de enfermedad de Newcastle en una explotación de 4,400 pollos de engorda en Fuente el Olmo de Fuentidueña, provincia de Segovia, elevando a 30 el total de focos registrados en Castilla y León.

Las pruebas diagnósticas realizadas por Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) confirmaron la presencia de una cepa velogénica del virus; la explotación presentó

un incremento de mortalidad y signos respiratorios, digestivos y nerviosos.

Ante la detección, los Servicios Veterinarios Oficiales implementaron medidas de control que incluyen la inmovilización de la explotación, investigación epidemiológica, vacío sanitario, eliminación de cadáveres, pienso y otros materiales potencialmente contaminados, así como el establecimiento de una zona de restricción de 3 y 10 kilómetros.

Asimismo, se mantiene la vacunación obligatoria en las explotaciones avícolas de Castilla y León, extendida a toda la comunidad desde el 1 de septiembre de 2026. También se estableció una Zona de Restricción Adicional, donde se aplican controles a los movimientos de aves, vigilancia epidemiológica, evaluación de la bioseguridad y seguimiento de las condiciones de vacunación.

Finalmente, la secuenciación parcial identificó el genotipo VII.2 en el virus circulante en Castilla y León, diferente del genotipo VII.1.1 detectado en Valencia, lo que respalda el descarte de un vínculo epidemiológico entre ambos brotes. El MAPA recomendó reforzar la vigilancia pasiva, las medidas de bioseguridad y los programas de vacunación para limitar la diseminación de la enfermedad.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA). (16 de septiembre de 2026). ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN CASTILLA Y LEÓN.

Recuperado de: https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/noticias-sanidad-animal/documentos-de-noticias/nota-actualizaci-n-newcastle-16_09_26-final.pdf



Internacional: IICA destaca avances de Costa Rica en la prevención y control del Gusano Barrenador del Ganado.



El 16 de septiembre de 2026, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó que Costa Rica compartió avances, experiencias y lecciones aprendidas en la prevención, vigilancia y control del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), durante un foro con representantes de los sectores público, privado, académico, salud y organismos internacionales.

Desde la detección del primer caso en julio de 2023, el país ha acumulado 39,535 casos y 3,154 casos activos, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

Como parte de las acciones de respuesta, el proyecto IICA-APHIS/USDA realizó durante los últimos dos años más de 300 actividades de capacitación, con la participación de más de 8,000 personas, además de 45 eventos de divulgación que alcanzaron a más de 32,000 personas. Estas acciones fortalecieron la vigilancia, el diagnóstico, la atención de casos y la capacitación de productores y personal técnico.

Durante el encuentro se destacó la importancia de la coordinación institucional y la cooperación regional para fortalecer las medidas de control y avanzar posteriormente hacia la erradicación del GBG. Las acciones en Costa Rica involucran al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), IICA, APHIS/USDA, OIRSA, SENASA y otros sectores vinculados con la salud animal, pública y ambiental.

Asimismo, los participantes señalaron que uno de los principales retos es fortalecer la cultura de reporte entre los productores y mantener una respuesta intersectorial bajo el enfoque de Una Salud. El proyecto IICA-APHIS/USDA ha desarrollado más de 1,300 actividades de capacitación en Centroamérica y México, con más de 49,000 personas capacitadas y cerca de medio millón de materiales informativos distribuidos.

Referencia: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). (16 de septiembre de 2026). Costa Rica comparte avances y lecciones aprendidas frente al Gusano Barrenador del Ganado con apoyo de la cooperación regional. Recuperado de: <https://iica.int/es/prensa/noticias/costa-rica-comparte-avances-y-lecciones-aprendidas-frente-al-gusano-barrenador-del-ganado-con-apoyo-de-la-cooperacion-regional/>



Australia: Nuevo evento de Influenza Aviar H5 eleva a 302 los casos en fauna silvestre.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 17 de septiembre de 2026, el Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia Meridional (PIRSA) confirmó un nuevo evento de Influenza Aviar H5 en fauna silvestre, elevando a 302 el total de eventos confirmados en el estado.

La nueva detección correspondió a una gaviota del Pacífico, localizada en Glenelg, en el área metropolitana de Australia Meridional. Asimismo, las autoridades precisaron que el ave reportada previamente como cormorán pío fue identificada posteriormente como un cormorán

carinegro.

De acuerdo con los protocolos nacionales, las autoridades de Australia Meridional reportan las detecciones como eventos y no como animales individuales, por lo que cada evento puede involucrar a uno o más animales. Las nuevas detecciones forman parte de las actividades de vigilancia implementadas para identificar oportunamente la circulación del virus en poblaciones de fauna silvestre.

Hasta el momento, no se han detectado casos de Influenza Aviar H5 en aves de corral ni en otros animales de producción, mientras que el riesgo para la salud humana continúa considerándose bajo. Las autoridades mantienen la vigilancia y la colaboración con los sectores de industrias primarias, fauna silvestre y la comunidad para fortalecer las acciones de preparación y respuesta.

Asimismo, se exhorta a la población a evitar el contacto con aves enfermas o muertas y otros animales silvestres, así como reportar oportunamente estos hallazgos a las autoridades. Desde el 1 de enero de 2026 se han realizado 2,203 pruebas de vigilancia para Influenza Aviar H5 en Australia Meridional.

Referencia: Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia Meridional (PIRSA). (17 de septiembre de 2026). H5 bird flu testing update 17 September.

Recuperado de: <https://pir.sa.gov.au/news/biosecurity/h5-bird-flu-testing-update-17-september>



Uruguay: Fortalece medidas de bioseguridad ante casos de Influenza Aviar.



El 17 de septiembre de 2026, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay exhortó a productores y tenedores de aves a reforzar las medidas de bioseguridad, ante la detección de nuevos casos de Influenza Aviar en la región. La alerta se emitió luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de Argentina confirmara el 16 de septiembre un caso de Influenza Aviar Altamente Patógena H5 en aves de traspatio, en Carlos Spegazzini, provincia de Buenos Aires.

El MGAP señaló que la detección fortalece la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica y la notificación inmediata de casos sospechosos. Entre las medidas recomendadas se encuentran restringir el ingreso de personas y vehículos, reforzar la limpieza y desinfección de instalaciones y equipos, proteger el agua y alimento, y evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres.

Asimismo, se exhortó a los propietarios de aves de traspatio a mantener condiciones adecuadas de higiene y utilizar ropa y calzado exclusivos para las actividades de manejo. La población debe evitar manipular aves enfermas o muertas y reportar mortalidad inusual o signos respiratorios, digestivos y neurológicos a las autoridades sanitarias.

Finalmente, el MGAP indicó que el consumo de carne de ave y huevos no representa un riesgo para la salud humana. Uruguay mantiene el seguimiento de la situación epidemiológica y recomienda la detección temprana y notificación oportuna para prevenir la propagación de la enfermedad.

Referencia: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). (17 de septiembre de 2026). Influenza aviar: MGAP recuerda reforzar las medidas de bioseguridad.

Recuperado de: <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/influenza-aviar-mgap-recuerda-reforzar-medidas-bioseguridad>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

17 de septiembre de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Kenia: Brote de Peste Porcina Africana causa la muerte de más de 1,470 cerdos en Kiambu.....	2
Ucrania: Nuevos casos de Peste Porcina Africana, en cerdos domésticos ubicados en la región de Kherson.	3
España: Confirma nuevo foco de Peste Porcina Africana en jabalís de Cataluña.	4

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Kenia: Brote de Peste Porcina Africana causa la muerte de más de 1,470 cerdos en Kiambu.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 12 de septiembre de 2026, diversos medios de comunicación informaron que las autoridades de Kenia indicaron que un brote de Peste Porcina Africana (PPA) ha provocado la muerte de más de 1,470 cerdos en más de 20 explotaciones del condado de Kiambu desde mediados de mayo, además de registrarse brotes en los condados de Tharaka-Nithi, Busia, Embu, Kakamega, Homa Bay y Migori, incrementando el riesgo de propagación de la enfermedad en el país.

Ante este escenario, el Gobierno de Kenia reforzó las acciones de vigilancia, prevención y respuesta sanitaria, así como el seguimiento de la movilización de cerdos y comunidades pastoriles en zonas fronterizas. En el condado de Tharaka-Nithi, se registraron 108 casos y 97 muertes entre el 5 y el 11 de enero de 2026, evidenciando el impacto de la enfermedad en las poblaciones porcinas afectadas.

Asimismo, las autoridades implementan medidas para reducir el riesgo de dispersión de enfermedades mediante el Protocolo de Trashumancia de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), que establece mecanismos para regular la movilización estacional de ganado entre Kenia y países vecinos. Estas acciones incluyen el fortalecimiento de los controles sanitarios y la coordinación con comunidades fronterizas para favorecer una movilización segura de los animales.

Finalmente, el Gobierno señaló que estas intervenciones buscan contener la propagación de enfermedades y proteger la producción pecuaria y los medios de vida de las comunidades. La PPA constituye una enfermedad de importancia para la producción porcina debido a las elevadas tasas de mortalidad que puede ocasionar y a las pérdidas económicas asociadas, por lo que la vigilancia epidemiológica, la detección oportuna y el control de la movilización son fundamentales para limitar su dispersión.

Referencia: The Standard. (12 de septiembre de 2026). Swine fever kills 1,470 pigs in Kiambu as outbreak spreads to six counties.

Recuperado de: <https://www.standardmedia.co.ke/health/health-science/article/2001557611/swine-fever-kills-1470-pigs-in-kiambu-as-outbreak-spreads-to-six-counties>

Citizen Digital. (12 de septiembre de 2026). Gov't heightens response as African Swine Fever kills 1,470 pigs in Kiambu.

Recuperado de: <https://citizen.digital/article/govt-heightens-response-as-african-swine-fever-kills-1470-pigs-in-kiambu-n390037>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Ucrania: Nuevos casos de Peste Porcina Africana, en cerdos domésticos ubicados en la región de Kherson.



El 16 de septiembre de 2026, el Ministerio de Política Agraria y Alimentaria de Ucrania realizó una notificación inmediata, ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por el motivo de "Recurrencia de una enfermedad erradicada", debido a nuevos casos de Peste Porcina Africana (PPA), en cerdos domésticos ubicados en la región de Kherson.

De acuerdo con el informe, este evento epidemiológico continúa en curso, y se detalló lo siguiente:

Región	Lugar	Animales susceptibles	Casos	Cerdos muertos
Kherson	Myhayliv	6	6	4

El agente patógeno fue identificado en el Laboratorio Regional de Mykolaiv del Servicio Estatal de Ucrania para la Seguridad Alimentaria y la Protección del Consumidor, mediante la prueba diagnóstica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Finalmente, se mencionó que las medidas sanitarias aplicadas fueron: desinfección, zonificación, restricción de la movilización, sacrificio sanitario, cuarentena, vigilancia dentro de la zona de restricción, la eliminación oficial de productos, subproductos y desechos de origen animal.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (16 de septiembre de 2026). Peste Porcina Africana, Ucrania. Recuperado de: <https://wahis.woah.org/#/in-review/7844?fromPage=event-dashboard-url>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



España: Confirma nuevo foco de Peste Porcina Africana en jabalís de Cataluña.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 17 de septiembre de 2026, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España informó la detección de un nuevo foco de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalís silvestres de Cataluña. El foco comprende cinco casos localizados en Barcelona (3) y Molins de Rei (2), identificados mediante restos de cadáveres en el medio. Todos se encuentran en la zona restringida II, dentro del área delimitada por vallados. Con esta actualización, ascienden a 70 los focos notificados, tres primarios y 67 secundarios, con un total de 391 jabalís

positivos en 13 municipios.

Como parte de las acciones de control, las autoridades continúan con la búsqueda de cadáveres y la reducción de la población de jabalís mediante trampas y controles realizados por agentes rurales y cazadores capacitados. Asimismo, se mantienen las medidas de aislamiento y se han reforzado los vallados y otras barreras, especialmente en los corredores utilizados por los animales.

Paralelamente, continúa la vigilancia epidemiológica mediante el análisis de muestras. Hasta la fecha, se han analizado 12,287 animales que resultaron negativos, de los cuales 10,421 correspondieron a ejemplares capturados o abatidos sin sintomatología clínica y 1,866 fueron investigados mediante vigilancia pasiva, incluyendo cadáveres, restos encontrados en el medio natural y animales con sintomatología sospechosa.

En cuanto a las explotaciones porcinas de las zonas restringidas I y II, los Servicios Veterinarios Oficiales mantienen las inspecciones de bioseguridad y la vigilancia pasiva reforzada, sin que se hayan detectado casos positivos en cerdos domésticos. La mayoría de las explotaciones de la zona II se encuentran vacías. El MAPA mantiene un alto nivel de alerta y fortalece las medidas de vigilancia y bioseguridad en las explotaciones porcinas y poblaciones de jabalís de Cataluña y el resto de España.

Referencia: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA). (17 de septiembre de 2026). Actualización de la situación de Peste Porcina Africana en jabalís silvestres en Cataluña.

Recuperado de: <https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/noticias-sanidad-animal/documentos-de-noticias/nota--actualizaci-n-situaci-n-ppa--17-9-26--0.pdf>

Generalitat de Catalunya. (17 de septiembre de 2026). Actualització setmanal de la situació de la pesta porcina africana.

Recuperado de: <https://govern.cat/salaprensa/notes-premsa/868224/actualitzacio-setmanal-situacio-pesta-porcina-africana>