



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

25 de septiembre de 2026



Monitor Zoosanitario

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Italia: La Unión Europea aprueba apoyo financiero para productores afectados por Influenza Aviar y Peste Porcina Africana.	2
EUA: Aves acuáticas podrían estar asociadas con la ocurrencia de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5N1 en aves de corral.	3
Irlanda: Realizará un ejercicio de simulacro ante Fiebre Aftosa.....	4

Italia: La Unión Europea aprueba apoyo financiero para productores afectados por Influenza Aviar y Peste Porcina Africana.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

La Comisión Europea anunció el 25 de septiembre de 2026 la asignación de 73 millones de euros provenientes de la reserva agrícola de la Unión Europea para apoyar a productores italianos afectados por brotes de Influenza Aviar y Peste Porcina Africana (PPA). La medida fue acordada por los Estados miembros y tiene como objetivo compensar las pérdidas derivadas de las acciones sanitarias implementadas para controlar ambas enfermedades.

Del monto total aprobado, 61 millones de euros se destinarán a productores de aves y huevos ubicados en zonas afectadas por brotes de gripe aviar ocurridos entre septiembre de 2022 y marzo de 2025. Por otra parte, 12.5 millones de euros serán asignados a productores del sector porcino afectados por las restricciones aplicadas en áreas con presencia de peste porcina africana entre el 1 de noviembre de 2024 y el 30 de abril de 2025.

La Comisión Europea señaló que los recursos buscan compensar el impacto económico asociado a las medidas de control y prevención implementadas para limitar la propagación de estas enfermedades animales. Los pagos deberán realizarse a los beneficiarios antes de finalizar mayo de 2027.

La decisión fue anunciada en el marco de la visita del comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, a Italia, donde sostuvo reuniones con autoridades del sector agroalimentario y participó en actividades relacionadas con la industria avícola europea. La Comisión indicó que la medida forma parte de los instrumentos de apoyo disponibles para fortalecer la resiliencia de los sectores ganadero y agroalimentario de la Unión Europea.

Referencia:

Comisión Europea (25 de septiembre de 2026). Avian flu and African swine fever: EU provides €73 million to compensate Italian farmers

Recuperado de: https://agriculture.ec.europa.eu/media/news/avian-flu-and-african-swine-fever-eu-provides-eur73-million-compensate-italian-farmers-2026-09-25_en



EUA: Aves acuáticas podrían estar asociadas con la ocurrencia de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5N1 en aves de corral.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 23 de septiembre de 2026 La Revista PLOS ONE publicó un artículo que menciona los resultados de un estudio sobre la distribución espaciotemporal de la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5 en aves acuáticas silvestres y aves de corral comerciales en Estados Unidos, el cual identificó siete posibles vías de transmisión entre ambos grupos durante 2022-2025. Los resultados mostraron que las detecciones en determinadas especies de aves acuáticas coincidieron con brotes en explotaciones comerciales, principalmente de pavos, gallinas

ponedoras y patos.

El estudio analizó 17,091 detecciones de IAAP H5 en aves silvestres registradas en 1,467 ubicaciones de 48 estados contiguos de EE. UU. y el Distrito de Columbia, así como 868 brotes en explotaciones comerciales, de los cuales 532 correspondieron a pavos, 148 a ponedoras de huevo de mesa, 99 a pollos de engorde y 89 a patos. Las cuatro especies de aves acuáticas con mayor número de detecciones fueron el ánade real, ganso canadiense, cerceta ala verde y ganso de las nieves, que en conjunto representaron 39.73 % de las detecciones.

Las posibles vías de transmisión se observaron en distintas regiones y periodos. Entre ellos destacaron la asociación entre ánades reales y brotes en ponedoras y patos en el noreste durante 2022; entre gansos de las nieves y brotes en pavos en el Medio Oeste Superior; y entre gansos canadienses y brotes de pavos en las regiones del Pacífico y Oeste de las Montañas.

Los autores señalan que estas asociaciones espacio-temporales podrían ser indicativas de posibles vías de transmisión, pero no demuestran por sí mismas una transmisión directa, debido a que el estudio no contó con datos genómicos o filogenéticos que permitieran confirmar las rutas de transmisión. No obstante, los hallazgos respaldan el uso de la vigilancia de aves acuáticas silvestres como posible sistema de alerta temprana y recomiendan adaptar las medidas de bioseguridad de las explotaciones avícolas a las especies presentes, las rutas migratorias y las zonas de mayor riesgo.

Referencia: Varga C (2026) Spatiotemporal clustering of highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 at the wild waterfowl-poultry interface: Vector-specific spillover risks in the U.S., 2022-2025. PLoS One 21(9): e0345354. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0345354>



Irlanda: Realizará un ejercicio de simulacro ante Fiebre Aftosa.




Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com>

El 24 de septiembre de 2026, la Delegada de Irlanda ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y Jefa de los Servicios Veterinarios de Irlanda, Dra. June Fanning, informó que el 1 de octubre de 2026 se llevará a cabo un ejercicio de simulacro teórico sobre Fiebre Aftosa en Backweston, condado de Kildare, organizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Marítimos, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta del país ante un eventual brote de la enfermedad.

El ejercicio tendrá como principales objetivos revisar las funciones, responsabilidades, líneas jerárquicas y medidas inmediatas que deberán adoptarse tras la identificación de una sospecha de fiebre aftosa, así como evaluar los procedimientos, la toma de decisiones y las acciones necesarias para gestionar un caso confirmado de la enfermedad.

Asimismo, se revisará la manera en que se identifican, movilizan y asignan los recursos humanos necesarios para la respuesta, además de la toma de decisiones y el plan de acción para la despoblación de animales susceptibles después de la confirmación de un caso.

Finalmente, el simulacro permitirá analizar la capacidad y los métodos disponibles para la eliminación de cadáveres, subproductos animales y materiales contaminados generados durante una respuesta ante un evento de Fiebre Aftosa, con el propósito de fortalecer la preparación y coordinación de las autoridades veterinarias ante una eventual emergencia sanitaria.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (24 de septiembre de 2026). Ejercicio de simulacro: Fiebre Aftosa en Irlanda.

Recuperado de: <https://www.woah.org/app/uploads/2026/09/20261001-irl.pdf>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

25 de septiembre de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

España: Actualización de la situación de Peste Porcina Africana en jabalíes silvestres de Barcelona y Sant Cugat del Vallès, Cataluña2

Polonia: Notifica un foco de Peste Porcina Africana en cerdos domésticos de Sejny, Podlaskie3

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



España: Actualización de la situación de Peste Porcina Africana en jabalíes silvestres de Barcelona y Sant Cugat del Vallès, Cataluña.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

Los Servicios Veterinarios Oficiales de España informaron, el 24 de septiembre de 2026, la detección de un nuevo foco de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes silvestres, integrado por cinco casos identificados en los municipios de Barcelona (cuatro casos) y Sant Cugat del Vallès (un caso). Todos los casos fueron localizados dentro de la Zona Restringida II, en el área delimitada por los vallados perimetrales establecidos para el control de la enfermedad.

Con esta notificación, el número acumulado de focos en fauna silvestre asciende a 71, de los cuales tres corresponden a focos primarios y 68 a focos secundarios. En total, se han confirmado 396 jabalíes positivos distribuidos en 13 municipios de Cataluña.

Los municipios con detecciones de PPA son Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Sabadell, El Papiol, Castellbisbal y Esplugues de Llobregat.

Las autoridades informaron además que se han analizado 12,740 jabalíes con resultado negativo a PPA. De éstos, 10,845 correspondieron a animales capturados o abatidos sin signos clínicos, mientras que 1,895 fueron examinados mediante vigilancia pasiva, incluyendo cadáveres, restos hallados en el medio natural y animales abatidos con sintomatología compatible.

De manera paralela, continúan las actividades de vigilancia y control en las zonas restringidas, incluyendo la búsqueda de cadáveres de jabalíes, las acciones de reducción poblacional, el mantenimiento y refuerzo de vallados, así como la supervisión de medidas de bioseguridad en establecimientos porcinos. Hasta la fecha, no se han detectado casos de PPA en cerdos domésticos en las zonas sujetas a restricción.

Referencia: Servicios Veterinarios Oficiales de España (24 de septiembre de 2026). Actualización de la situación de Peste Porcina Africana en jabalíes silvestres en Cataluña.

Recuperado de: <https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Polonia: Notifica un foco de Peste Porcina Africana en cerdos domésticos de Sejny, Podlaskie.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) publicó el 25 de septiembre de 2026 la notificación realizada por Polonia de un nuevo foco de Peste Porcina Africana (PPA) en una explotación de cerdos domésticos ubicada en el municipio rural de Sejny, en la provincia de Podlaskie. El evento fue confirmado el 17 de septiembre de 2026 y fue reportado como una recurrencia de una enfermedad previamente erradicada en la población afectada.

La sospecha se originó tras la detección de mortalidad en la explotación, donde se tomaron muestras de una cerda, un cerdo de engorda y un lechón destetado el 16 de septiembre. Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Investigación Veterinaria (NVRI) confirmaron la presencia del virus mediante PCR en tiempo real.

La explotación afectada albergaba 550 cerdos, todos considerados casos dentro de la unidad epidemiológica afectada, registrándose 22 animales muertos al momento de la notificación. Las autoridades indicaron que el origen de la infección permanece desconocido o no ha sido determinado de forma concluyente.

Como parte de la respuesta sanitaria, se implementaron medidas de control que incluyen restricción de movimientos, zonificación, sacrificio sanitario, desinfección, control de vectores y eliminación oficial de animales, productos y subproductos de origen animal.

El evento permanece abierto y bajo seguimiento de los servicios veterinarios oficiales de Polonia, que continúan las investigaciones epidemiológicas para determinar la fuente de introducción del virus y evitar su propagación a otras explotaciones porcinas.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (25 de septiembre de 2026). Pol 25/09/26-African swine fever virus (Inf. with) /Peste porcine africaine/Peste Porcina Africana.

Recuperado de:
<https://wahis.woah.org/#/in-review/7853>