



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

28 de septiembre de 2026



Contenido

Internacional: OMSA reporta 6,943 brotes de enfermedades en fauna silvestre durante el primer trimestre de 2026.	2
Reino Unido: Confirma Virus Shamonda en ganado bovino ubicado en Jersey.	3
Australia: Nuevo evento de Influenza Aviar H5 en una gaviota plateada ubicada en la región Murray y Mallee.	4
Dinamarca: Evalúa como muy bajo el riesgo de introducción del Virus del Oeste del Nilo en equinos.	5



Internacional: OMSA reporta 6,943 brotes de enfermedades en fauna silvestre durante el primer trimestre de 2026.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 25 de septiembre de 2026, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) informó que durante el primer trimestre de 2026 se registraron 6,943 brotes y 10,359 casos de enfermedades incluidas en la lista de vigilancia en fauna silvestre, notificados por 55 países y territorios. Los eventos correspondieron a 11 enfermedades detectadas en 152 especies silvestres, de las cuales la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) y la Peste Porcina Africana (PPA) concentraron el 92,8 % de los brotes.

La IAAP registró el mayor número de brotes, con 3,255 eventos, seguida de la PPA con 3,188, principalmente en Europa. Asimismo, la Fiebre Porcina Clásica (FPC) presentó 451 brotes, asociados principalmente con poblaciones de jabalís silvestres en Asia y el Pacífico.

En materia de biodiversidad, se notificaron afectaciones en 19 especies silvestres clasificadas como amenazadas por la UICN, de las cuales 18 fueron afectadas por IAAP. Entre estas se incluyeron especies clasificadas como En Peligro, sin registrarse afectaciones en especies En Peligro Crítico.

Respecto a la sanidad animal, 3,187 de los 3,188 brotes de PPA correspondieron a jabalís silvestres en Europa, mientras que la PPC reforzó la importancia de la vigilancia en la interfaz entre fauna silvestre y animales domésticos. Asimismo, cinco de las enfermedades reportadas presentan carácter zoonótico, entre ellas IAAP, Rabia, Virus del Oeste del Nilo (VON) y *Brucella suis*.

La OMSA destacó que la vigilancia sanitaria de la fauna silvestre es esencial para la detección temprana y la gestión de riesgos bajo el enfoque de Una Salud, debido a la interacción entre enfermedades emergentes, conservación de la biodiversidad, producción pecuaria y salud pública. El análisis temporal evidenció un incremento de los eventos durante los meses invernales, con un máximo aproximado de 2,900 brotes en febrero de 2026, impulsado principalmente por la IAAP.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (25 de septiembre de 2026). Wildlife Disease – Situation Report Q1 2026.

Recuperado de: <https://www.woah.org/en/document/wildlife-disease-situation-report-q4-2026/>



Reino Unido: Confirma Virus Shamonda en ganado bovino ubicado en Jersey.



Imagen representativa de una de las especies involucradas.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 24 de septiembre de 2026, la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal del Reino Unido (APHA) informó la detección del virus Shamonda (SHAV) en ganado bovino de la isla de Jersey, confirmando la presencia del virus en las Islas Británicas y destacando el potencial de propagación hacia el noroeste de Europa.

La detección se realizó en agosto de 2026 en bovinos que presentaban signos clínicos similares a los registrados en otros países europeos, donde el virus emergente ha sido identificado durante el presente año. El SHAV pertenece al mismo grupo de virus que el virus de Schmallenberg (SBV) y se considera que su principal vía de transmisión está asociada con mosquitos picadores del género *Culicoides*.

En bovinos, la infección puede ocasionar fiebre, diarrea, letargo, disminución de la producción de leche y abortos, además de posibles alteraciones congénitas cuando la infección ocurre durante la gestación.

Asimismo, el SHAV ha sido detectado en ovinos, caprinos, alpacas y equinos en diferentes países europeos. En caballos se han identificado casos con signos neurológicos en Alemania y Suiza, situación de importancia para la vigilancia sanitaria debido a que algunas manifestaciones pueden ser similares a las observadas en enfermedades equinas de declaración obligatoria, como el Virus del Oeste del Nilo (VON). Ante esta situación, la APHA mantiene investigaciones con autoridades nacionales e internacionales para mejorar el conocimiento sobre la distribución, comportamiento epidemiológico e impacto sanitario del virus.

Aunque el SHAV no es una enfermedad de declaración obligatoria en el Reino Unido, la autoridad dispone de pruebas diagnósticas para apoyar la investigación de casos sospechosos y recomienda evaluar a bovinos y equinos que presenten signos clínicos compatibles, debido a la posibilidad de confusión con otras enfermedades endémicas o exóticas.

Las autoridades británicas continúan con la vigilancia epidemiológica debido al carácter emergente del virus, su posible dispersión mediante vectores *Culicoides* y la necesidad de determinar su impacto en la sanidad ganadera y equina de Europa.

Referencia: Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHA) de Reino Unido. (24 de septiembre de 2026). Emerging Shamonda virus detected in Jersey.

Recuperado de: <https://www.gov.uk/government/news/emerging-shamonda-virus-detected-in-jersey>



Australia: Nuevo evento de Influenza Aviar H5 en una gaviota plateada ubicada en la región Murray y Mallee.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 27 de septiembre de 2026, el Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia Meridional (PIRSA) confirmó un nuevo evento de Influenza Aviar H5 en fauna silvestre, elevando a 321 el total de eventos confirmados en el estado.

La nueva detección correspondió a una gaviota plateada (*Chroicocephalus novaehollandiae*), localizada en Meningie, en la región Murray y Mallee de Australia Meridional. De acuerdo con los protocolos nacionales, las autoridades reportan las detecciones como eventos y no como

animales individuales, por lo que cada evento puede involucrar a uno o más animales.

Hasta el momento, no se han detectado casos de Influenza Aviar H5 en aves de corral ni en otros animales de producción, mientras que el riesgo para la salud humana continúa considerándose bajo. Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y la coordinación con los sectores de industrias primarias, fauna silvestre y la comunidad para fortalecer las acciones de preparación y respuesta.

Asimismo, se exhorta a la población a evitar el contacto con aves enfermas o muertas y otros animales silvestres, así como reportar oportunamente estos hallazgos a las autoridades. El Gobierno de Australia Meridional mantiene disponible un mapa interactivo con información actualizada sobre la ubicación de los eventos y las especies afectadas.

Referencia: Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia Meridional (PIRSA). (27 de septiembre de 2026). H5 bird flu testing update 27 September.

Recuperado de: <https://pir.sa.gov.au/news/biosecurity/h5-bird-flu-testing-update-27-september>



Dinamarca: Evalúa como muy bajo el riesgo de introducción del Virus del Oeste del Nilo en equinos.



Imagen representativa de la especie afectada
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 25 de septiembre de 2026, la Autoridad Danesa de Seguridad Alimentaria de Dinamarca publicó una evaluación en la que determinó que la probabilidad de introducción del virus de la Virus del Oeste del Nilo (VON) en las explotaciones equinas danesas es muy baja, pese a los brotes registrados en Alemania, debido al descenso de las temperaturas y a la proximidad del final de la temporada de transmisión.

El informe señala que, entre mayo y el 18 de septiembre de 2026, Alemania registró siete brotes en caballos y ocho en aves, de los cuales dos se detectaron aproximadamente a 75 km de la frontera danesa. Asimismo, en Europa se notificaron 242 brotes en caballos y 392 en aves, principalmente en Francia e Italia para los primeros y en Italia y Bélgica para los segundos.

La autoridad danesa destacó que, aunque se han identificado anticuerpos contra el virus en aves y caballos, hasta el momento no se ha detectado su presencia en Dinamarca. No obstante, advirtió que su expansión geográfica en Europa podría incrementar el riesgo de introducción durante los próximos años.

Ante este escenario, recomendó a los propietarios de caballos que viajen a zonas afectadas consultar con sus veterinarios sobre la vacunación preventiva y adoptar medidas de protección contra las picaduras de mosquitos. Además, informó que mantendrá la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de la situación en Alemania para actualizar su evaluación de riesgo cuando sea necesario.

Referencia: Autoridad Danesa de Seguridad Alimentaria de Dinamarca. (25 de septiembre de 2026). Trusselsvurdering for West Nile Fever (WNF) i Danmark pr. 18. september 2026 efter situationen i Tyskland.

Recuperado de: <https://foedevarestyrelsen.dk/nyheder/faglige-nyheder/2026/sep/trusselsvurdering-for-west-nile-fever-wnf-pr-18-september-2026-efter-situationen-i-tyskland>

Recuperado de:

[https://foedevarestyrelsen.dk/Media/639259148602022414/Trusselsvurdering%20for%20West%20Nile%20Fever%20\(WNF\)%20pr.%2018.%20september%202026%20efter%20situationen%20i%20Tyskland.pdf](https://foedevarestyrelsen.dk/Media/639259148602022414/Trusselsvurdering%20for%20West%20Nile%20Fever%20(WNF)%20pr.%2018.%20september%202026%20efter%20situationen%20i%20Tyskland.pdf)



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

28 de septiembre de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Finlandia: Confirma virus de la Peste Porcina Africana en jabalís de Miehikkälä.	2
Italia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en las regiones de Liguria y Piamonte.....	3
Letonia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en jabalís.....	4

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Finlandia: Confirma virus de la Peste Porcina Africana en jabalís de Miehkälä.



Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

Entre el 24 y el 25 de septiembre de 2026, la Autoridad Alimentaria de Finlandia informó la actualización de la zona de infección por el virus de la Peste Porcina Africana (PPA), mediante la ampliación hacia el noreste de la zona central para incluir parte del sureste de Lappeenranta, debido a la detección de un jabalí encontrado muerto en Hujakkala, el 21 de septiembre. Asimismo, se confirmó un nuevo caso de PPA en un jabalí adulto encontrado muerto en Miehkälä, correspondiente al segundo hallazgo registrado en esta región.

La ampliación de la zona de infección responde a la presencia de casos de PPA en jabalís y al desplazamiento de estos animales principalmente hacia el noreste, en dirección a la frontera. Las autoridades consideran necesario ajustar las medidas de control de acuerdo con la evolución de la situación epidemiológica y la distribución de los animales infectados.

Como parte de las modificaciones, se flexibilizaron algunas restricciones dentro de la zona central, permitiendo actividades forestales y de desmonte con maquinaria, así como la recolección de hongos y frutos silvestres, desplazamientos fuera de carretera y paseos con perros, siempre bajo medidas específicas de bioseguridad, limpieza y desinfección. Estas disposiciones buscan reducir el riesgo de dispersión del virus durante las actividades realizadas en las áreas afectadas.

Finalmente, se mantienen prohibidas la caza y la realización de eventos públicos, deportivos y caninos en la zona de infección. Las autoridades mantienen la vigilancia y las acciones de control de la población de jabalís, debido a que el virus permanece ampliamente distribuido en las zonas rurales afectadas.

Referencia: Autoridad Alimentaria de Finlandia. (24 de septiembre de 2026). Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee ja rajoitukset muuttuvat.

Recuperado de: <https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/afrikkalaisen-sikaruton-tartuntavyohykkeen-ydinalue-laajenee-ja-rajoitukset-muuttuvat/>

Autoridad Alimentaria de Finlandia. (25 de septiembre de 2026). Miehkälästä löytyi jälleen afrikkalaista sikaruttoa.

Recuperado de: <https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/miehkalaista-loytyi-jalleen-afrikkalaista-sikaruttoa/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Italia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en las regiones de Liguria y Piamonte.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 27 de septiembre de 2026, el Instituto Zooprofiláctico Experimental de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta publicó la actualización de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana (PPA) en las regiones de Piamonte y Liguria, al norte de Italia.

De acuerdo con el reporte, se confirmaron tres nuevos casos positivos de la enfermedad en jabalís silvestres, dos localizados en Liguria y uno en Piamonte. Con estas detecciones, el

acumulado ascendió a 2,220 casos en jabalís, de los cuales 835 corresponden a Piamonte y 1,385 a Liguria.

En Liguria se registraron nuevos casos en Serra Riccò, provincia de Génova, y Mioglia, provincia de Savona, mientras que en Piamonte se confirmó un caso en Pezzolo Valle Uzzone, provincia de Cuneo. Asimismo, el número de municipios con al menos un caso positivo se mantiene en 206.

Finalmente, la situación epidemiológica en las explotaciones porcinas permanece estable, al mantenerse en 10 el número de brotes confirmados. Las autoridades continúan con las actividades de vigilancia y seguimiento epidemiológico para monitorear la circulación del virus entre las poblaciones de jabalís silvestres.

Referencia: Instituto Zooprofiláctico Experimental de Piamonte, Liguria y Valle d'Aosta. (27 de septiembre de 2026). I CONTROLLI PER LA PSA – IN PIEMONTE UN NUOVO POSITIVO TRA I CINGHIALI, DUE IN LIGURIA.

Recuperado de: <https://www.izspltv.it/it/notizie/308-pesto-suina-africana/2441-controlli-psa-26-09-27.html>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Letonia: Situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en jabalís.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 28 de septiembre de 2026, se publicó la actualización de los casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalís silvestres de Letonia, correspondiente al periodo del 21 al 27 de septiembre de 2026.

Durante este periodo, se reportaron 14 jabalís afectados por PPA en distintas localidades del país.

Los casos se distribuyeron de la siguiente manera:

- En el municipio de Augšdaugava se registró 1 caso, en la localidad de Ambelū.
- En el municipio de Dienvidkurzeme se registraron 6 casos, distribuidos en las localidades de Bunkas (1 caso), Embūtes (1 caso) y Priekules (4 casos).
- En el municipio de Talsi se registraron 4 casos, distribuidos en las localidades de Balgales (1 caso), Laucienes (2 casos) y Lībagu (1 caso).
- En el municipio de Tukums se registraron 2 casos, en las localidades de Smārdes (1 caso) y Zentenes (1 caso).
- En el municipio de Ventspils se registró 1 caso, en la localidad de Tārgales.

En lo que va de 2026, Letonia ha reportado un total de 594 jabalís afectados por PPA, con presencia de la enfermedad en 21 municipios y 99 localidades, lo que evidencia la circulación del virus en poblaciones de jabalís silvestres del país.

Referencia: Servicio Alimentario y Veterinario de Letonia (PVD). (28 de septiembre de 2026). Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma hronoloģija meža cūkām Latvijā 2026. Gadā.

Recuperado de: <https://www.pvd.gov.lv/lv/afrikas-cuku-mera-uzliesmojumi-latvija>

Recuperado de: <https://www.pvd.gov.lv/lv/media/10647/download?attachment>