



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural




SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Zoosanitario

29 de septiembre de 2026



Monitor Zoonosario

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Reino Unido: Expansión del virus Shamonda y detección de afectaciones reproductivas.	2
Internacional: FAO reconoce programa comunitario para la prevención de zoonosis.	3
Egipto: Realizará simulacros de preparación ante Fiebre del Valle del Rift y Fiebre Aftosa.	4
EUA: Amplían restricciones de importación por Fiebre Aftosa en Namibia.....	5



Reino Unido: Expansión del virus Shamonda y detección de afectaciones reproductivas.



El 27 de septiembre de 2026, el sitio especializado en información y análisis sobre sanidad animal y epidemiología veterinaria Vetitude informó que el virus Shamonda (SHAV) se ha extendido en Europa, con detecciones en Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria, Liechtenstein, Italia, España y la isla de Jersey. El virus ha sido identificado principalmente en bovinos, aunque también se han registrado infecciones en ovinos, caprinos, alpacas y equinos, ampliándose el conocimiento sobre las especies susceptibles.

En bovinos adultos, la infección se ha asociado principalmente con fiebre, diarrea, letargo y disminución de la producción de leche. Asimismo, en Europa se han identificado dos variantes genéticamente diferenciadas, denominadas SHAV-EU1 y SHAV-EU2, cuya distribución sugiere la ocurrencia de al menos dos eventos independientes de introducción y dispersión del virus.

Durante septiembre, la vigilancia epidemiológica se ha enfocado cada vez más en las posibles consecuencias de la infección durante la gestación. El virus fue detectado en fetos bovinos abortados en Suiza y Bélgica, así como en corderos con anomalías congénitas en Francia y en un becerro recién nacido con alteraciones congénitas en Países Bajos, hallazgos que apoyan la posibilidad de transmisión transplacentaria.

Asimismo, se han identificado casos de infección en equinos con signos neurológicos en Alemania y Suiza; sin embargo, aún se requieren investigaciones para determinar la relación entre la infección por SHAV y estas manifestaciones clínicas. La presencia del virus en diferentes especies y países ha incrementado la vigilancia sobre su distribución y comportamiento epidemiológico.

Ante estos hallazgos, diversos países europeos han reforzado la vigilancia de abortos, animales recién nacidos débiles y casos con anomalías congénitas. Aunque la disminución estacional de la actividad de los vectores del género *Culicoides* podría reducir las nuevas infecciones durante el otoño, las consecuencias de las infecciones adquiridas durante el verano podrían manifestarse durante los siguientes meses, por lo que será importante continuar con la vigilancia epidemiológica para determinar el impacto reproductivo del virus Shamonda.

Referencia: Vetitude. (27 de septiembre de 2026). Shamonda virus spreads across Europe as concern shifts towards fetal infection and congenital disease.

Recuperado de: <https://vetitude.org/outbreaks/shamonda-virus-spreads-across-europe-as-concern-shifts-towards-fetal-infection-and-congenital-disease>



Internacional: FAO reconoce programa comunitario para la prevención de zoonosis.



Imagen representativa de las especies involucradas.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 29 de septiembre de 2026, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció el programa Zoonosis Cadre de Indonesia por su contribución a la prevención comunitaria de enfermedades zoonóticas y la promoción del enfoque Una Salud.

La iniciativa cuenta actualmente con 5,292 voluntarios capacitados para apoyar la prevención y el control de zoonosis en 502 aldeas de seis provincias y 22 distritos o ciudades del país.

El programa, desarrollado inicialmente para fortalecer la prevención y control de la rabia, ha ampliado sus actividades para abordar otras enfermedades zoonóticas prioritarias, entre ellas la gripe aviar, el ántrax, la brucelosis y la leptospirosis. Los coordinadores reciben capacitación para sensibilizar a la población, identificar riesgos sanitarios, promover la notificación oportuna de casos y facilitar la comunicación entre las comunidades y las autoridades competentes.

Asimismo, la iniciativa integra la participación de propietarios de animales, líderes comunitarios, funcionarios de aldeas, personal de salud y otros sectores, fortaleciendo la coordinación entre los servicios de salud animal y humana, gobiernos locales, instituciones académicas y comunidades. Esta colaboración busca mejorar la identificación temprana de riesgos y la capacidad de respuesta ante enfermedades zoonóticas.

Finalmente, la FAO destacó que la experiencia de Indonesia demuestra la importancia de incorporar a las comunidades en las acciones de prevención y control de zoonosis. El reconocimiento busca impulsar la aplicación del enfoque Una Salud mediante una mayor colaboración multisectorial y el fortalecimiento de capacidades comunitarias para contribuir a sistemas de salud más resilientes y a la prevención de enfermedades zoonóticas.

Referencia: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (29 de septiembre de 2026). FAO recognizes Indonesia's zoonosis cadre programme for advancing One Health.

Recuperado de: <https://www.fao.org/indonesia/news/detail/fao-recognizes-indonesia-s-zoonosis-cadre-programme-for-advancing-one-health/en>



Egipto: Realizará simulacros de preparación ante Fiebre del Valle del Rift y Fiebre Aftosa.



Imagen representativa de una de las especies involucradas.
Créditos: <https://www.istockphoto.com>

El 18 de septiembre de 2026, el Departamento de Información de Sanidad Animal Mundial de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) informó que, el 4 de octubre de 2026, se llevarán a cabo en El Cairo, Egipto, dos ejercicios nacionales de simulacro para evaluar la capacidad de preparación y respuesta ante escenarios de Fiebre del Valle del Rift y Fiebre Aftosa (FA).

Los ejercicios serán organizados por la Oficina de la FAO en Egipto y la Oficina Regional de la FAO, y contarán con la participación aproximada de 50 representantes, incluyendo tomadores de decisiones, personal técnico de los servicios veterinarios, especialistas en epidemiología, comunicación, medicina preventiva y cuarentena fronteriza, equipos de respuesta en campo, observadores técnicos internacionales y representantes de los sectores de salud pública y medio ambiente.

El simulacro de Fiebre del Valle del Rift tiene como objetivo evaluar la preparación nacional ante una posible reaparición de la enfermedad después de un periodo prolongado sin brotes desde 2004, fortaleciendo la coordinación bajo el enfoque “Una Salud”, la vigilancia integrada mediante monitoreo serológico en ganado, seguimiento de vectores y uso de indicadores climáticos, así como la comunicación de riesgos zoonóticos y los protocolos de control de movimientos animales y vectores.

Por su parte, el ejercicio de FA busca evaluar los planes de contingencia, sistemas de vigilancia y notificación, capacidades diagnósticas de laboratorio, procedimientos de investigación epidemiológica y medidas de respuesta ante una posible introducción o dispersión del virus, considerando los riesgos asociados al movimiento de ganado y la circulación de nuevas cepas virales.

Los principales resultados esperados incluyen la identificación de brechas en los sistemas nacionales de vigilancia y respuesta, actualización de procedimientos operativos, fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, mejora de los mecanismos de alerta temprana y elaboración de recomendaciones para incrementar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias animales.

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (18 de septiembre de 2026). Ejercicio de simulacro: Fiebre aftosa en Egipto.

Recuperado de: <https://www.woah.org/app/uploads/2026/09/20261004-egy-fmd.pdf>

Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (18 de septiembre de 2026). Ejercicio de simulacro: Fiebre del valle del Rift en Egipto.

Recuperado de: <https://www.woah.org/app/uploads/2026/09/20261004-egy-rvf.pdf>



EUA: Amplían restricciones de importación por Fiebre Aftosa en Namibia.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com>

El 29 de septiembre de 2026, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) actualizó su alerta de importación relacionada con la Fiebre Aftosa (FA) en Namibia, debido a la confirmación de la enfermedad en ganado bovino doméstico en una región que previamente era reconocida como libre. A partir del 23 de septiembre, APHIS extendió temporalmente las restricciones de importación a todo el territorio de Namibia y las mantendrá vigentes hasta nuevo aviso.

Con esta actualización, APHIS prohibió la importación de rumiantes, camélidos, cerdos, erizos, tenrecs y su germoplasma procedentes de Namibia o que transiten por dicho país. Asimismo, estableció requisitos específicos para el ingreso de caballos y perros, así como medidas adicionales de bioseguridad para los animales que hayan tenido contacto con especies susceptibles a la enfermedad.

En cuanto a los productos y subproductos de porcinos, rumiantes, camélidos, erizos y tenrecs, incluidos los productos lácteos, APHIS estableció requisitos de tratamiento, certificación y permisos de importación. Los productos procesados podrán ingresar cuando cumplan las condiciones sanitarias establecidas, mientras que determinados productos sin procesar permanecen prohibidos o sujetos a restricciones específicas.

Finalmente, APHIS señaló que las medidas aplicables a los animales y productos de origen animal procedentes de Namibia permanecerán vigentes mientras se evalúe la situación sanitaria del país. Estas acciones buscan reducir el riesgo de introducción y propagación del virus de la Fiebre Aftosa en Estados Unidos.

Referencia: Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS). (29 de septiembre de 2026). Import Alert: Foot-and-Mouth Disease Restrictions for Animal Commodities Originating from or Transiting Namibia.

Recuperado de: <https://content.govdelivery.com/accounts/USDAAPHIS/bulletins/42d0b2b?reqfrom=share>



Gobierno de
México

Agricultura

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Monitor Peste Porcina Africana

29 de septiembre de 2026



Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Contenido

Internacional: IICA y USDA-APHIS fortalecen cooperación para enfrentar la Peste Porcina Africana en el Caribe.	2
EUA: Estudio analiza la distribución y propagación de Peste Porcina Africana en Filipinas.....	3
Italia: Actualización de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en el país.....	4

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



Internacional: IICA y USDA-APHIS fortalecen cooperación para enfrentar la Peste Porcina Africana en el Caribe.



Imagen representativa de productos y especie afectada
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 29 de septiembre de 2026, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó que, durante la Semana de la Agricultura del Caribe, en Jamaica, reforzó con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-APHIS) la cooperación para prevenir y enfrentar enfermedades transfronterizas, con énfasis en la Peste Porcina Africana (PPA) y el Gusano Barrenador del Nuevo Mundo.

Durante la reunión, representantes del IICA y USDA-APHIS revisaron la agenda sanitaria del hemisferio, particularmente los riesgos asociados con enfermedades transfronterizas en el Caribe, y destacaron la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de los países de la región.

Asimismo, el IICA reafirmó su compromiso de apoyar acciones de prevención y respuesta ante la PPA, mediante el fortalecimiento de la cooperación regional y de las capacidades sanitarias para reducir los riesgos de propagación de enfermedades que pueden afectar la producción porcina, la seguridad alimentaria y el comercio.

La iniciativa se desarrolla en el marco de los esfuerzos regionales para fortalecer la resiliencia de los sistemas agroalimentarios del Caribe, mediante mayor cooperación, innovación y acceso a ciencia y tecnología.

Referencia: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). (29 de septiembre de 2026). En Jamaica, durante el mayor foro de la agricultura del Caribe, Director General del IICA promueve junto a ministros acceso a ciencia y tecnología en la región y trata con EEUU prevención de pestes y enfermedades.

Recuperado de: <https://iica.int/es/prensa/noticias/en-jamaica-durante-el-mayor-foro-de-la-agricultura-del-caribe-director-general-del-iica-promueve-junto-a-ministros-acceso-a-ciencia-y-tecnologia-en-la-region-y-trata-con-eeuu-prevencion-de-pestes-y/>

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE



EUA: Estudio analiza la distribución y propagación de Peste Porcina Africana en Filipinas.



El 28 de septiembre de 2026, la revista científica *Frontiers in Veterinary Science* publicó un estudio epidemiológico sobre la distribución de la Peste Porcina Africana (PPA) en Filipinas, en el que se identificaron diferencias en la presencia y propagación de la enfermedad entre las principales regiones insulares del país.

Entre octubre de 2022 y octubre de 2024, se analizaron 8,213 eventos de PPA y se identificaron 12 zonas donde los casos se concentraron durante determinados periodos,

algunas con una extensión de hasta 183.2 kilómetros. Luzón registró el mayor número de reportes, con 52.10%, seguida de Visayas, con 31.69%, y Mindanao, con 16.21%; sin embargo, al considerar la población porcina, se observaron mayores niveles de afectación en provincias insulares como Oriental Mindoro, Dinagat Islands y Occidental Mindoro.

Los resultados mostraron que la separación geográfica entre las islas no ha impedido la dispersión del virus. Los investigadores señalaron que el movimiento de animales, así como la repoblación de granjas después de los brotes, podrían favorecer la reaparición de la enfermedad al generar nuevas poblaciones de cerdos susceptibles.

Asimismo, el estudio evidenció que las zonas con mayor número de casos no necesariamente corresponden a aquellas con mayor riesgo cuando se considera el tamaño de la población porcina. Esta diferencia permite identificar áreas que podrían requerir una vigilancia sanitaria más focalizada y una mejor distribución de los recursos destinados a la prevención y el control de la enfermedad.

Finalmente, los autores destacaron que las cifras nacionales pueden ocultar diferencias importantes entre regiones, por lo que recomendaron fortalecer la vigilancia y dirigir las medidas de prevención, control y futuras estrategias de vacunación hacia las zonas con mayor riesgo de transmisión.

Referencia: Hsu JC-H, Schambow RA, Humphreys JM, Montenegro M, Miclat-Sonaco R and Perez AM (2026) Epidemiological update on spatial and space-time clusters of African swine fever in the Philippines. *Front. Vet. Sci.* 13:1888714. doi: 10.3389/fvets.2026.1888714.

Recuperado de:

https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2026.1888714/full?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=&utm_campaign=imp_impaut-05-24_fvets_en_n-ww

Monitor de Peste Porcina Africana

DIRECCIÓN EN JEFE

Italia: Actualización de la situación epidemiológica de la Peste Porcina Africana en el país.



Imagen representativa de la especie involucrada.
Créditos: <https://www.istockphoto.com/>

El 29 de septiembre de 2026, el Instituto Zooprofilático Experimental de Abruzzo y Molise "Giuseppe Caporale" (IZSAM) informó la actualización de los casos de Peste Porcina Africana (PPA) registrados en Italia, correspondientes al periodo del 1 de enero de 2022 al 29 de septiembre de 2026.

Durante este periodo, se contabilizaron 4,335 jabalís positivos y 55 brotes en porcinos domésticos, distribuidos en diversas regiones del país.

En fauna silvestre, la mayor concentración de casos se mantiene en el norte y centro-norte de Italia, principalmente en las regiones de Liguria, Piamonte, Emilia-Romaña y Toscana. Las provincias con mayor número de jabalís positivos fueron Génova, en Liguria, con 1,026 casos; Alessandria, en Piamonte, con 728; Lucca, en Toscana, con 434; Parma, en Emilia-Romaña, con 422; y Piacenza, también en Emilia-Romaña, con 235.

En porcinos domésticos, los 55 brotes se concentraron principalmente en las provincias de Pavía, en Lombardía, con 22 brotes; Novara, en Piamonte, con 7; Lodi, en Lombardía, con 6; y Nuoro, en Cerdeña, con 5. Asimismo, se registraron brotes en las provincias de Roma, Parma, Piacenza, Alessandria, Massa y Pistoia.

La distribución de los casos muestra que el virus continúa circulando principalmente en poblaciones de jabalís del norte y centro-norte de Italia, con presencia de brotes en porcinos domésticos. Ante esta situación, se mantiene la importancia de la vigilancia epidemiológica para identificar oportunamente nuevos casos y fortalecer las medidas de prevención y control, principalmente en las zonas con presencia de la enfermedad.

Referencia: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", COVEPI. (Consultado el 29 de septiembre de 2026). African Swine Fever National epidemiological bulletin.

Recuperado de: <https://storymaps.arcgis.com/stories/9fe6aa3980ca438cb9c7e8d656358f35>